

本草全

編

卷肆

88

林禮堂

20

休寧汪 昂初菴著輯 秀水李保常子牧批點

武進曹伯雄晉卿加評 南洋醫學 精校之本

涌吐之劑第三

邪在表宜汗在上焦宜吐在中下宜下此汗吐下三法也若邪在上焦而反下之則逆其性矣經用過當吐者而不行涌越使邪氣壅結而不散輕病致重重病致死多矣○朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和不曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故子嘗曰吐法氣汗以此夫

瓜蒂散

吐實邪 治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂煩亂人事昏沉五癰瘕癰及火氣上衝喉不得息食填太陽欲吐不出痰壅上脘火氣上衝食傷寒如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞕氣上衝喉不得息者胸有寒也當吐之汗出惡風頭痛項強為桂枝證其為邪在表令無頭痛項強而脈微亦治諸黃急黃在須臾即愈黃或服此散或加丁香 甜瓜蒂 黃赤小豆 共為末熟水或酸水調下量人虛寬服之吐時須令閉目緊束肚吐不止者葱白湯解之良久不出者含砂糖一塊即吐諸亡血虛家老人產婦血虛脈微者俱不可服非足脈絕者不宜

高者越之者因吐而有明也訓即後人吐有法為也畏後人吐有視不置知不達久置胸膈痰涎久在胸膈痰涎之因消胸膈痰涎之因消胸膈痰涎之因消胸膈痰涎之因消

若止胸中窒塞悶亂以物探之得吐即止如探不出方以此湯吐之如頭額兩太陽痛者令病人噀水一口以此散一字吹入鼻中出黃水即愈此足太陽陽明藥也胸中痰食與虛煩者不同越以瓜蒂之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者改用參蘆十劑曰燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是也赤豆瓜蒂並能行謂木鬱曰厥陰少陽屬木于今為毒乃人身生發之氣也食者陰物也脾胃者坤土也飲食填塞太陰則土盛而反侮木生氣不得上升而木鬱矣吐去上焦有形之物則木得條達而遂其生之性矣本方除赤豆名獨聖散治太陽中暈身重痛而脈微弱夏月傷冷水水清皮膚中鬱遏於外出之陽反中入行本方除赤豆加防風藜蘆各三聖散和本方除赤豆加藜蘆汁搗細探吐亦名三聖散治中風風癰痰厥頭痛本方除赤豆加金蠟五分吐風痰本方加淡豉治傷寒煩悶瓜蒂散治吐赤小豆吐痰食寒瘧吐實宜瓜蒂散此重劑也已經汗吐下邪乘虛客胸中而懊憹者為虛煩宜梔子散治之始得大吐也○朱丹溪用瓜蒂散此重劑也已經汗吐下邪乘虛客胸中而懊憹者為虛煩宜梔子散治之始得大吐也○朱參蘆散治虛弱人痰涎壅盛人參蘆研為末水調下一二錢或加竹瀝和服滑痰

陰者非既
脾胃而胃
氣聖藥使
脾氣不新
耳又必通
入之食尚
可完吐故
經宿之燥
將為胃中
便宜攻下
吐法可尚
此吐刺之
祖方也

但用平穩
頗為清火
不吐也尚
吐也

書中治傷
寒汗下傷
後虛損不
眠等證汗
熱下後證
語宜善體
會後服表
汗解後服
難後除或
熱未除或
雖平而傷

此手太陰足太陽藥也經曰在上者因而越之痰涎上壅法當涌之病人虛羸故以參蘆代熬蘆瓜壹猶帶補不致耗傷元氣也宋丹溪曰人參補陽中之陰蘆反瀉太陰之陽亦猶麻黃根節下同

梔子鼓湯吐虛損治傷寒汗下後虛損不眠劇者反覆顛倒心下懷懷及天下後身熱不退心下結痛或痰在

膈中汗吐下後正氣不足邪氣乘虛結于胸中故煩熱懷懷煩熱者熱而煩擾懷懷者懷溫懷悶也畫動為陽反漫為虛煩熱仍梔子十四淡豉四服令微吐仲景曰病人黃微

此足太陽陽明藥也煩為熱勝梔子苦寒色赤入心故以為君淡豉苦能發熱腐能勝焦腎氣為熱心氣為焦助

梔子以吐虛煩故以為臣酸苦涌泄為陰也此吐無形之虛煩若膈有是邪當用瓜蒂散王海藏曰煩氣也躁血

故用梔子謂煩煩香致治腎躁亦用吐藥也邪在上焦吐之則邪散經所謂在上者因而越之也或問煩躁皆

火獨在故肺腎合而為煩躁按大便頻者為下證若大便微澀者不可服以裏虛寒在下雖煩非熱也若宿食而煩躁者梔子大黃湯主之

本方加甘草名梔子甘草豉湯治前證兼少氣者甘以補之本方加生薑名梔子生薑豉湯治前證兼嘔者平以

本方除淡豉加甘薑名梔子甘薑湯治傷寒誤下身熱不去微煩者梔子以解熱煩本方除淡豉加厚朴枳實

名梔子厚朴湯治傷寒下後心煩腹滿梔子滿虛煩枳朴泄腹本方加大黃枳實名梔子大黃湯治酒疸黃心中懊憹或熱痛亦治傷寒食復輕則吐下重則下本方加枳實名枳實梔子豉湯治傷寒勞復傷寒下利也○梔子

稀涎散吐痰治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先開其關令微吐稀涎續進他藥不可令大吐醒後不可大投亦

治喉痺不能進食 皂角四挺去白礬一為末溫水調下五分或加煎蘆葦蘆能吐風痰

此足太陰厥陰藥也吳鶴皋曰清陽在上濁陰在下天冠地履無是仆也若濁邪逆上則清陽失位而倒置矣故

降序而愈者此門邪入裏熱結于裏表虛無陽故惡寒戰慄此陽虛格陰乃熱病非寒證誤投熱藥則死矣朱丹

卷四 大承氣湯

此是太陽陽明藥也東垣曰正陽陽明藥大黃占寒除氣當歸硝磺寒潤燥軟堅二物下行甚速故用甘草甘平以緩之

下書下可結乃汗發太斷陽有陽不下正證多至之慎語得浪口證以也油之與大又可力而
之宜細用管陰腹腰陽不證者明可少陽三陽下陰也命是謬不輕成未後先景訓小承氣湯
下下看濕分氣痛寒無脈下亦少而必可惟之陰也謬不輕成未後先景訓小承氣湯
慎是方用亦疑者無脈下亦少而必可惟之陰也謬不輕成未後先景訓小承氣湯

不致傷胃。故曰調胃承氣去枳朴者不欲其犯上焦氣分也。準繩曰陽明一證分為太陽正陽少陽三等按本草

引於至高之分仲景以調胃承氣收入太陽門而大黃黃酒浸曰酒浸湯後曰少少溫服曰當和胃氣又本湯治不

下之心煩者及發汗不解蒸熱者吐後腹脹滿者是太陽陽明去表未盡其病在上不當攻下故宜緩調

和之也至正陽陽明則曰急下之而大承氣湯大黃下註曰酒洗洗輕於浸是微升其走下之性以治其中也至

少陽陽明則去正陽而過太陽陰其分為下故小承氣湯大黃不用酒製少陽不宜下故去芒硝又曰少與曰微瀉

仲景之妙法也。本方加當歸薑棗則名當歸承氣湯。治裏熱火鬱或皮膚枯燥或咽燥鼻乾或便溺秘結或瘀血發狂加當歸

以潤燥調營。桃仁承氣亦本方除芒硝。名大黃甘草湯。金匱用治食已即吐。外臺用治吐水。準繩曰仲景云大黃

與同意加薑棗引入胃也。曰欲吐者其病在上因而越之可也而逆之使下則必抑塞情亂而益甚若已吐大黃

甘草治食已即吐何也。曰欲吐者其病在上因而越之可也而逆之使下則必抑塞情亂而益甚若已吐大黃

止有升無降則當逆而折之引合下行無速于大黃者矣。故不禁丹溪泥之而曰凡嘔吐切不可下。周天夫本方

用大黃二兩半芒硝甘草各一兩。又名破棺丹。治多汗大渴便閉。語陽結之證及諸瘡腫熱。

桃仁承氣湯。蓄血。○仲景見血門。大陷胸湯。結胸。○治傷寒下之早。表邪入裏。心下滿而鞭痛或重汗而復下之。不大便五六日。舌上燥渴。日晡潮

熱從心至小腹鞭滿痛不可近。或無大熱但頭微汗出。脈沉為水結胸。按之鞭痛者為結胸。鞭而不痛者為痞。痞

次之支結又次之結胸。由于下之太早裏之正氣為邪所損。邪乘虛入結于心胸之間。故石韋而痛。重汗不下

內飲皆亡津液。邪熱內結。故于下之太早裏之正氣為邪所損。邪乘虛入結于心胸之間。故石韋而痛。重汗不下

水飲不得外泄。非熱結也。名水結胸。固當下然脈浮大者下之則死。猶帶表邪下之重虛結而又難結。無死證者為寒

寒結胸下之脈主病皆在陽。在陽者沉脈浮大者下之則死。猶帶表邪下之重虛結而又難結。無死證者為寒

因作結胸。病發于陰而反下之。因作痞。皆以下之太早故也。成無己曰發熱惡寒者發于陽也。陽邪入裏為結胸

太陽發熱者發于陽而反下之。因作痞。皆以下之太早故也。成無己曰發熱惡寒者發于陽也。陽邪入裏為結胸

無熱惡寒者發于陰而反下之。因作痞。皆以下之太早故也。成無己曰發熱惡寒者發于陽也。陽邪入裏為結胸

芒硝升一錢甘遂升一錢
先煮大黃去滓。內芒硝煮一
二沸。內甘遂末溫服。

小陷胸湯
大陷胸丸

達為君。芒硝鹹寒。輒堅為臣。大黃苦寒。蕩滌為使。三藥至峻。而有起死之功。準經曰。邪結胸中。處至高之分。宜若吐。然邪氣與胸中陽氣相結。不能

分解毒于下為痛非虛煩悶寔者所可同故須攻下也低者舉之高者陷之以平為正故曰陷胸也經又曰太陽病脈浮而動發乎心為風散則為熱動則為痛散則為虛煩胸熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫

反下之動數變通膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹湯氣內陷心下因鞭則為結胸大陷胸湯

虛文曰短氣躁煩虛之甚矣借曰陽氣內陷心下因難而可退功之乎豈陷胸之方反緩于承氣一下再下寧不

胃中虛客氣動脇心下中懷悶者當以枳實湯去胸中之邪陶節著曰結胸乃下早而成未嘗經下者非結

小柴胡對小陷胸一服豁然若因下早而成者方用陷胸湯以分淺深從緩治之不宜太峻上焦乃清道至高之

分過下則傷元氣惟行功曰傷寒結胸欲絕心膈高起乎不可近用大陷胸湯不瘥者此下後逆氣已不瑤
盡復上攻當用枳實理中丸先理其氣次調諸疾用之如神活人云誤下未成結胸者急頻與理中湯自然解了

蓋理中治中焦故也胃中雖和傷寒未退者宜候日數足卻以承氣再下之蓋前藥之下未是也其水結胸者用小半夏加茯苓湯小柴胡去枳實又有血結胸證手不可近腋水不沉然善忘如狂大便黑小便利宜

屋角地黃湯劉心山曰結胸痞滿多由痰飲凝結心胸故陷胸湯如用甘遂半夏枳實旋覆之類皆為痰飲

也

治傷寒誤下小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者及痰熱塞胸前證上傷寒此則按之

滑則痛結
知熱未深
與此湯以
除膈上結
熱

黃連兩半夏半升栝實一枚

此足少陽藥也黃連性苦寒以泄熱栝蠆性寒潤以滌垢半夏性辛溫以散結結胸多由痰熱結聚故用三物以

除痰去熱也。王海虞曰大陷胸湯治熱實大陷胸丸兼喘小陷胸湯治痞。

治傷寒結胸項強如柔痙狀有汗為柔痙胸膈是滿故項強而不能俯項屬太陽部位 大黃八芒硝 葶藶 杏仁去皮尖各

合研取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢白蜜三合煮服

此足太易陽明藥也。大黃性苦寒，以世熱，芒硝生鹹寒，以輕堅，杏仁生苦甘，以降氣。葶藶甘寒，取其下水而直達。

白蘆根其體滑而甘緩

卷之十

胃而久緩
之黃善走
周詳謹慎
無憾焉

傷寒下之
結胸反為
邪尚未入
陽明若先
下之則邪
未去而徒
傷胃氣虛
反得氣虛
入胃而為
結胸或熱
勝寒勝熱
瀉心湯論
酌用之最
為妥善此
證仲景不
用瀉心水
用氣法而
湯因者三
焦俱有氣
又有水氣
故用此方
改註中不
滿小熱從
心湖注此
可近只痛
一諸與此

十索湯伏飲積聚 治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人黎黎汗出頭痛心下痞鞭引腸下痛嘔短氣

汗出不惡寒表解而裏未和邪熱內蓄有伏飲者下利嘔逆裏受邪也汗出不惡寒表已解也頭痛痞鞭引腸下

人服一錢虛人五分或裏肉為病不除者再服得快下後麻痺自瘳

此足太陽藥也羌花大戟性辛苦以逐水飲甘遂苦寒能直達水氣所積之處以攻決為用三藥過此故用大棗

之甘以緩之益土所以勝水使邪從二便而出也十索湯小者龍湯主水氣乾嘔桂枝湯主太陽汗出乾嘔薑附

表有水用不香龍更有水用十索或調十索湯桂枝湯加芒硝白朮湯皆屬散家俱有頭痛項強之證何也張

藥書曰太陽經多氣少氣病人表熱微瀉必飲水變為水多氣弱不能消化本經血氣因而凝滯致有頭痛項強

之病此經汗出短氣是痰厥也非十索不能除但此湯不宜輕用恐損人於後故

本方除大棗加大黃黑丑輕粉水丸名三花神佑丸治壯實人風痰鬱熱支體麻痺走注疼痛濕熱腫滿氣血

壅滯不得宣通及積痰潮胃服三九後轉如痛此痰涎壅塞頑攻不開再加二九快利則止加桑牛大黃大瀉

積虛人不可輕用本方各五錢加黃柏三兩酒炒大黃兩兩治胸膈腸胃熱痰濕痰

三物備急丸傷食急痛 治食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿欲死及中惡客忤卒暴諸病食滯腸胃上焦不行

死內疳者已豆霜 大黃 乾薑 等分 蜜丸小豆大每服二三丸中惡口噤者折齒灌之崔氏乾薑易桂枝

名備急散 此手足陽明藥也大黃苦寒以下熱結巴霜辛熱以下寒結加乾薑辛散以宣通之乾薑辛溫開五臟

非急莫施故曰備急

礪砂丸一切積聚 治一切積聚腹飲心膈引痛 礪砂 巴豆 三棱 莪薑 白芷 木香 青皮 胡椒 二

半 大黃 乾漆 肉桂 肉苁蓉 為末 蜜酒二升 煮巴豆五七沸 再下三棱大黃末同煎五七沸入礪砂熬

成膏和諸藥研心菜豆大每五九薑湯下

十藥湯 逐水之峻 劑非大之 者不可輕 試至河神 用三花神 佑九除大 黃黑豆已 是一味復 脾不復留 地更輕餘 粉則元氣 搜括去盡 病難盡去 亡人亦隨 命以十仲 景名藉大 藥之甘緩 以救脾胃 師成節制 之師也

而痛瀉反止。經所謂通用也。傷由溼熱。黃芩黃連佐之以清熱。茯苓澤瀉佐之以利濕。積由酒食。神曲蘇合。切之。物化食解酒。因其同類溫而消之。苓連大黃苦寒太甚。恐其傷胃。故又以白朮之甘溫補土而固中也。

倒倉法。陳垣積滯 黃牡牛肉 三十斤 切碎洗淨。用長流水煮柴火煮糜爛。濾去滓。取淨汁再入鍋中。文武火熬至琥珀色則成矣。擇一靜室。明快不通風者。令病人先一夜不食。坐其中。每飲一鐘。少時又飲。積數十鐘。病在上者必吐。病在下者必利。病在中者吐而且利。視所出物可盡。病根乃止。連進之急則逆上而吐多。緩則順下而利多。視病之上下而為緩急。吐利後必瀉。不得與湯。其小便必長。取以飲之。名輪迴酒。非惟止渴。兼滌餘垢。行後俟臥覺飢。先與米飲。次與稀粥。至三日後。方與厚粥數飯。菜羹調養半月。精神煥發。沉疴悉痊。矣須戒色。逐半年一年。并牛肉數年。霞天膏。即照前法。每肉十二斤。可熬膏一斤。磁罐盛之。夏月水浸。可留三日。寒天久留生微霉。用重湯煮入煎劑。調服八九劑。每三分加麴一分。煮糊或同蜜煉。

此足太陰手足陽明藥也。朱丹溪曰。牛坤土也。黃土之色也。以順為德。而法健為功者。壯之用也。肉胃之藥也。液無形之物也。積聚久則形質成。依附腸胃。過薄曲折之處。以為巢臼。豆鉄兩之九散。所能窺其藩牖乎。肉腠充滿。流行無處不到。如洪水泛漲。浮萍陳朽。官順流而下。不得停留。凡屬滯礙。一洗而空。澤枯潤槁。補益虛損。實無精神。煥發之樂乎。其方傳于西域異人。中年後行一二大。亦卻疾養壽之一助也。王綸曰。牛肉補中。非吐下藥。借蜜煎導法。通大便。仲景

治陽明證。自汗。小便利。大便秘者。胃實自汗。小便復利。此為津液內竭。非熱結也。若與下藥。則液愈耗矣。雖大便艱。不可攻之。宜用外導之法。蜂

蜜用銅器微火熬。頻攪勿令焦。候凝如飴。捻作挺子。頭銳如指。捻見角末少許。乘熱納穀道中。用手把住。候大便時去之。加鹽少許亦可。鹽能潤燥。散堅。

此手陽明藥也。蜜能潤腸。熱能行氣。皂能通竅。經曰。表解無證者。胃雖寔是攻。故外導而通之。不欲以苦寒傷胃也。徐忠可曰。此為大便不行。而別無所苦者。設也。結胸痞滿。臟結胃。有燥屎。皆有見證。今但自汗且小便利。是津耗熱勢而乾燥也。

豬膽導法。通大便 仲景 治證同前。豬膽一枚。取汁入醋少許。用竹筒長三四寸。以一半納穀道中。將膽汁灌入肛中。

頃當大便。

卷五

大柴胡湯
攻少陽裏
○陽明
仲明解表

大黃湯少陰有大承氣

元運立敗者表證未除者發熱頭痛脇痛寒熱仍在也裏證又急者痞鞭燥渴譫狂便閉也脈沉是為在裏弦數

者雖在少陽也洪者邪在陽明也其嘔而下利者何而用之張無善曰裏虛者便雖難而勿攻裏實

熱已甚結于胃中故下之則愈
柴胡兩半生薑斤黃芩
芒硝兩生薑兩大棗
枚擘和是枚大黃
無大黃下註云

若不加黃芩不熱大熱湯也
前胡名天胡湯胡洽云仲景方治同

此足少陽陽明藥也表證未除故用柴胡以解表裏證燥是故用大黃枳實以攻裏芍藥安脾斂陰能為肝土使

黃芩。乾薑。得。昌。上。夏。和。胃。上。區。薑。辛。散。而。藥。甘。緩。以。調。營。衛。而。行。津。液。比。表。裏。之。治。下。劑。之。緩。者。也。周。楊。俊。曰。仲

勝孰臈證則有五苓散少陽兼陽明臈證則有大柴胡湯皆表裏兩解之法也昂按此方少陽陽明故加減小柴

胡小承氣而為一方少陽固不可下然無陽明腑證則當下宜小承氣湯輕則大柴胡湯或問大柴胡湯瀉也桂

人參解表不裏若傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者此為夏故當以大柴胡下之○陶節菴曰傷寒

邪熱傳裏
氣加甘
湯草和
加中
中氣
去積
枳朴
用者
藥三
焦傷
上焦
傷氣
氣之
氣也
邪在
上焦
宜大
承氣
湯邪
在中
焦則
有燥
實堅
三證
宜調
胃

陰也若表證未除裏證又急不得不下者則用大柴胡湯通表裏而緩治之大承

氣最重。小月氣云。言月氣之六。與天云之六。宜六。石性。太急。故不用。

此作是一三三不能屈公品曰曰海書已中復不止才當言失墮以圖窮

大柴胡湯 柴胡加芒硝湯

下之非其治也潮熱者是也先以小柴胡湯以解外後以加芒硝湯主之傷寒十三日為再傳經盡當解之時陽

也邪氣猶在 小柴胡湯 解和 加芒硝六兩 表裏之間也

此少陽陽明藥也表證誤下邪熱乘虛入胃以致下利而滿嘔潮熱之證猶在傷寒潮熱為胃實故宜下故仍與柴胡湯以解

少陽加芒硝以瀉胃熱亦與大柴胡兩解同意

桂枝加大黃湯 太陽太陰解表 治太陽誤下轉屬太陰腹滿大是痛者 腹脹雖屬太陰若裏證尚淺腹滿時痛猶

以此湯下之 桂枝湯 表門 加大黃兩芍藥三兩

此足太陽太陰藥也誤下而作結胸則邪在上仍屬太陽今腹滿而大是痛則邪已入太陰經曰諸痛為寒痛隨

利減故用桂枝以解未盡之表邪加大黃以下內陷之邪熱經又曰太陰病脈弱其人續自便利設當行大黃芍

也如是玉海藏曰腹痛桂枝加芍藥大是痛桂枝加大黃何為不用芍藥加大黃而下桂枝內加之要從太陽經

治以太陽為本也趙嗣真曰太陽腹痛有三次第得經之邪有不用芍藥加大黃而下桂枝內加之要從太陽經

為下後內陷之邪宜桂枝加芍藥湯大是痛者桂枝加大黃湯設遇本經直入陰邪腹滿定痛脈沉細

者用此下之豈不始結胸之悔耶周揚俊曰大是痛者有宿食也非大黃不能除亦通因通用之意也

冰解散 溫疫表裏兩 治天行一二日頭痛壯熱 麻黃兩桂心 甘草 白芍 兩大黃 黃芩三兩

此足太陽陽明藥也麻黃能開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清上中之熱大黃以瀉中下之熱甘草白芍能

調胃而和中之益天行溫疫熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖一二日之淺可以汗下兼行不必同於

傷寒之治法也

防風通聖散 表裏俱實 治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷氣血怫鬱表裏三焦俱是憎寒壯熱頭目昏

暈目赤睛痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利嘔滿稠黏咳嗽上氣大便秘結小便赤澀瘧疾瘧毒折跌損傷瘀

血使血腸風痔漏手足癱瘓驚狂譫妄丹斑癰疹憎寒壯熱邪在表也頭眩目赤風熱上攻也耳鳴口苦邪在少

氣血清熱也丹斑癰疹風熱在胃也 防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 山

梔黑大黃 芒硝 黃芩 石膏 桔根 甘草 二滑石 加生薑蔥白煎自利去硝黃白汗去麻黃加桂枝

涎嗽如薑製半夏

此足太陽陽明表裏血氣樂也。防風利介薄而輕浮升散解表散熱使風熱從汗出而散之于上。大黃芒硝破結通幽。梔子滑石降火利水。使風熱從便出而泄之于下。風濕于內。肺胃受邪。桔梗石膏清肺瀉胃。風之為患。肝木受之。川芎歸身和血補肝。黃芩清中上之火。連翹散氣散血凝。甘草緩峻而和中。六一利水瀉火之意。白木健脾胃而燥濕。上下分消。表裏交治。而能散瀉之中。猶寓溫養之意。所以汗不傷表。下不傷裏也。

本方再加人參補氣。熟地益血。黃柏黃連除熱。羌活獨活天麻細辛金蠅祛風。密九彈子大。每服一丸。茶酒任下。名祛風至寶丹。喻嘉言曰。此中風門。本方除大黃芒硝。名雙解散。如石膏滑石以解裏。復有當歸芍藥以和血。枯梗甘草白朮以調氣。故曰雙解。

葛根黃連黃芩湯太陽陽明解表 治太陽病桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者表未解也。喘而汗出者此湯主之。發熱惡風自汗。所謂桂枝證也。此邪在表而反下之。虛其腸胃。表邪乘虛入裏。遂成喘而利不止也。促為陽盛。雖下利而脈促。知表未解。前證仍在也。汗出而喘。為邪氣外甚。所致喘而汗出。為裏熱氣逆所致。與此湯脈數而止曰促。

此足太陽陽明藥也。表證尚在。醫反誤下。邪入陽明之腑。其汗外越。氣上奔則喘。下陷則利。故舍桂枝而用葛根。專治陽明之表。葛根能升陽明清氣。又為治瀉聖藥。加於連以清裏熱。甘草以調胃。氣不治利而利自止。不治喘而喘自止矣。又太陽表裏兩解之變法也。

三黃石膏湯發表 治傷寒溫毒。表裏俱熱。狂叫欲走。煩躁大渴。面赤鼻乾。兩目如火。身形拘急。而不得汗。或已經汗下。過經不解。三焦大熱。譫狂鼻衄。身目俱黃。六脈洪數。在陽毒發斑。陶節庵曰。此因熱在三焦。閉塞經絡。津液營衛不通。遂成此證。石膏兩

黃芩兩 黃連兩 黃柏兩 梔子三十個 麻黃兩 淡豉二合 每服一兩。薑三片。棗二枚。細茶一握。煎服。

此足太陽手少陽藥也。表裏之邪俱盛。欲治內則表未除。欲發表則裏又急。故以黃芩瀉上焦之火。黃連瀉中焦之火。黃柏瀉下焦之火。梔子通瀉三焦之火。而以麻黃淡豉發散表邪。石膏體重瀉胃火。能解肌。亦表裏分消之

有最經合

於攻下實 表證於不 問也 究其 力倍於 表從此 悟立可 法當相 機急則 而不拘 中自法 處合矣 此表裏 王方 傷寒再 少陽之 未解胃 又有是 故用七 以湯其 波較太 胡在輕 矣陽誤 不專屬 而於脾 故仍用 桂以解 陽之邪 大黃以 太陰之 愈後有 中而無 經初起 有最經 合

表裏不
表攻裏不
表攻裏不

雖云通治
諸邪熱必
如註中表
裏三焦俱
定者方可
黃否則可
石滑石
之沉寒尋
常之證單
能堪此雙
去散已除
硝而石黃
滑石二味
子意尚不
如過當不
去加併除
青皮二味
法至實
丹風至治
中風之善
劑矣
熱入陽明
故於解明
中清陽明
之熱以止
三焦鬱熱
毒火熾盛

藥也
五積散
治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身痛項背拘攣胸滿痞悶嘔吐腹痛寒熱
往來脚氣腫痛冷秘寒疝寒癰瘰癧無汗婦人經水不調上證皆寒白芷 陳皮 厚朴六分當歸 川芎 芍
藥 茯苓 桔梗一分枳殼半夏麻黃四分乾薑 肉桂重表者甘草三分加薑蔥煎又法除桂枝枳殼
陳皮餘藥慢火炒攪入桂枝同煎名熟料五積散用炒者助有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳殼加人參白朮腹痛
挾氣加吳茱萸胃寒加理薑陰證傷寒肢冷虛汗加附子婦人調經加醋又
此陰陽表裏通用之劑也麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和中止痛蒼朮厚朴平胃土而祛濕陳皮半
夏行逆氣而除痰黃歸薑入血分而祛寒溫枳殼桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾所以為解
表溫中除濕之劑去痰消痞調經之方也一方統治多病惟活法有變而通之本方能散寒積食積氣積血積痰
芍藥甘草即各半湯也蒼朮陳草即平胃也枳殼陳皮即枳桔半夏等湯也加芍歸治血又加乾薑為厚朴散此
數藥相合為解表溫中之劑消痞調經之方雖為內寒外感表裏之分所製實非仲景表裏桂枝麻黃薑附之
方也惟在活法變而通之胸節痞滿曰夫病不身熱頭痛初起怕寒腹痛嘔吐泄瀉跌臥沉寒不渴脈沉遲無力人
皆知為陰證矣至于發熱面赤煩躁口渴去衣被脈大人皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣不知陰證不分熱
與不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是沉陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必
須薑附溫之若作熱治而用涼藥則濕愈甚而踴愈急豈得生乎此取脈不取證也常傷寒有含證取脈者又有
取脈而
含脈而
取證者

五積散
治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身痛項背拘攣胸滿痞悶嘔吐腹痛寒熱
往來脚氣腫痛冷秘寒疝寒癰瘰癧無汗婦人經水不調上證皆寒白芷 陳皮 厚朴六分當歸 川芎 芍
藥 茯苓 桔梗一分枳殼半夏麻黃四分乾薑 肉桂重表者甘草三分加薑蔥煎又法除桂枝枳殼
陳皮餘藥慢火炒攪入桂枝同煎名熟料五積散用炒者助有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳殼加人參白朮腹痛
挾氣加吳茱萸胃寒加理薑陰證傷寒肢冷虛汗加附子婦人調經加醋又
此陰陽表裏通用之劑也麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和中止痛蒼朮厚朴平胃土而祛濕陳皮半
夏行逆氣而除痰黃歸薑入血分而祛寒溫枳殼桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾所以為解
表溫中除濕之劑去痰消痞調經之方也一方統治多病惟活法有變而通之本方能散寒積食積氣積血積痰
芍藥甘草即各半湯也蒼朮陳草即平胃也枳殼陳皮即枳桔半夏等湯也加芍歸治血又加乾薑為厚朴散此
數藥相合為解表溫中之劑消痞調經之方雖為內寒外感表裏之分所製實非仲景表裏桂枝麻黃薑附之
方也惟在活法變而通之胸節痞滿曰夫病不身熱頭痛初起怕寒腹痛嘔吐泄瀉跌臥沉寒不渴脈沉遲無力人
皆知為陰證矣至于發熱面赤煩躁口渴去衣被脈大人皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣不知陰證不分熱
與不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是沉陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必
須薑附溫之若作熱治而用涼藥則濕愈甚而踴愈急豈得生乎此取脈不取證也常傷寒有含證取脈者又有
取脈而
含脈而
取證者

本方合人參敗毒散名五積散加散治寒濕身重腰痛脚膝痠痛

麻黃白朮湯解表清裏補中治大便不通小便赤澀身面俱腫名黃麻木身重如山喘促無力吐痰唾沫發熱時躁
躁已振寒項頸如冰目中留火鼻不聞香膈有動氣小腹急痛東垣曰此宿有濕熱伏於榮血之中水火乘於陽
水不足令時寒水得令乘其旺 青皮 陳皮 黃連酒炒黃柏酒炒甘草炙升麻二分柴胡 桂枝 人參 黃耆
水剋火陰木大勝必有火敗 水不足令時寒水得令乘其旺 青皮 陳皮 黃連酒炒黃柏酒炒甘草炙升麻二分柴胡 桂枝 人參 黃耆

蒼朮酒洗白朮土炒厚朴 豬苓三分茯苓 澤瀉 吳茱萸四分白豆蔻 炒薤白五分麻黃六分杏仁四粒 分二服
此足三陽三陰通治之劑也前證益因表裏俱傷陽氣抑不得升故風火濕熱鬱而為病也桂枝麻黃解表祛風
增補醫方集解 卷五 五積散 麻黃白朮湯

升麻黃芩升陽散火。苦溫黃柏燥濕清熱。而黃柏又能補腎滋陰。益壯青陳利氣散滯。而青柴又能平肝。益壯又

能溫胃杏仁利肺下氣神麴化滯調中黃暖腎溫肝參耆甘藷蒼白二朮補脾益氣茯苓瀉通利小便使濕

去而熱亦行方內未嘗有通大便之藥蓋清陽升則濁陰自降矣昂按此方蓋合四君五苓補中平胃麻黃湯而解毒而為一方者也治證既多故所用表裏寒

熱種之藥俱佳但治氣藥而無血藥與五種不同然乃
東垣之方錄之以見治療之中而尚尤有此一種之藥也

治外感內傷發熱頭痛嘔逆欬嗽痰壅塞舌焦眩暈嘔吐傷風泄瀉及傷寒已汗不止

傷外也汗而熱不止陰虛也
人參紫蘇乾薑前胡半夏
枳實陳皮白甘草枳殼枳椇

根木香三錢 每五錢加薑朮煎外
夢多者去朮加白朮
肺泄瀉加白朮扁豆

藥肉健土脾

此手足太陰經也。屈臂宣肘，表故用針。針前故傷肩，肩中故用灸。灸於甘肅，極生治癰。止嘔，松栝利腹，寬腸去積。

行氣破滯使內外俱平貝母帶氣化痰飲之病本方云前胡蒼根自能解肌松欬橘紅等自能寬中此肺母以

風其內積痰飲並可用也合四物名於此補心湯尤能治虛熱反吐衄便血乃虛寒表裏兼治之劑然不可過

本方主人參黃柏加川芎將胡蘆葉煎名曰黃蘆煎治傷寒外有微熱而痛惡寒內有微嘔四肢氣渾身是熱

通陰陽血氣之使
子宮者。女子之
宮。乃血氣之海。
經水之所由也。
子宮者。乃血氣
之海。經水之所
由也。子宮者。乃
血氣之海。經水
之所由也。子宮
者。乃血氣之海。
經水之所由也。

有齒口偏方
治四時感冒
症在素厚手
作服脂滋其
喉痛之症
濕之區風氣
未弱易傷風
寒俗稱感冒
受邪膚受之
名也由鼻而
入在于上部
客于皮膚致
無不經形證
惟發熱頭昏
打沙未二更
去白十五七

痛而已胸滿噎氣逆食則氣內傷也○輕及感冒重者為中○香附、紫蘇、乾薑、厚皮、一錢、甘草、分

力盡意窮。任公力以迄斯。歎曰。名位器用。非君之志。豈非加川。白立本固自。為不若作異無。加服京。

七手之金藥。○氣逆表氣而散之。○香附丁薑氣而消肉。○薑工化。○鹽丁姜。○夏以左。○橘紅利氣。○煎能發表散。

亦消甘草中下化餅表爲使此山三大寒氣行則寒散而食

矣 十三和 二自財 五以也