

張氏醫通卷之七

長洲石頑張

璐路玉父纂述

尚志安世

男

訥遜言

叅訂

大小府門

泄瀉

靈樞云夫中熱消痺則便寒寒中之屬則便熱胃中
熱則消穀令人懸心善饑臍以上皮熱腸中熱則出
黃如糜臍以下皮寒胃中熱則腹脹腸中寒則腸鳴

飧泄胃中寒。腸中熱則脹。而且泄。胃中熱。腸中寒。則疾。饑小腹痛脹。

世醫治病。但知熱以寒治。寒以熱治。外此總不講也。設病中熱消瘴。而見懸心善饑。洵爲熱證無疑。然必審其臍。以上皮熱。方是胃中熱。氣蘊隆。若出黃如糜。不但胃中有熱。而腸中亦爲熱邪奔迫。可知。倘臍以下皮寒。而見腹脹。有似乎實熱固結。實爲胃中虛寒之候。或見腸鳴飧泄。非特胃中有寒。且移寒於二腸矣。蓋熱泄則腸垢黃赤。寒泄則鶩

溏清冷。此病機之最顯著者。可以明辨。况有脹而泄利黃赤。此脹爲胃寒陽氣不布之脹。泄爲腸熱便垢之泄。復有消穀易饑。小腹脹痛之病。豈非胃中有熱。腸中有寒之一驗乎。若此種種。苟未明仲景三瀉心湯。黃連湯。乾薑黃芩黃連人參湯。厚朴生薑半夏甘草人參湯。乾薑人參半夏丸等法。必不可以語至治也。

經云。春傷於風。夏生飧泄。風木之邪內乘溼土也。○邪氣留連。

乃爲洞泄。邪氣留連既久。則中氣失職而爲洞泄無度矣。○清氣在下。則生

飧泄。下焦虛寒火不生土則中氣。大腸小腸皆屬

於胃。胃脈虛則泄。二脈者氣血之先脈虛則胃虛。○溼

勝則濡泄。脾惡溼。溼勝則綿。○諸厥固泄皆屬於下

脾腎俱虛則陽氣不能運於四。○暴注下迫皆屬於

熱。暴泄而肛門迫迫此屬火化若暴泄而肛門不禁

非陽久泄。○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒。火氣炎

非陰是也。○冷安得不為寒乎。○

原病式曰瀉白為寒。青為風。黃赤黑皆為熱也。大抵

瀉利小便清白不瀉穀不化而色不變者寒也。穀雖

不化而色變黃赤煩渴小便赤澀者熱證也寒泄而
消化者未之有也或火性急速傳而暴泄臭穢色黃者有之仲景
得溼則飧泄也

東垣云夏間淫雨陰晦時行瀉利一日體重肢痛
泄利而小便閉澀思其治法必用淡滲以利之今受
寒溼之邪若從淡滲非暮年所宜行年五十已上降
氣多而升氣少得淡滲之劑是降之又降陽氣愈弱
精神愈短矣合用風藥以羌獨升柴甘防同煎所謂

溼寒之勝以風平之。又曰下者舉之。是因曲而爲之直也。若不達升降之理。而一槩施治。安得愈乎。

李士材云。內經之論泄瀉。或言風。或言溼。或言熱。或言寒。此名四氣。皆能爲泄也。又言清氣在下。則生飧泄。此名脾虛下陷之泄也。統而論之。脾土强者。自能勝溼。無溼則不泄。故曰溼多成五泄。若土虛不能制溼。則風寒與熱皆得干之。而爲病。治法有九。一曰淡滲。使溼從小便而去。如農夫治澆。導其下流。雖處卑監。不憂巨浸。經云。治溼不利小便。非其治也。又云在

下者引而竭之是也。一曰升提氣。獨於陽性木上升。胃氣注迫。輒爾下陷。升柴羌葛之類。鼓舞胃氣上騰。則注下自止。又如地上淖澤。風之卽乾。故風藥多燥。且溼爲土病。風能勝溼。所謂下者舉之是也。一曰清涼。熱溼所至。暴注下迫。苦寒諸劑。用滌燔蒸。猶當潺暑鬱蒸之時。而商飈颯然條動。則炎敲如失矣。所謂熱者清之是也。一曰疏利。痰凝氣滯。食積水停。皆令人瀉。隨證袪逐。勿使稽留。經云。實者瀉之。又云。通因通用是也。一曰甘緩。瀉利不已。急而下趨。愈趨愈下。

泄何由止。甘能緩中。善禁急速。且稼穡作甘。甘爲土
味。所謂急者緩之是也。一曰酸收。瀉下有甘。則氣散
而不收。無能統攝。注泄何時而已。酸之一味。能助收
攝之權。經云。散者收之是也。一曰燥脾。土德無慙。水
邪不濫。故瀉皆成於土。溼溼皆本於脾。虛倉廩得藏。
水穀善分。虛而不培。溼溼轉甚。經云。虛者補之是也。
一曰溫腎。腎主二便。封藏之本。雖屬水而真陽寓焉。
少火生氣。火爲土母。此火一衰。何以運行三焦。熟腐
水穀乎。故腎虛者必挾寒。脾虛者

補母。經云。寒者

溫之是也。一曰固瀉。注泄日久。幽門道滑。雖投溫補。未克奏功。須行瀉劑。則變化不愆。揆度合節。所謂滑者。瀉之是也。已上九治。治瀉之大法。至於先後緩急之權。豈能豫設。須臨證之頃。圓機靈變耳。

戴復菴云。瀉水而腹不痛者。溼也。升陽除溼湯。或胃苓湯。○飲食入胃。輒後便完。穀者氣虛也。香砂六君子。或枳實理中湯。○腹痛瀉水。腸鳴痛一陣瀉一陣者。火也。黃芩芍藥湯。○痰留於肺。大腸不固。或時瀉。或時不瀉。或多或少者。痰也。脈必弦滑。其人神色不

痺二陳加蒼朮木香或探吐之更佳○腹痛甚而不
泄泄後痛減者食積也保和丸消導之○餐泄者史
記名飢風水穀不化溼兼風也風邪干胃木來賊土
清氣在下升陽除溼湯若飲食下噎而輒出不留者
死○瀉泄者汚穢粘垢溼兼熱也黃芩芍藥湯加香
連○驚瀉者中寒糟粕不化色如鴨糞所以澄澈清
冷小便清白溼兼寒也附子理中湯○洞泄者卽名
濡泄體重軟弱瀉下多水溼自盛也胃苓湯○水液
去多其而轉經血枯故筋急也升陽除溼湯○滑泄

者久下不能禁。溼勝氣脫也。四桂飲不應。用六桂飲。
○熱瀉。糞色赤黃。彈響作疼。糞門焦痛。糞出穀道。猶
如湯熱。煩渴。小便不利。五苓散瀉水多者。亦必用之。
若去桂。卽不効。○寒瀉。腹脹泄注。食卽嘔吐。理中湯
加肉桂。訶子升麻。○食久窘迫。大便色白。腸鳴切痛。
脈沉遲。身冷不渴。溲清。或綿綿腹痛。附子理中湯加
肉果。○夏暑暴瀉。如水。周身疼痛。汗出。脈弱。少氣。甚
者。加吐。此名緊病。漿水散。○盛暑逼於外。陰冷伏其
中。非連理湯。不可。氣虛而瀉。四君子加升柴肉果訶。

子○傷食泄瀉必噯氣如敗卵臭保和丸虛者治中
湯加減○積滯泄瀉腹必絞痛方泄者是也平胃散
加磨積散○傷酒瀉葛花解醒湯○痰瀉則頭暈惡
心胸腹迷悶或時瀉甚或時不瀉二陳湯加海石香
附星香不連薑汁調神麤糊丸服○有人患早起泄
瀉或時有血午後仍便結糞能食善飲此是酒積作
瀉二陳加炮薑酒炒川連紅麴陳酒麴糊丸烏梅湯
下有血去半夏加麴少許晨夕各一服○日間無事
將脯腹膨一夜腸鳴不得寢泰次早洞泄此名頓瀉

是脾虛溼盛也。胃苓湯加木香、砂仁。虛者理苓湯加木香。○氣泄，腸鳴失氣，胸膈痞悶，腹急而痛，瀉則腹下稍安，須臾又急，亦有腹急氣塞而不通者。此由中脘停滯，氣不流轉，水穀不分所致。木香調氣散。○水瀆入胃，名爲溢飲。滑泄渴能飲水，水下復泄，泄而大渴，茯苓甘草湯。五苓散并灸大椎三五壯立已。乃督脈之病也。○泄而口渴，引飲小便短濇，此爲津液內亡。錢氏白朮散。○腎水不足之人患泄，或過服分利之劑而渴者，加減八味丸。失治必致小便不利，水腫。

脹滿等證成矣。○凡大便泄服理中湯小便不利太
便反泄。不知氣化之故。本肺不傳化以純熱之藥治
之。是以轉泄。少服則不止。多服則愈熱。所以不分五
苓散加人參炙甘草名春澤湯。經云膀胱者州都之
官。津液藏焉。氣化則能出矣。○瀉而腹熱脈滑堅者
屬實。當與消導。不應是食積發熱也。加香連更不應
加大黃微下之。○瀉而經年不止者屬寒積。備急丸
神効。○泄瀉惡心欲吐。或水土不伏。或感山嵐瘴氣
而瀉。藿香正氣散。○脾胃虛弱內挾風冷泄瀉。注下。

水穀不化。臍下疝痛。腹中雷鳴。乃積寒久利。腸滑不
禁。木香散。若藥與食入口。卽瀉下者。名直腸瀉。難治。
本方加人參。白朮。用伏龍肝湯煎服。○憂思太過。脾
氣結。面不能升。舉陷入下焦。而成泄瀉者。逍遙散去
歸。加升麻。木香。或越鞠枳朮相和服。不應用補中益
氣。加水香。○久瀉穀道不合。或脫肛。乃元氣下陷。大
腸不行。收令而然。補中益氣。加訶子。肉果。五味。烏梅
肉爲丸。或四君子加防風。升麻。○老人消運不及。而
膨脹作瀉。九味資生丸。加木香。善飲者。加澤瀉。肉桂。

○凡瀉多因於溼。分利小水爲上。若老人氣虛下陷。又宜風藥以勝之。如補中益氣加羌防之類。或升陽除溼湯。升舉脾胃。所謂下者舉之。溼寒之勝以風平之。是也。大瀉氣脫而不知人口眼俱閉。呼吸欲絕。急灸氣海穴。大進參附輩溫補之。稍遲卽不可救。

五更瀉是腎虛失其閉藏之職也。經曰腎司開闔。腎開竅於二陰。可見腎不但治小便而大便之開闔皆腎操權也。今腎既衰。則命門之火熄而水獨治。故令入水瀉不止。其瀉每在五更天將明時必洞泄二三