

增補  
加批  
臨證指南醫案





祝三十年久痢須推飲食避忌酒客溼滯腸中。非風藥之輔佐苦味入腸。何以勝溼逐熱。久病飲食不減腸中病也。

比非煎藥所能治者。綿茵陳、香白芷、北秦皮、茯苓皮、黃柏、藿香。

某形瘦陰虧。溼熱下痢。誤投消食。反劫津液。邪未盡。津先耗。咽喉痛且瘡爛。所謂溼未罷已上燥矣。

川連 銀花 通草 黃芩 川貝

某溼熱內阻。氣分腹痛下痢。目眞黃。舌光不渴。識清裏泄濕熱。

黃芩 寒水石 川連 厚朴 奉皮 鬱金

山十五經鬱腹痛。痢紅如豆汁。生芽木錢 炒山楂錢 厚朴錢 紅麴錢 廣皮錢 猪苓錢

某夏秋痢疾。固是濕熱傷氣脾胃。氣滯後重裏急不爽。古方有連丸。取其清裏熱。必佐理氣。謂氣行斯濕熱積聚無容留矣。知母生地滋陰除熱。治陰分陽亢之火。與痢門濕熱大異。蓋滋則呆滯氣鈍。室塞宜乎。欲便不出。究竟濕熱留邪。仍在桂附熱端。又致肛墜痛如刀割。補中益氣東垣戒法。僅僅升舉下焦清陽。未能直透腸中。再用大黃重藥。兼知母生地等味。更令傷及下焦。書義謂諸痢久都屬陷傷。小腹墜忌冷。顯然是下症議與升陽。亦須下治。

人參 茯苓 泽瀉 火草 防風根 好食不熟者 芫活 細辛 生薑 大棗

某舌白渴不欲飲。心腹熱。每痢必痛。肛墜痢。又不爽。微嘔有痰。口味有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此穀氣蒸濕熱鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩躁。難鳴苦。況法當苦寒泄熱。苦辛香流氣滲泄利濕。蓋積滯有形濕與熱本

无形質耳。川連 黃芩 麝金 厚朴 猪苓 槐米 奉皮  
包先厥下利。膿血腹痛嘔惡。乃寒熱互傷。  
淡黃芩 川連 荘丹皮 生芍 炮薑 炒銀花  
陳氏溫邪經旬不解。發熱自利。神識有時不清。此邪伏厥陰。恐致變癟。

白頭翁 川連 黃芩 北秦皮 黃柏 生白芍

又溫邪誤表。劫津神昏。恐致瘻瘍。炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍 炒丹皮 女貞子  
邱姬進潤劑。痛緩積滯。知厥陰下利。宜柔宜通。血虛有風顯然。

白頭翁湯加芩芍







久病  
又屬忘其  
宣可再傷  
其津溫中  
自然不應

某自癆不渴者屬太陰。凡此之來由乎胃少納穀衝氣上逆有土敗之象勢已險篤議金匱附子粳米湯人參附子乾薑。火草粳米。脾營虛寒。長齋有年土薄氣餒加以久病少穀欲嘔脾胃之陽衰矣。由夏及今半載不痊倘忽腫脹何法施治人參白朮乾薑炮薑。丁香。扶苓。候王先生議人參附子炮薑炒梗米赤石脂。生白芍。某春病入冬。痢止腹痛食少童年那有淫慾之擾。此係寒熱不和脾胃受傷也。六君子湯加肉桂某脈沉微下痢紅紫黑舌胎粉白並不渴飲此太陰脾營虛寒也。做理陰煎當歸頭白芍炮薑。炙草扶苓益智。

唐氏下痢四十餘日形寒腹痛炒當歸生白芍肉桂炒山楂青皮扶苓人參錢。苑綠子錢。赤石脂三錢。炮薑錢。扶苓錢。木瓜錢。王十五久痢久瀉為腎病下瀉久而陰傷氣墜。四神丸治脾腎晨起辛溫香燥皆剛佐入五味酸柔不過稍製其雄烈此肛墜尻瘻乃腎液內少而氣陷矣。腥油肉食須忌熟地。禹餘糧石。五味子。蔣五一久痢用辛甘溫而效是脾陽久傷治由東垣法極是。述食血腥滑必便溏四肢忽有肉瘤營衛肉應脾胃氣血未得充復五旬外下亦法用脾腎兩補。

人參山藥茯苓湖蓮芡實補骨脂從容萸肉五味巴戟菟絲覆盆子某下痢腹痛舌乾肛墜。刺傷陰也。熟地炭炒歸身炒白芍炒魚肉扶苓炙草孫滯濁下行痛緩議養陰通腑。生地阿膠丹皮山梔猪苓澤瀉。脈左數下痢腹不甚痛。暮夜微熱所伏暑熱乘陰虛下陷是清熱理脾不效。當攝陰升陽。









二字不互通其用熱藥病根在此天陰人有陰暑亦熟豈非笑

比攻病保真理難捉摸矣。

川連

黃芩

草決明

石蓮子

烏梅

白芍

痢症古名帶下。惟夏秋暑濕挾積者居多。其次則風淫火迫寒侵也。推之燥氣獨不為患。攻前法悉有定例。不必再述。至於暑者有陰暑陽暑之分。其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧。加以貪涼喜冷。鬱折生陽。故主於溫。陽暑由於天之熱。伏阻氣化。濁則重於清。而醫之下手工夫。於此須細心認定。但邪之來也。似水之流。臟腑間一有罅隙。則乘虛而著。故有在氣在血之分。傷臟傷腑之異。若表之邪鬱。而氣機下流不息者。喻氏論人參敗毒散。裏之積癰。而寒熱交粘者。潔古立芍藥湯。在氣分有苦辛調氣。與辛甘益氣等法。在血分有酸苦行血及鹹柔養血諸方。若表症急從乎三陽。有桂枝湯。葛根芩連湯。小柴胡湯。裏勢實。專究脾胃。有小承氣湯。溫脾湯。總之治腑以三焦見症為憑。治臟以足三陰為要領。辨得虛實之情形。酌以或通或滯之法。則臨症權宜庶乎不錯矣。但是症不治之條甚多。最難愈者。莫如休息。攻補之法。非一。予亦不贅。最危險者。莫如噤口痢。却有兩端。若因暑濕外充。格拒三焦者。氣機皆逆。傳而閉上。下之勢渾如兩截。若治不得其要。則邪無出路。正立消亡。此丹溪立法最高。後世都宗其旨。先生又借用半夏瀉心湯。減去守中之品。取補以運之。辛以開之。苦以降之。與病情尤為亢協。所以先生之見長。是集之奧妙。每每在此。又因脾胃之陽素虛。陰邪從中而下者。先傷太陰。繼傷少陰。闢大開。痛泄無度。戊癸少化火之機。命陽無蒸發之力。此不飢不食為嘔為脹。理宜然矣。與邪多積熱之候相比。絕然不同。參之仲景理中湯。腎氣丸。及景岳理陰煎。胃蘭煎等法可也。吾鄉姚頤真先生。化出捷徑良法。以大劑葛根配入參歸薑附桂製白芍之類治之。靡不應手而愈。想從容之性。溫能達下。鹹可利胃。質之柔順。以補陽中之陰。較地黃阿膠尤勝。與之腸膏竭。絡脈結滯而痛者。堪稱神品。自此推崇。用活甚多。若曰某方某藥。但治某症。不知活用。反稱杜撰。則禁絕後人靈活之心。無從施發矣。邵新甫○夏秋之病。總由濕熱。積滯日暮中合法者。亦甚多。遇老年及久痢。即混入陰經治法。并參附為海五味等全不對症。隨筆亂書。并與案中之論。亦自己相背。想是督氣使然。抑此中實無定見也。後人竟用溫補以為本之。此老殺人無算。觸目傷懷。

濕熱

鄭

夏至後濕熱內蒸。腸風復來。議酸苦法。

便血

此乃痔血名。不知天名者。以百計。不特此老。此不知。我見一醫。為一劇。

某脈右數。形色蒼黑。體質多熱。復受長夏濕熱內蒸。水穀氣壅。血從便下。法以苦寒。佐以辛溫。薄味經月。月陰久鬱化熱。熟入絡血。必自下。但體質仍屬陽虛。凡腸紅成方。每多苦寒。若臟連之類。於體未合。母欲速也。  
真病愈。茅木 川連 黃芩 厚朴 荆芥炭 菊花炭 又駁車丸二錢。  
程年老疾。飲哮喘。不得安卧。以辛溫通陽劫飲而愈。知脾陽內弱。運動失職。水穀氣蒸。飲邪由濕而成。濕屬扶苓 泽瀉 地榆炭 槐米。  
程七十脈沉實。後下血。少年淳朴得此。乃食物不和。腸絡空隙所滲。與升降法。  
俞陽虛腸工同寫。議劫胃水。理中換生茅木。生厚朴附子炭。炮薑。桑葉。丹皮。  
又脈緩濡弱。陽氣不足。過飲濕勝。大便溏滑。似乎不禁。便後血色紅紫。兼有成塊而下。論理是少陰腎臟失司。固攝而陽明胃脈但開無合矣。從來治腑以通為補。與治臟補法迥異。先擬緩胃通陽一法。

程三食入不化。飲酒厚味即瀉。而腸血未止。蓋陽微健運失職。酒食氣蒸。濕聚陽鬱。脾陽清陽日陷矣。議用東垣升陽法。人參 茅木 廣皮 焦术 炒當歸 炒白芍 炙草 防風根 防風  
某陽虛體質。食入不化。飲酒厚味即瀉。而腸血未止。蓋陽微健運失職。酒食氣蒸。濕聚陽鬱。脾陽清陽日陷矣。當從謙甫先生法。人參二錢 煨乾薑二錢 附子三錢 茅木五錢 升麻三錢 歸身錢 白术錢 厚朴錢。  
扶神半錢 廣皮二錢 焦草二錢 葛根二錢 白芍半錢 益智半錢 地榆三錢 神曲錢 右藥各製  
蜜漿湯丸。  
劉六鬱怒腸紅復來。木火乘腑絡腹中微痛。議與和陰。  
冬桑葉 冬皮 生白芍 黑山梔 廣皮 乾荷葉邊 生穀芽





陰虛  
血濁勞傷  
營衛

姚歸序。歸民建中湯

某腸紅粘滯。四年不痊。陰氣致陽。肛墜刺痛。大便不爽。藥難驟功。當以潤劑通腑。

生地。稽豆皮。查肉。麻仁。冬葵子。歸鬚。

唐七內經以陰格傷則血內溢。蓋燒酒氣雄。擾動臟絡取血之所。雖得小愈。而神采爪甲不榮。猶是血脫之色。  
肛墜便甚。治在脾腎。以脾為攝血之司。腎主攝納之柄故也。  
序。晚歸脾去木香。

早六味去丹澤加五味。父實蓮內阿膠丸。

沈五酒濕污血。皆脾胃柔膩主病。當與剛藥。黑地黃丸。

凡脾胃為柔膩。可與剛藥。心肝為剛膩。可受柔藥。不可不知。謙甫治此症。立法以平胃散作主。加桂附乾薑歸芍。重加炒地榆。以收下濕用之神效。即此意也。

吳二腹痛下血。食茅蕡豆漿而愈。乃泄肺導濕之藥。既愈以來。復有筋骨痠楚。寒熱夜卧。口乾。乃濕去氣泄。陽明脈乏。不主用事。營衛失度。津液不升。之象。天真丸主之。去人參。

支六痔血久下。肌肉痿黃。乃血脫氣餒。漸加喘促浮腫。再延腹脹。便不可為。此症臟陰有寒。腑陽有熱。詳於金匱穀疸篇中。極難調治。

人參。焦木。茯苓。炒菟絲子。廣皮。生益智。木瓜。

楊四中年形勞氣餒。陰中之陽不足。且便血已多。以溫養固下。男子有年。下先虛也。

人參。茯苓。歸身。淡蕘蓉。補骨脂。巴戟。炒遠志。生精羊內熬膏丸服。五錢。

陳田三久矣。晨泄腹痛。近日有紅積。此屬腎虛。補骨脂。大茴香。五味。茯苓。生菟絲。

進青囊斑龍丸。峻補玉堂。關元。暮服歸脾膏。涵養營陰。守之經年。形體自固。

鹿茸。赤白茯苓。

鹿角霜。補骨脂。胡桃肉。鹽湯。

柏子仁。蒸熟地。桑乾。

韭子。菟絲子。葛根。

右溶膏煉蜜為丸。每服五錢。用鹽湯送。