

外科正宗卷

秋



重訂外科正宗目錄

卷之一

崇川陳實功毓仁父纂著

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽牛陰牛陽症第五

癰疽五善歌第六

癰疽七症歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病主治不詞論第十二

調理須知第十三

雜忌須知第十四

卷之三

癰疽圖形第十五

附癰疽諸病瘡名于後

癰疽論第十六

疔瘡論第十七

脫疽論第十八

瘰癧論第十九

贅疽論第二十

咽喉論第二十一

時毒論第二十二

瘰癧論第二十三

肺癰論第二十四

卷之三

流注論第二十五

乳癰論第二十六

附乳岩

附骨疽論第二十七

附鶴膝風

腸癰論第二十八

臟毒論第二十九

痔瘡論第三十

下疳論第三十一

魚口便毒論第三十二

囊癰論第三十三

懸癰論第三十四

腎癰論第三十五

楊梅瘡論第三十六

結毒論第三十七

多骨疽論第三十八

卷之四

陰瘡論第三十九

傷寒發頤第四十

癰疽第四十一

瘰癧第四十二

小腹癰第四十三

鵠口疽第四十四

龍泉疽虎鬚毒第四十五

石榴疽第四十六

穿骨疽第四十七

大麻風第四十八

翻花瘡第四十九

腋癰第五十

脇癰第五十一

鼻痔第五十二

骨槽風第五十三

紫白癰風第五十四

齒病第五十五

腦漏第五十六

破傷風第五十七

跌撲第五十八

金瘡第五十九

杖瘡第六十

湯火燒第六十一

甲疽第六十二

齒痛第六十三

疳疔第六十四

天蛇毒第六十五

頭痛第六十六

合谷毒第六十七

鼻出血第六十八

牙縫出血第六十九

血箭血痣第七十

鵝掌風第七十一

腎囊風第七十二

疥瘡第七十三

癩瘡第七十四

血風瘡第七十五

頑癬第七十六

膿窠瘡第七十七

凍風第七十八

火丹第七十九

天泡第八十

肺風粉刺酒皰鼻第廿一

雀斑第廿二

油風第廿三

白屑風第廿四

耳病第廿五

漆瘡第廿六

竹木刺第廿七

瘰癧第廿八

疔瘡第廿九

痰包第卅

癩風第卅一

溼腫第卅二

咬傷第卅三

風犬瘡第卅四

女人面生黧黑斑第卅五

鈕扣風第卅六

枯筋箭第卅七

婦人脚丫作癢第卅八

手足破裂第九十九

眼丹第一百

黑子第一百

眼胞菌毒第一百二

體氣第一百三

白禿癢第一百四

奶癬第一百五

鰓拱頭第一百六

小兒遺毒爛斑第一百七

螻蛄串第一百八

小兒痘風瘡第一百九

小兒赤遊丹第一百十

走馬疳第一百十一

重舌第一百十二

胎瘤第一百十三

鵝口瘡第一百十四

痘癰第一百十五

痘疔第一百十六

黃水瘡第一百十七

大人口破第一百十八

鼻田螺第一百十九

牛程躑第一百二十

僵螂蚌第一百二十一

田螺泡第一百二十二

膠痛第一百二十三

陰風第一百二十四

葡萄疫第一百二十五

百虫入耳第一百二十六

惡蟲叮咬第一百二十七

人面瘡第一百二十八

喉吞

針鐵骨
嘆咽喉

第一百二十九

中砒毒第一百三十

落下頰拿法第一百三十一

救

自剔
斷喉

法第一百三十二

陰毒第一百三十三

失榮症第一百三十四

試知百病死生法第一百三十五

普濟神效法第一百三十六

仙方活命
今古不同

第一百三十七

拾遺症第一百三十八

唇風第一百三十九

綳縛背瘡第一百四十

癰疽內肉不合第一百四十一

煉元明粉第一百四十二

取紅鉛法第一百四十三

煉金頂砒法第一百四十四

煉硝石法第一百四十五

取蟾酥法第一百四十六

製附子法第一百四十七

昇白靈藥法第一百四十八

製寒食麴法第一百四十九

逐日人神歌第一百五十

十二時人神歌第一百五十一

尻神歌第一百五十二

製炒諸藥第一百五十三

醫家五戒第一百五十四

醫家十要第一百五十五

開割披針喉針形第一百五十六

汗斑方第一百五十七

重訂外科正宗目次終

新刊外科正宗卷之三

下部癰毒門

流注論第二十五

夫流注者流者行也乃氣血之壯目無停息之機注者住也因氣血之衰是有疑滯之患故行者由其自然住者由其瘀滯其形漫腫無頭皮色不變所發毋論穴道隨處可生凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調理夏秋露卧縱意取涼熱体當風因身快爽或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又或腦怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆轉因裏又或跌打損傷瘀血凝滯成產後惡露未盡流縮經絡此等種種皆成斯疾也既成

嘉川

陳實功疏仁父

纂著

之後當分表裏寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒胸中表
症發散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外侵者
五積散加附子溫之勞傷鬱怒思慮傷脾而成者歸脾湯加香
附青皮散之跌撲傷損瘀血凝滯而成者復元活血湯逐之產
後惡露未盡流注經絡而成木香流氣飲導之此皆初起將成
之法一服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦有可消
者十中五六如服前藥不得內消者法當大養氣血培助脾胃
溫暖經絡通行關節木香流氣飲十金大補湯俱如熟附子香
附培助根本此則未成者自消已成者自潰已潰者自斂而終
無殘敗破漏不斂之症且如有膿宜急開之患者又當慎起居

戒七情遠寒就溫俱可保全若誤用寒涼克伐內消等藥終至
不救者多矣

流注看法

初起漫腫皮色光亮微熱微疼筋骨不欠強者爲順已成身體微
熱飲食有味疼痛有時腫生紅色者順已潰膿稠而黃腫消有止
身體輕便起坐如常者順潰後內肉易生膿水易止精神易復膿
日易合者順初起身體發熱脈細而數皮色微腫痛徹筋骨者險
已成飲食少思日乾作渴身體疼痛四肢沉重者險已潰膿水清
稀腫仍不消虛熱不退疼痛不減者逆潰後膿穢不止肌人疫削
飲食不食發熱皮靨者

流注治法

初起風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃跌撲閃內瘀血凝滯爲患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋攣骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退小柴胡湯加川芎之

花柳枯槁連翹二服餘熱頓退又以二陳湯加枳梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不寢寒熱交作至夜尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消以琥珀膏敷之三次其腫消痛止漸漸而平

一婦人因怒脇下結腫近半年方痛此得之肝氣鬱結症以木香流氣飲四服其腫漸紅此日久病必欲作膿不可內消又以十全大補湯加木香七附青皮十餘服其腫漸高又以本方加皂角刺五服其膿乃潰且清且多此勞中所得者元氣已經虧損其膿故多而清以入參養榮湯加熟附子月餘膿稠且少又本

方倍參芪歸朮兩月而愈

男子元氣素虛因暴怒脾生腫塊疼痛牽強寒熱往來飲食日減以補中益氣湯加香附貝母十餘服寒熱漸止又以益氣養榮湯月餘而腫潰間以八珍湯服之外用香附餅日炙二次脾胃健而安

婦人項間乳上各腫一塊將近一年漸大方痛診之脈細數而無力此思內過傷之病也以歸脾湯加桔梗香附十餘服其腫漸高外以琥珀膏敷之腫頂紅色欲其作膿又以十全大補湯加桔梗貝母服之半月膿熟針之後頭腐膿清虛熱復作食少不睡仍以戶脾湯間以逍遙散服之三月而愈