

增補洪氏女科一盤珠下卷

金川邑庠生洪金鼎王友氏纂男謙

洛泰訂

產育門類

并附方脉叔和

論三條

欲產之婦脉離經

是脉歇至也

沉細而滑也同名夜半覺來應

分誕來朝日午定知生

欲產之脉必離經離經之脉認

分明其來大小不調勻或如雀啄屋漏應腰疼腹痛眼生

花產在須臾却非病

新產之脉緩滑吉實大絃急死來

侵若得重沉小者吉忽來堅牢命不停寸口澁疾不調死

沉細附骨不絕生審看症候分明記常將此念註心經

臨產吉凶脉訣

身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青陰陽兩虛及舌上冷

子當死。腹中須遣母歸冥。面赤舌青細尋看。母活子死定。然斷唇口俱青沫又來。母子俱死總高判。面青舌赤沫又頻。母死子活自分明。不信若能看應驗。方知先哲不虛陳。

臨產要論

臨產總看血盈虛。再加藥力以相扶。血足潤腸胎易下。血虛胎澁不能蘇。血生培。養血氣。為真訣。催生湯藥莫忙沽。

臨產六字訣

一曰睡。

二曰忍痛。

三曰慢臨盆。

將產未產真偽辨

一胎未滿月。胞水不破。先下血者。此是傷胎。非產也。宜服保元湯。隨服八珍湯。胎即安。不安再服。

黃芪二錢密炒人參一錢當歸五錢童便為引

八珍湯 人參一錢當歸三錢熟地三錢乾白芍酒炒白朮土炒

茯苓去皮甘州密水川芎各錢半外續斷阿膠各二錢

蒲黃炒京墨為引。

一胎未滿月先破水。腰不痛。名試水。症非產也。宜服八珍

湯。加杜仲。故芷。益母草。服數帖。俟月足自易產。

一惡露少者。雖久不妨。此胞水未破。不宜用大力。早宜安

睡。內服佛手散。以生血。水破即生。

一胞水先破。惡露行盡。數日不生者。血虛也。宜服八珍湯

佛手散。不可速用。催生藥。方見前。

一腰痛甚。水破者。將產也。以胎繫于腎。故也。宜服佛手散。加益母草。

一 臨產胞水惡露已盡。此胞衣久破。其血已涸。致兒乾攢。

宜服佛手散。又名君臣散。當歸兩。川芎錢六。外錢五。加益母草錢五。人參錢五。五分。

又方 佛手散。加蜜糖半盞。生用。麻油半盃為引。

一 婦人臨產。數日不下。下半身俱冷。貧窘無藥。令取花椒

藥。橙葉。吳干。共煎湯一盆。令產婦以小橈坐盆內。薰洗

良久。小腹皆煖。氣溫血行。遂生。

一 兒未生。先露手足。謂之逆生。非吉兆也。古方用綉花針

將兒手足。二針下。兒得驚一縮。又以其食。手足心使老成穩

婆。緩人推入。產母久睡。不縮。又推。非推。難恃藥力之功。

蟠腸生論

或問蟠腸生。是何緣故。曰。是用力之過。產母平日氣虛。臨

時用力努，揮渾身氣血下注，以致腸隨兒下。一次如此，下次復如此。若能等待瓜熟蒂落，何得有異怪之事耶？

一方治蟠腸生：用大紙條一個，以麻油潤透，火點燃吹滅，以煙薰產婦鼻孔，生腸即上。

又方：生腸出，以潔淨滌器，濃煎黃芪湯浸之，腸即上。

又方：以通關散吹鼻，得嚏數聲，腸即上。

方見婦媛中風門。

催產經驗方

臨產之時有主方，催生甚穩，佛手散當歸

六錢川芎四五錢益

母水煎膏，

用黃牛糞調敷母腹一炷香，少頃扶起即下。

催生神效方

急救產婦有神方：一、鐘好酒與蜜糖，麻油童便雞子白。

煎熱服最為良。

保產應驗方

縣王王婦德刊傳。予撰歌訣。以讀記。

川朴傳來用_此。當歸川芎。鐵增貝母。鬼系同白芍。黃芪_生。

各錢。荆芥_分枳殼_六。羌活甘草艾葉_{分五}煎等分不宜多加。

戒依方取用是真詮。胎動即安生即下。死胎奇效若神仙。

滑胎枳殼散

湖陽公主產難當。南山道人進一方。一兩甘艸枳殼二為

末服之立刻康。

經驗滑胎散

胎乾凝滯不能生。蜜糖半盞麻油煎。_{各用}滑石一兩為細

末徐徐調吃即安然。

死胎論

凡子死腹中。多因傷觸跌撲。或胞破血乾。日久困憊。但察
母腹飽脹。面赤舌黑。或下血塊。其子已死。或為嘔吐。或穢
氣上冲。皆子死之症。宜速用下死胎方下之。下後察其虛
實。隨加調補。自愈。若唇舌面色俱青。則子母皆危之兆也。

下死胎方

丹方

鮮紅花兩。以酒煮汁飲之。即下。

又方。

當歸

兩

川朴錢三。陳皮錢三。

酒

水各半。煎一

加朴硝

錢五

再煎

熱服。即下。

千金去胎方

麴麴一升。酒煮二

下胎小品

麥芽

一斤

搗碎

水二碗

煮一

碗服之

其胎如糜

毋無所苦

廣濟下胎方

花粉

肉桂

牛

文

錢

豆

錢

水煎服。

一盤朱

卷

下死胎古方

蒼朮

陳皮

川朴

甘艸

錢各三

酒水各

半煎熟入芒硝三錢再煎服死胎即化為水而出。

又方下死胎

芒硝

三錢

當歸

兩一川芎

六錢

童便半碗水煎服

交骨不開

治

初產體實者。

交骨不開也不難。當歸川芎炙龜板取來亂髮燒存性指

甲川山皆要辨名為五虎下西川水煎熱服骨自散

右藥歸芎各

兩

川

山人

指足

頭髮俱燒

各一錢

錢

錢

錢

又方

治交骨不開血氣虛者。

當歸

兩一

川芎

錢一

錢

錢

龜板灰

六分

人參

五分

水煎吃。

以熱童便催之。

此方能

助氣血開闢之功立致也。若見咬牙昏憤急

熱童

便灌醒速進十全大補湯培養精神遲則不能救矣

外冷丹方 用熟黃芪二兩煎湯薰洗。

又方 用荊芥藿香椿根皮煎湯薰洗。

胞衣不下

產後何症最爲急。胞衣不下。飽悶極。皆因惡露脹。胞中漸
冲。心上痛。不息。若喘滿時定。主凶。脫衣散用。爲中的。牛膝
木通各三錢。歸尾枳殼二錢入。化石二錢。葵子二。水煎熱
服。應有益。產母自啣頭髮尾。得嘔噦時。胞自出。外用鞋底
炙熱來。乘熱產丹小腹熨。又有單方。鉄秤錘燒。酒紅滓產母吃
異人傳授一單方。半盞好酒與蜜糖。麻油重便各半盞。芒
硝三錢加入。良薑歸牛膝二錢半。一同煎吃。自安康。
又有單方。又見奇。只用雞頭蓮葉一枚。煎吃。一半下一半。

全用全下又何疑。瘀血脹胞不能出。人參三分不可忽。更加蘇木用三錢童便一盞同煎沸。外用灶心土為末。醋調塗腹胞自出。古方只用失笑散。欲下胞衣也不難。蒲黃靈芝共為末。破血破氣無憂患。

氣虛血弱不能送。也不脹兮也不痛。大補氣血助其功。惟有決津煎可用。當歸澤瀉川牛膝。肉桂地黃烏藥共。

產門不開

產門不開氣血虧。補中益氣最合宜。加入黑姜一錢半。管教門閉不須疑。方載腫脹疼痛加丹皮黑枝仁各六分。

產後四大方

產後總宜大補益。寒涼攻伐害非一。雜症皆為末。病看培。

養元氣為中的。三日之內宜行血。熟地白芍忌酸收。黑神散與生花湯。生新化舊二方求歸朮保產併回生。四方斟酌不須憂。

生化湯 產後王方。生新血。化汚血。極平極穩。當歸六錢。

川芎 四錢 黑姜 五錢 桃仁 五分 去皮尖 五分 甘艸 五錢 腹痛已止。去

桃仁再服數劑尤妙。水煎加酒一鐘。童便一鐘。

黑神散 產後王方。治惡露未盡。腹痛等症。甘艸二錢。黑

姜一錢 肉桂 一錢 熟地 四錢 白芍 三錢 酒炒 二錢 三錢 當

歸朮 四錢 蒲黃 三錢 炒黑姜 為引 宜服 生新化湯較勝黑神散

歸朮保產湯 產後王方。三五日服。當歸川芎白朮土黑

姜 灰各半 白芍 酒炒 生地 各七分 陳皮 香附 各五分 甘草 一

回生丹 治婦人死胎不下及產後諸疾汚穢未盡等症

製大黃膏法 用蘇木三兩河水五煎至三碗去渣紅

花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘沸去渣黑豆三升

存汁三碗存豆去皮晒乾為末聽大黃一斤用好醋碗八熬

成膏次下紅花酒蘇木湯黑豆汁攪勻又熬成膏以

磁盆收貯定將鍋焦焙乾為末入後藥同磨之

人參 白木土青皮 木瓜各三當歸 川芎玄胡

蒼朮 香附 蒲黃 赤苓 桃仁 熟地各一兩

牛夕 三稜 東皮 靈芝 地榆 甘艸 羌活

陳皮 白芍各五錢良姜四錢烏藥二兩木香 爾香

沒藥各二錢右藥共為末用前大黃膏和為丸計重二錢

每服一丸神效。一方加益母草馬鞭草五錢秋葵子三分尤妙。

產後諸証論列于後

一產畢血暈用薄荷湯調服此丸。

一產後七日氣血未定因食物與血結聚胸中口渴心煩

滾水調服此丸。

一產後血入心肺熱入脾胃寒熱似瘧實非瘧也。滾水調服此丸。

一產後敗血走注四肢化為浮腫乃血腫非水腫也宜連

服二三丸。

一產後敗血冲心言語顛狂非風邪也宜服此丸。

一產後敗血流入心孔閉塞失音用菊花三分桔梗三分

煎湯調吃此丸。

一產後悞食生冷滯物流入大腸不得剋化傳成痢疾用
山查煎湯服此丸

一產後餘血流入小腸閉塞水道小便溺血用木通四分
煎湯調服此丸

一產後餘血流入大腸閉澀肛門有瘀血成塊用陳皮三
分煎湯調服此丸

一小便澀大便閉乍寒乍熱如醉如痴宜服此丸

一產後敗血入五臟六腑并走肌膚四肢面黃口渴鼻中
流血遍身斑點危症也陳酒化服此丸可愈

已上諸症皆產後敗血為害也此丸大有奇功至產後一
切奇症醫人所不識但服此丸無不立安必效無疑矣

胎前常服回生丹壯氣養胎滋陰順產調和臟腑平理陰

陽更為神妙

先賢此條議論但施之體實胎者則可體虛者恐墮胎矣慎之

一室女閉經月水不調並宜服回生丹

婦此回生一丹不知始自何人徧考醫書所列不過二三次長葛孫奎臺經驗較予所傳之方尚有所缺法製湯引疑亦未講明予特詳述之以脩後之參考

產後血暈

人產後血暈迷神昏口噤令人悲快把秤鏹用小鐵秤鏹紅

一煨醋淋對鼻急薰之單方速取熱童便徐徐灌下又何

清炒黑三錢荊芥穗為末調吃更為奇以童便調吃

魂散治血暈不省人事澤蘭荊芥穗川芎各

錢二石菖蒲生蒲黃黑姜灰生甘草各三分童便為引。

生笑散治血暈五靈芝蒲黃各三錢為末水調服。

龍牙清魂散治產後去血過多虛暈譫語或言鬼神出。

此腔野調拋磚弄石不認親人多不治惟此方可以挽回。

龍齒火煨為末志肉甘當歸茯神去骨各一錢麥冬去心人。

參各五分肉桂玄胡細心甘草各四分薑東引。

益母九治血暈譫語此方極平穩多效。

益母艸一兩炒為末用薄荷湯童便調服。

加味平胃散治產後敗血冲胃惟昏沉飽脹嘔吐是也。

蒼木陳皮厚朴甘草各一錢黑姜灰肉桂各五分。

又單方治血暈神效上上蝟真沒藥二味各三錢為末。