

徐氏醫學十六種

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

脉訣啓悟註釋目錄

診法

浮脉

沉脉

遲脉

數脉

滑脉

濡脉

虛脉

實脉

長脉

短脉

洪脉

微脉

緊脉

緩脉

芤脉

弦脉

革脉

牢脉

濡脉

弱脉

散脉

細脉

伏脉

動脈

促脈

結脈

代脈

疾脈

英江徐靈胎著

診法

脉為血脈中氣血之先。

言脉非氣非血乃氣血之元神也。先先者氣血之元神也。

脉之隧道。

言隧道乃氣息應馬脈溫氣動息之所由氣息應馬脈溫氣動息之至數

應資始於腎。

腎主先天一氣之始。而腎即資生于此。

脉之隧道。

不息盡行陽二十五度夜行陰二十度一晝夜運行五十度周於身。

寸口該寸闊尺兩手六部屬肺肺為藏府華蓋藏府有脉之朝宗

十二經中十二經皆有動脈獨寸闊尺位惟手太陰經動脈寸

口取決。

病無不薰蒸之故不診諸經動脈而獨取決於寸口。

脉之大會。

脉為百脉之朝宗

息之出入。

生息之出入氣

出陽入陰合

手足陰陽吸入腎肝脾主中州氣息應也。

脉來四至。

吸之間脉來四至是為平脉

以太息低氣息有高

長短呼吸間有一息長者謂之太息太息之間如歲月之間

脉來五至。

息之長脉來五至亦為平脉

呼吸既定往來既定

合為一息。

呼為一息

日夜一萬。

日夜一千五百息

呼吸之間。

一呼脉再至氣行三寸

脉行六寸。

合呼吸之計

八百十丈。

脉行六寸

合日夜一萬三千五百息計之

脉。

日夜為準一日一夜脉行無不準此

平旦為準。

氣血未亂脈絡調匀

行八百一十丈當五十周于身。

一日一呼脉行無不準此

平旦為準。

氣血未亂脈絡調匀

虛靜凝神虛心靜意調息細審

聚散神明調息細審。

調息細審之人之氣息

診病人之脉

診病人令仰其掌令其手

掌上掌後高骨

掌後高骨之端

是名關上即是關

審位既確。

審的關可以布指即可分疎密得宜

布指疎密得宜各得其宜

部布指輕

重布指診脈當分輕重各自不同輕重之間意各不同

曰舉按尋。

輕取曰舉重取消息從容

消息病脈前

關前為陽關後

為陰關脈

陽寸陰尺下為陰關界子中為陰陽之界

先後推尋先關後寸及尺推

男子之脉屬陽左

半為陰陽女人之脉屬陰右大為順右行男尺恒虛

為主。

女以陰陽弱陰強女子尺脉盛

男子尺脉虛

大為川左行女人之脉屬陰右大為順右行男尺恒虛

為主。

女以陰陽弱陰強女子尺脉盛

男子尺脉虛

反此則病。反此經常。闕前一分。為陽人命之主。

陽為生氣。係人性命之主。

左偏緊盛。左脉偏見緊盛。

傷寒在表。寒邪傳裏。

右偏緊盛。右脉偏見緊盛。

傷寒在裏。寒邪傳表。

右脉偏食傷裏。故食神門屬腎。乃診腎兩在闕後。眞後有二脉。兩尺無脉。必死不救。無藥可救。脉見緊盛。傷食傷裏。故胃神門屬脾。脈部分兩在闕後。眞後有二脉。兩尺無脉。必死不救。足絕必死。

有七診。

七種診法曰浮中沉。

浮候中。上下左右。

自尺至寸。為上自寸至尺。

為下陰根子。左陽根於右。

七法推尋。以明診法。

又有九候。

九候脈有

即浮中沉。即浮中三候。三部各三寸。三寸闕尺三部合而為名。合三部各有三候。

各有三候。每候五十動。而不

為九候之名。一止者是藏氣完固。乃

為陽脉來止歇為止。止者為陰。下者為陽。下者為陰。根於左。根於右。

七法推尋。以明診法。

又有九候。

九候脈有

即浮中沉。即浮中三候。三部各三寸。三寸闕尺三部合而為名。而為九候之名。

每候五十動。而不

為九候之名。此脈經中深奧之旨。診家之要領也。

包絡與心。手少陰心包。

左寸。

左外以候小腸膀胱。

左尺為應。

應診在膽與肝脉。足少陽胆左闕所應。

應診在膀胱小腸。足太陽膀胱足下。

左尺為應。

應診在胸中。

左足太陽小腸。

左足少陰心包。

左足太陽小腸。

及肺。手太陰肺與胸中。

右寸之應。

應診在胃與脾脉。

足太陰脾應在右闕。

右闕在命門。

大腸與命門。

應在右尺。

應診在尺內兩傍。兩尺皆應腎兩傍。

則季脇也。

則法也。言診法也。季脇在脇下之嫩骨。

處李脇在兩脇之傍。故尺亦主之矣。

左外以候小腸膀胱。

左足太陽小腸。

左足太陽膀胱。

右足太陽小腸。指足脉內外言。

足太陽膀胱。

內以候真陰腎水。

內沉分也在尺之沉分。

右外以候大腸。

右足太陽大腸。

右足太陽膀胱。

膀胱外浮分也。左尺之浮分以診。

內以候腎。

腎水。

以診足少陰腎藏真陰。

左外以候小腸膀胱。

左足太陽小腸。

左足太陽膀胱。

陽明大腸。魄門也。

內以候真陽相火。

右足之沉分以診。

命門之真陽附上。

附上為闕。左外以候膽。

足陽少膽。

內以候腸。

足厥陰肝。

右外以候胃。

右足陽明胃。

內以候脾。

右足太陰脾。

中附上。

附上為寸。左內以候心。

左寸之沉分以診。

足厥陰心包。

外以候膻中。

膻中者心包絡之別名。

左寸。

外以候膻中。

足厥陰心包。

陰心少外以候膻中。

膻中者心包絡之別名。

左寸之浮分以診。

足厥陰心包。

右內以候膻中。

膻中者心包絡之別名。

右足太陽膀胱。

受氣中前以候前。陽明行于前闕前。

診太陽陽明之病。後以候後。

診太陽寒水之病。

上竟上者。

足太陽寒水之病。

病在下竟下。

月經。

者。脈氣少腹腰股膝胫足中事也。

股脛膝足中推而外之。以向外之。

推脈氣內而不內。脉得身有熱也。

脉浮為推在。

推而上之。脉氣上而不下。脉氣竟腰足清也。

月經。

月經。

手起伏皆為死脉。診得絕脈，不拘十指，吉凶順逆皆主死。細載於經，詳著脈經，奇經八脉，二經中衡任督帶。任主胞胎，為諸脈之承任。督行於背，為諸脈之總督。陰維為諸陰脈之維繫，陰蹻主諸陰脈之蹻捷。高章綱為帶脈，環脈為諸脈之約束。陰維為諸陽脈之維繫，陰蹻為諸陽脈之蹻捷。高章綱為陽蹻之網，牒單損為不足。牒單為諸陰脈之損，二十八脉，診病條分於後，分晰條陰蹻之損，二十八脉，診病條分於後，分晰條。

脉之體象

浮脉

浮在皮毛。浮在皮毛之內，輕取脈即應，指如水漂木。喻水中漂木言。言脈在浮分也。舉之有餘，輕取曰舉。按之不足，重取曰按。勢即減，非虛脈也。

主病

浮為風為表

浮脉為陽。浮為陽脉，風邪在表。表受風邪，表無見證。無頭痛發熱，乃為陽盛。症必口燥舌乾，脈必浮盛，有力浮虛血虛。脉若虛浮帶數，陰虛浮豁散亂，是無根。脉既無根，症必難治。

寸闊尺

兩手六部

右寸脈浮。右寸應肺，主分佈衛氣。肺受風邪則浮，傷風鼻塞。風傷衛氣則肺失分佈而肺氣逆，故鼻塞。左寸脈見于右寸者邪遍周分，則六脈皆浮。傷寒之表，乃為陽盛。症必口燥舌乾，脈必浮盛，有力浮虛血虛。脉若虛浮，寸若邪過，營分則脉必浮，而兼緊。左傷寒，頭痛，寒邪傷表，則清氣不得升，而頭痛。左關脉浮。左關應肝膽，肝屬厥陰，而筋骨腎，故名左關。肝氣犯胃，則脈浮。肝氣犯脾，則脾虛，不能食而泄。右關脉浮。右關應脾胃，胃主納穀，脾主運化。胃經受風，則不能食而泄。主寒，熱，脹，痛，癰，血，泄之症。右尺脉浮。右尺應命門，腎命受風，則真氣下泄。左尺脉浮。左尺應腎膀胱，小便不利，為熱結膀胱，小便自利，為血結膀胱受風。為太陽之府，小腸應太陽之經，腎藏受風，則腰痛，小腸受風，則溺血淋，濁膀胱受風。隨經瘀熱，入裏，則小腹急結，小便不利，為熱結膀胱，小腹結硬，小便自利，為血結膀胱受風。

不足。血少之故。見太陽一經。咸以浮為本脈一部不速。虛實懸殊。亦有六脈浮遲而表熱裏寒。下利清穀者。雖始病有熱。可驗太陽。其治與少陰之虛陽發露不異。又有下後仍浮。或兼促兼弦。兼緊。兼數之類。總由表邪未盡。乃有結胸咽痛脇急頭痛之變。端詳結胸藏結及痞之證。皆為下早。表邪內陷所致。究其脉雖變異。必有一部見浮。死生虛實之機。在關上沉細緊小之甚。與不甚耳。惟陽明府熱攻脾脈。雖浮大心下反硬者。急當下之。所謂從證不從脉也。其在三陰。都無浮脈。惟陰盡復陽。微愈足溫而脉浮者。皆為愈證。故太陰例。有手足溫。身體重。而脉浮者。少陰例。有陽微陰浮者。厥陰例。有脉浮為欲愈。不浮為未愈者。須知陽病浮遲。兼見裏證。合從陰治。陰病脉浮。證顯陽回。合從陽治。幾微消息。當不越於聖度也。近世為尚文浮中沉三法。舉世共推。雖卓章已見。究其所云。不論脉之浮沉遲數。但以按之無力。重按全無者。便是陰證。曷知按之無力者。乃虛散之脈。與浮何損者哉。逮夫雜證之脉浮者。皆為風象。如類中風痱之脉浮。喘效痞滿之脉浮。煩躁衄血之脉浮。風水皮水之脉浮。消渴便血之脉浮。泄瀉膿血之脉浮。如上種種。或與證相符。或與證乖互。咸可治癒。惟內經有腸澼下白沫。脉沉則生。脉浮則死之例。然風水乘脾之證。初起多有浮脈。可用升散而愈者。當知陰病見陽脈者生。非若沉細虛微之反見狂妄躁渴。難於圖治也。

沉脉

沉行筋骨。沉脉在筋骨之間。如水投石。言石投水中。喻其脉重取脈乃應手。在沉分而不浮也。

按之有餘。按之脉氣有餘。沉脉之象。舉之不足。輕取無有。

不分而
不浮

主病沉為陰為裏

沉脈為陰脉，伏在裡，無伏，亦無之。但只為氣滯鬱結之脉，若屬虛寒，裏實之疾，兼服辨治。以沉脈兼象辨別其虛實為治。

寸闕尺

右寸脈沉

沉為逆肺病喘歎。肺苦氣上逆氣逆氣逆則痰升而喘歎。

左寸脈沉

沉為暴怒傷營。暴恚氣鬪營陰暗傷。

左闕脈沉

氣鬪肝膽氣

結。如傷肝鬱氣不舒，右闕脈沉

沉為中滿食滯。中滿傷脾食滯在裏。

右尺脈沉

沉為寒侵便溏。寒濕在裏。

左尺脈沉

氣鬪氣結

伏溺閉。氣不化濕

小便癃閉

辨虛實

無力裏虛

脉沉無力裏氣虛衰

有力裡裏

脉沉有力裏邪實滯

外證未平

惡寒發熱之表未平治裏勿及從證治表不可遷專治裏

辨兼脈

沉遲痼冷

沉為裏遲為寒遲從沉見則為在藏之陰寒

沉數內熱

沉為裏數為熱數從沉見則為在府之火熱

沉滑痰飲

沉為裏滑為痰滑從沉見則為痰飲內滯

血結

沉為裏滯傷血滯從沉見有力則為血結於裏

沉澀虛衰

沉為裏滯主虛衰

沉牢堅竇

沉為裏牢主堅竇

沉緊冷疼

沉為裏緊為寒緊從沉見則為冷疼

寒濕

沉為陰緩為溫緩從沉見則為寒濕

沉弦伏飲

沉為裏弦主飲弦從沉見則為伏飲

沉細陽衰

沉為裏細主陽衰從沉見則為真陽衰弱

辨兼象

按沉之為義

沉脉之義，如石之存水底也。喻其脉在沉，分而不浮，沉而細軟為弱脉，沉而且細，且

沉而弦勁為牢脉

沉而推筋着

且勁為牢脉

沉而着骨為伏脉

沉而推筋着

診宗脈學

沉脈者輕取不應重按乃得。學指滅小更按益力縱之不即應指不似實脉之舉指逼逼伏脉之滯於筋下也。沉為藏府筋骨之應。蓋緣陽氣式微不能浮運營氣於表。脉顯陰象而沉者則按久愈微。若陽氣鬱伏不能浮應衛氣於外。脉反伏匿而沉者則按久不衰。陰陽寒熱之機在乎纖微之辨。傷寒以尺寸俱沉為少陰受病。故於沉脈之中辨別陰陽為第一義。若始病不發熱無頭痛而手足厥冷脉沉者此直中陰經之寒症也。若先曾發熱頭痛煩躁不寐至五七日後而變手足厥冷躁不得寐而脉沉者此厥深熱深陽邪陷陰之熱證也亦因始本陽邪因汗下太過而脉變脉遲此熱去寒起之虛證也有太陽證下早胸膈痞硬而關上脉小細沉緊者此未邪內陷陽分之結胸也若能食自利乃陽邪下陷陰分之藏結矣。有少陰病自利清水口乾腹脹不大便而脉沉者此熱邪陷於少陰也。有少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯溫之是少陰而兼太陽即所謂之兩感也此與病發熱頭痛脉反沉身體痛當溫之宜四逆湯之法似是而實不同也。有寸關俱浮而尺中沉遲者此陽證夾陰之脉也若沉而實大數盛動滑有力皆為陽邪內伏沉而遲細弱弦濇少力皆屬陰寒無疑。有久時伏邪發於春夏煩熱躁渴而反脈沉濇者此少陰無氣毒邪不能發出陽分乃下虛死證也。凡傷寒溫熱時疫感冒得汗後脉沉者為愈證非陽病陰脉之比。有內外有熱而脈沉伏不數不洪指下濇小急疾無論傷寒雜病發於何時皆為伏熱。不可以其脉之沉小而誤認陰寒也。至如腸澼自利而脉沉寒疝積瘕而脉沉暎節痛痺而脈沉伏疾留飲而脈沉石水正水而脉沉胸腹結痛而脉沉霍亂嘔吐而脉沉鬱結氣滯而脉沉咸為應病之脉若反浮大虛濇或雖沉而弦細堅疾為胃氣告焉未可輕許以治也。

遲脈

遲脈屬陰。是為陰象為不及。

遲本陽虛中之陰象不及之象

往來遲慢。陽氣虛衰不能健運營。

一息三至。吸之間脉來三至為遲。

主病

遲主藏寒。

遲為陽虛故主藏寒

其病為陰。陰寒之邪

令人為病浮屬陽虛。

遲從浮見則陽虛於外。脉必浮遲無力。

沉為火衰。

遲從沉見則火衰於裏

脉必沉遲細微。

大便飧泄。

寸闊尺

右寸脉遲。

遲見肺痿數沫

肺虛成痿。

肺虛成痿

左寸脉遲。

遲見心痛停凝

心陽氣虛。

心陽氣虛

左寸脉遲。

遲見陰寒凝結

陰寒凝結。

筋脉癱瘓

右闊脈遲。

遲見右闊脈

胃火虛衰。

胃火虛衰

右闊脈遲。

遲見大虛冷滯

冷物內滯。

冷物內滯

左尺脉遲。

遲見左尺脉遲

脾門不開。

脾門不開

左尺脉遲。

遲見溲便不禁

小便不禁。

小便不禁

右尺脉遲。

遲見右尺脉遲

火衰飧泄。

火衰飧泄

辨虛晉

有力積冷。

脈遲有力積冷於中

無力虛寒。

脈遲無力虛寒傷寒

傷寒傳變。

寒化為熱傳布經絡

兼滑非寒。

熱初傳裏脈必遲滑

辨兼脉

浮遲表冷。

脈遲表冷浮遲有力

沉遲裏寒。

脈遲裏寒脈必沉遲

遲滑脹滿。

脈遲滑滿遲滑有力量

遲滑血寒。

脈遲滑血寒脈必遲滑

遲結物凝。

脈遲結物凝冷物凝滯

遲細寒濕。

脈遲細寒濕寒濕陽藏

遲微陽脫。

脈遲微陽脫真陽虛脫

辨兼象

按遲之為義。

遲之義遲慢而不能中和也

脈來遲慢。

脈來遲慢失於中和

脉以一息四至為平。

一息四至是為平脉

遲則一息三至。

一息三至是為遲脉

遲而不流利。

遲而不流利乃為濇脉

遲而有歇止。

遲而有歇止則為結脉

脈來緩時一止是為結脉

遲而浮大且軟。

遲而浮大且軟則為虛

脈脉來浮大遲
軟為虛脈

診宗脈學

數脈

遲脈者呼吸定息不及四至而舉按皆遲。不似濶脈之參伍不調。緩脈之脉勢遲緩也。遲為陽氣不能鼓運管氣之象。故昔人咸以隸之虛寒。而人迎主寒。濕外襲氣口主積冷內滯。又以浮遲為表寒。沉遲為裡寒。遲濶為血病。遲滑為氣病。此論固是。然多有熱邪內結。寒氣外鬱。而見氣口遲滑作脹者。詎可以脉遲概為之寒。而不究其滑濶之象。虛實之異哉。詳仲景有陽明病脉遲微惡寒而汗出多者。為表未解。脉遲頭眩腹滿者不可下。有陽明病。脉遲有力。汗出不惡寒。身重喘滿。潮熱便難。手足濶然汗出者。為外欲解。可攻其裡。又太陽病。脉浮因誤下而變進。膈內扼痛者為結胸。若此皆熱邪內結之徵驗也。當知脉遲雖見表證。亦屬藏氣不充。不能統攝百骸。所以邪氣留連不解。即有腹滿。而頭眩。脉遲。陽分之患未除。禁不可下。直待裏證悉具。然後下之。聖法昭然。豈不詳審慎重乎。遲為陽氣失職。胸中大氣不能敷布之候。詳遲為在城一語。可不顧慮藏氣之病乎。

數脈

主病

數脈為陽。數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。數為陽熱一息六至。

陽氣運行過度則往來越度。一息六至者其脈來急數而不徐。往來越度常度而為數脉。

一息六至。

陽氣運行過度則往來越度。一息六至者其脈來急數而不徐。往來越度常度而為數脉。

數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。

數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。

數主府熱。數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。

數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。

亦急數。數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。

亦急數。

氣虛。

氣虛不能統攝營。

營。

右寸脈數數見肺經右寸肺經喘咳。肺熱成癰。寒熱成癰左寸火炎口瘡。心火炎上。口舌生瘡左關脈數數見肝經左關肝膽火邪。肝火雷電。

右尺脉數數見腎經右尺腎火為寒熱之火。左尺脉數數見腎經左尺道濁淋閉。腎精赤白濁小便淋。右尺脈數數見腎經右尺腎火為寒熱之火。左尺脉數數見腎經左尺道濁淋閉。腎精赤白濁小便淋。右尺

辨虛實

有力實火。火邪內實脉必數而有力無力虛火。陰虛有火脉必數而虛衰表證悉罷。

頭疼發熱惡寒之證悉罷。火越宜涼。火象發越清涼折之。

辨兼脈

浮數表熱。浮數主表邪發熱。沉數裏熱。沉數主裏有火邪。弦數肝火。弦數主少陽若無半緩數溫火。緩數主太陰若無腹脹症則為肝火。

緩數溫火。緩數主太陰若無腹脹症則為肝火。

脉陽數君火。陽數在寸為君火盛。陰數相火。陰數在尺為相火。左數陰陽。左寸脉數為陰血傷。右數火亢。右寸脉數為火邪亢。

辨兼象

按數之為義。數脉之義躁急而不能中和也。脈來急數失於中和。一呼脈再至。來二至呼出脉一吸脈再至。來二至吸入脉呼吸定息合。

呼一吸。平脈為定息。閏以太息。閏息之長脉謂之太息脉。來五至。太息之間五至亦為平脈。數則一息六至。一息六至為數脈。數而弦急則為緊脈。弦急有力轉動大橘為緊脉。

數而流利則為滑脈。流利如珠為滑脈。數而有止則為促脈。數而有歇止為促脉。數而過極則為疾脈。數而過急為疾脉。

數如豆粒則為動脈。動搖為動脉

診宗脈學

數脈者。呼吸定息六至以上。而應指急數不似滑脈之往來流利。動脈之厥厥動搖。疾脈之過於急疾也。

數為陽盛陰虧。熱邪流傳於經絡之象。所以脈道數盛。大性善動而躁急也。故傷寒以煩躁。脉數者為傳。脈靜者為不傳。有火無火之分也。即經盡欲辭。而脉浮數。脈之不絕。其人不虛不戰。汗出而解。則知數而按之脉者皆為虛矣。又陽明例云。病人脉數為熱。當消穀引食而反吐者。以發汗令陽氣微。膈內虛。脈乃數也。數為客熱不能消穀。胃中虛寒故吐也。又胃反而寸口脉微數者為胸中冷。又脈陽緊。陰數為欲。吐陽浮。陰數亦嘔。胃反脉數中氣大虛。而見假數之象也。人見脉數悉以為熱。不知亦有胃虛及陰盛格陽者。若數而浮大。按之無力。寸口脉細者虛也。經曰。脈細而從按之不鼓。諸陽皆然。病熱脉數。按之不鼓。甚者乃陰盛拒陽於外。而致病非熱也。形證似寒。按之鼓擊於指下者。乃陽盛拒陰而生病。非寒也。丹溪曰。脈數盛大。按之而澹。外有熱證者。名曰中寒。蓋寒留血脉外。證熱而脈亦數也。凡乍病脉數。而按之緩者。為邪退久病脉數為陰虛之象。瘦人多火。其陰本虛。若形充色澤之人。脉數者。濕熱鬱滯經絡不暢。而蘊熱。其可責之於陰乎。若無故脉數必生癰疽。如數實而吐臭疾者為肺癰。數虛而欬吐延沫者為肺痿。又歷攷數脉諸例。有云數則煩心者。有云滑數心下結熱者。皆包絡火旺而乘君主之位也。有云細數陰虛者。水不制火。真陰虧損也。有云數為在府者。陽邪干陽。藏氣無預也。有云數則為寒者。少大氣。衰壯大食氣也。大抵虛勞失血欬嗽上氣多有數脉。但以數大軟弱者為陽虛。細小弦數者為陰虛。非若傷寒衄血之脉浮大為邪伏於經。合用發散之比。諸凡失血脉見細小微數無力者為順。脈數有熱及實大弦勁急疾者為逆。若乍疎乍數。無問何病。皆不治也。

滑脈者。滑而利也。往來流利。圓滑盤珠之形。走珠尚露之象。滑利之象。殆無專義。

主病

滑為血盛。

血盛則脉滑。此言平人無病之脉。

主痰主孕。

滑主有餘。言非痰即孕滑為邪盛。病人有病之脉。

百病皆順。

百病脉滑無逆。病之輕重皆為

順利之脉。

寸闊尺

右寸脈滑。

滑見哮喘痰嗽。則于疫癰伏都變。則哮氣逆痰湧則喘。

左寸脉滑。

滑見心包則忧惚怔忡。疫因火動則怔忡。左闊脉滑。見

左膽府邪侵。

疫延沃胆。搏膈驚惕。右闊脉滑。滑見

右闊。

疫滯脾胃。疫溫內滯。脾胃不調。左闊痰滯脾胃。

左尺脉滑。

滑見遺精白濁。疫溫下注。腎膀失職。右尺脈

滑。

滑見上利客迫。疫帶腸胃。古尺上利客迫。疫帶腸胃。古尺答問無權。

辨虛實

無力虛痰。

疫因虛動。脉滑無力。疫因虛滯。

有力實滯。

疫生於六氣之痰。

六氣於七情之變。疫變于七情。

辨兼脉

浮滑風痰。

浮為風。滑為痰。沉滑痰食。

沉為裏滑為痰。沉滑主痰。食脈必滑而沉分實大。

滑數瘦火。

滑為火。數為大。滑數為火。滑為短氣病。短氣主氣虛。虛痰膈故主氣塞。

滑而浮大。

浮大為陽脉。滑為火。大是痰火內熾。

尿則陰痛。

疫火熾則腎水傷。浮散為中氣虛滑。而故主尿則陰痛。

衛不密。風邪易入。疫伏則經絡凝。

滑而浮大。

浮大為陽脉。疫火熾則經絡凝。滑而浮大。疫火熾則經絡凝。

滑而冲和。

滑為血有餘。冲和為氣獨治。血盈氣調。

辨兼象

按滑之為義。

滑脉往來流利。而不滯也。往來之脉勢流利與瀉陽中之陰。此陽中兼浮者毗於陽。浮見

陽則為兼沉者。毗於陰。滑從沉見是以或寒或熱。滑麻主病從寒。或表或裡。浮見從表。從無定稱從無一定。則為陰脉。是惟衡之以浮沉。浮沉以辨之以尺寸。尺寸以始為定斷耳。始可為陰陽表裏。權衡之辨別之始為定斷耳。始可為陰陽表裏。熱寒虛實之定斷。

診宗脉學

滑脈者。舉之而浮。按之滑利。不似實脉之逼。逼應指堅脉之往來勁急。動脈之見於一部。疾脉之過於急。疾也。仲景曰。翕翕沉名曰滑。滑者緊之浮名也。言忽浮忽沉。形容流利之狀。無以過之。滑為多血少氣之脈。而昔人又以滑大無力。為內傷元氣。曷知滑脈雖浮沉之分。却少無力之象。蓋血由氣生。若果氣虛。則鼓動之力先微。脈何由而滑耶。惟是氣虛不能統攝餘火。而血熱脉滑者有之。嘗攷諸內經。有脉滑曰病。風緩而滑。曰熱中。脉浮而滑。曰新病。脉盛滑堅者。曰病在外。脉弱以滑。是為胃氣滑者。陰氣有餘也。則知滑脉之病。無虛寒之理。他如傷寒溫熱時行等病。總以浮滑而濡者為可治。故先師論脉首言大浮數動。滑為陽。而雜病以人迎浮滑為風疾。緩滑為中風。氣口緩滑為熱中。滑數為宿食。尺中弦滑為下焦畜血。又嘔吐而寸口遲滑。為胸中實。下利而關上遲滑。為下未盡。厥逆而脉滑而裏有實。詳此則滑脈之疾。可不言而喻。即經有滑者陰氣有餘一語。是指陰根搏陽而言。豈以陰氣有餘。多汗身寒之病。便可目為血多。又以滑大之脈。牽合無力。而為內傷元氣乎。平人肢體豐盛。而按之綿軟。六脉軟滑。此瘦濕漸滑於中外。終日勞役。不知倦怠。若省息則重着痰疾矣。夫脉之滑。而不甚有力者。皆浮滑緩滑濡滑微滑之類。終非無力之比。滑為血實氣盛之脉。悉屬有餘。婦人身有病。而脈滑和者。為孕。臨產脉滑疾者。曰難經。若滑而急強。堅厚如彈石。謂之腎絕。滑不值手。按之不可得。為太陽氣不足。以其絕無和緩。胃氣故經與之。