

鍼灸集成

庚午夏日
查文芳題

R24-53
1
明醫雜著卷之三

續醫論

吳郡後學薛已註

喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹
脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹
者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司
降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀
胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能
出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也
若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短

以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘爲本而脹爲標治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水旣上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治二症但知實脾行水而不知分別脾肺二症予故爲發明之愚按前症若肺中伏熱不能生水而喘且渴

者用黃芩清肺飲以治肺用五淋散以清小便若脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚味脾肺積熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎丸以利小便若心火尅肺金而不能生腎水者用人參平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土若脾氣虛弱不能相制而喘者用補中益氣湯以培元氣用六味地

黃丸以生腎水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元氣六味地黃丸以補腎水若脾胃虛寒不能相制而脹者用八味丸以補脾肺生腎水若脾腎虛寒不能通調水道而脹者宜用金匱加減腎氣丸補脾肺生腎水若酒色過度虧損足三陰而致喘脹痰湧二便不調或大小便道相牽作痛者亦宜用此丸多有生者○一富商飲食起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胸腹不利飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳

黃連之類前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹
脹少食服五苓薤麥之類小便不通體腫喘
嗽用金匱腎氣丸補中益氣湯而愈○一儒
者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣
消導藥咳嗽喘促用行氣化痰肚腹漸脹用
行氣分利睡卧不能兩足浮腫小便不利大
便不實肺腎脉浮大按之微細兩寸皆短朝
用補中益氣湯加薑附夕用金匱腎氣丸加
骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸
兩月乃能步履却服補中八味半載而康

氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑湏得附子健悍之劑行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當病雖在暑熱時月亦可用也予嘗治一僕人五月間病熱口渴唇乾譫語診其脉細而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脉如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又嘗治一婦人亦夏間病熱初用平調氣血兼清熱和解之劑服二三服不

應熱愈甚舌上焦黑膈間有火嗽水不嚥診其
脉兩手皆虛微而右手微甚六七日內譫語撮
空循衣摸床惡症俱見後用四物湯加黃芪人
參白朮陳皮麥門知母熟附子服之一二時汗
出而熱退次日復熱再服仍退又次日復發知
其虛極也遂連進十服皆加附子而安

愚按前論正所謂捨時從症捨症從脉真有
定見者也○一男子發熱煩渴頭痛誤行發
汗喘急腹痛自汗譫語用十全大補加附子
治之熟睡喚而不醒及覺諸症頓退再劑而

痊○黃武選飲食勞倦發熱惡寒誤用解表
神思昏憤胸發赤斑脉洪數而無力余曰此
內傷元氣非外邪也急用溫補之劑彼不從
後果歿

飲食過傷變爲異常急暴之症人多不識嘗有
一壯年人忽得暴病如中風狀口不能言語目
不識人四肢不舉急投蘇合香丸不效予偶過
聞之因詢其由曰適方陪客飲食後忽得此症
遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐出數碗
而醒後服白朮陳皮半夏麥芽調理而愈大抵

此等症多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣
惱而致飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作
中風中氣症而用驅風解表行氣散氣之藥則
胃氣重傷死在旦夕內經雖有暴病暴死之症
但恐多有因於食者前輩不曾明言故人不識
耳今後遇有此等急症須要審問明白若方飲
食醉飽或累傷飲食重複受傷但覺胸膈有食
滯只作傷食治之

愚 嘗治趙吏部患吐物出皆酸味其脉氣
口大於人迎者二三倍僚友速余投劑余曰

此實邪在上候其吐盡酸味不藥自愈翌早
吐止而安○一婦人飲食後因怒忽患血崩
四肢逆冷抽搐口禁如發瘧然吐痰如湧灌
以二陳柴胡山梔枳殼吐出酸味神思稍醒
藥止次日進薄粥少許但乳脇脹痛寒熱欲
嘔四肢倦怠余以爲悉屬肝火熾盛致脾氣
不能運化先用六君柴胡山梔釣藤鈎諸症
頓退惟四肢不遂血崩如初或又以爲肝火
未息欲投清肝涼血之劑余以爲肝脾氣血
俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸

經又用四物參朮柴胡養肝筋而四肢便利

餘見異
症名要

久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包
裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛
溫解散之藥暫時得效誤認爲寒殊不知因其
本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒束其內
熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其
標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣
惟當瀉火涼血爲主而佐以辛溫散表之劑以
從法治之則病可愈而根可除也

愚按前症多主於痰痛甚者乃風毒上攻有
血虛者有諸經氣滯者有氣虛者有四氣外
傷有勞役所傷有可吐者有可下者當分虛
實寒熱兼變而治之若夫偏正頭風久而不
愈乃內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯甚
則目昏瞤小二便秘澀宜砭出其血以開鬱
解表余嘗治尚寶劉毅齋但怒則兩太陽作
痛先用小柴胡加茯苓山梔後用六味丸以
生腎水而不再發○譚侍御每頭痛必吐清
水不拘冬夏吃薑便止余作中虛寒用六君

當歸黃芪木香炮薑而瘥○商儀部勞則頭
痛余作陽虛不能上升以補中益氣加蔓荊
子而瘥

眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦
寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛
涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片
大辛熱以其性辛甚故借以拔出火邪而散其
熱氣古方用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點
眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目
故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪

也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以
但逆之則鬱火內攻不得散矣故點眼用辛熱
而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法
也世人不知冰片爲劫藥而誤認爲鑿用點眼
遂積熱入目而昏暗瘡翳故云眼不點不瞎
者也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物
冷挹洗致昏瞎者有之

按前症若體倦少食視物昏花或飲食勞
傷益甚者脾胃虛也用補中益氣湯暇多緊
澁赤脉貫睛或臟腑秘結者用芍藥清肝丸

若赤翳布白畏日羞明或痛如刺者上焦風熱也用黃連飲子若久視生花畏日遠視如霧者神氣傷也用神效黃芪湯大凡午前甚而作痛者東垣助陽活血湯午後甚而作痛者黃連天花粉丸午後甚而不痛者東垣益陰腎氣丸能近視不能遠視地芝丸能遠視不能近視定志丸故東垣先生云五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也

主人之神宜靜而安相火代行其令相火者
包絡也主百脉皆榮於目既勞役運動勢乃
妄行又因邪氣所并而損血脉故諸病生焉
凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本
是不明正理也若槩用辛涼苦寒之劑損傷
真氣促成內障之症矣○給事張禹功目赤
不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛
此因勞心過度飲食失節以補中益氣湯加
茯神酸棗山藥山茱五味頓愈又勞役復甚
用十全大補湯兼以前藥漸愈却用補中益