

第四六一冊

博物彙編
藝術典
醫部

四五六
(卷)

古今圖書集成

中華書局影印

Z 225
1



具此書引經取要熟用之際順合未病漏氣透勢便為靈妙。

小兒瘡瘍門三

方一

如意金黃散
生肌玉任膏

八珍湯

金瘡

水二茶鍾薑三片棗三枚煎八分食前服

蟾酥丸

蟾酥丸效獨稱雄乳沒砂參輕粉同銅綠蟾酥寒水麝蠅牛又有用蜈蚣
治疗瘡瘍背臍疽乳癰附骨腫腿等疽一切惡證反瘡不痛或麻木或嘔吐病重者必多昏憤此藥服之不起發者即發不痛者即痛甚者即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰真有回生之功乃惡證中至寶丹也

蟾酥二錢酒化輕粉五分枯礬寒水石煅

銅綠沒藥乳香麝礬麝香各一錢

雄黃一錢蠅牛二十一箇硃砂二錢

以上各爲末稱準於端午日午時在淨室中先將

蠅牛研爛再同蟾酥研細粘方入各藥共搗極勻丸如菉豆大每服三丸用葱白五寸患者自嚼茶鍾送下被蓋如人行五六里出汗爲效甚者再進一服修合時婦人雞犬等忌見

太乙紫金丹大載芙蓉蛤共十金雄麝硃砂凡七品諸瘡百證總通神

解諸毒瘡諸瘡利關竅通治百病此藥真能起死回生製之濟人奇效不可盡述凡居家出入與大工動大兵及閩廣雲貴宦者不可無之

山芙蓉洗去皮毛淨焙二兩五倍子淨二兩

麝香淨研三錢續隨子仁白者去油淨一兩紅芽大載杭州紫者爲上江南土大載次之北方綿

大戟色白者性烈反傷正氣弱人服之有致吐血不宜用惟取上者去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢

硃砂有神氣者雄黃鮮紅大塊者俱細研各三錢

以上之藥各擇精品於淨室中製畢候端午十七夕

重陽或天德月德天醫黃道上吉之辰凡入室合

藥之人三日前俱宜齋戒沐浴更換新潔衣帽臨

日方入室中淨手薰香預立藥王牌位主人率衆

焚香拜禱事畢各將前藥七味復等稱準入於大

乳鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加糯米濃

飲調和軟硬得中方用杵搗千餘下極至光潤爲

度每錠一錢每服一錠病勢重者連服二錠以取

通利後用溫粥補之修合時除合藥潔淨之人餘

俱忌見此藥惟在精誠潔淨爲故治一切飲食藥

毒蠍毒瘡氣惡菌河豚中毒自死牛馬猪羊六畜

等類之肉人誤食之必昏亂卒倒或生異形之證

並用水磨灌服或吐或瀉其人必甦南方山嵐瘴

氣烟霧疫最能傷人感之緩覺意思不快惡寒

惡熱欲嘔不嘔即磨一錠服之得吐利便愈癰疽

發背對口疔瘡大蛇無名腫毒蛇節紅絲等疔及

楊梅瘡諸風癰瘍新久痔瘻並用無灰淡酒磨服

外用水磨塗搽瘡上日夜數次覺庠而消陰陽二

毒傷寒心悶狂言亂語智膈塞滯邪毒未出瘟疫

煩亂發狂喉閉喉瘻俱用薄荷湯待冷磨服亦白

痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸沙及諸瘡喘並用

薄荷湯磨服男子婦人急中頭顱邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼壓失心狂亂羊兒猪頭等風俱用石菖

蒲煎湯磨服中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語

涼膈散中荆芥防薄荷粉結連大黃元參石膏牛

蒡子貝母山梔總在藏

治咽喉腫痛瘡瘍延壅長屬間有火大便祕滯

寒溫筋脈攀縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸癲竝用酒磨頓熱服下自縕渴死驚死冤死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風大毒蠍炭調諸惡等蟲傷人隨卽發腫攻注遍身甚者毒氣入裏昏悶響叫命在須臾俱用酒磨灌下再吃葱白被蓋出汗立甦新久瘡疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癰瘻瘡瘍牙關緊閉竝用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每錠分作數服牙痛者磨塗痛上仍含少許良久嚥下小兒父母遭毒生下百日內皮瘡爛斑

穀道眼眶損爛者俱用清水磨塗打撲傷損松節

無灰酒研服年深月近頭脹頭疼太陽痛作偏頭

風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒

研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不通紅花

湯下凡遇天行疫證延街及巷相傳遍染者用桃

根湯磨濃擦入鼻孔大服少許任入病家再不傳

染又治傳尸勞瘵諸癆不能禁忌一方士指教服

此每早磨服一錠至三天後逐下惡物尸蟲異形

怪類後得脫利以此相傳活人不計其數一女子

久患勞瘵爲尸蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲

涼膈散中荆芥防薄荷粉結連大黃元參石膏牛

蒡子貝母山梔總在藏

治咽喉腫痛瘡瘍延壅長屬間有火大便祕滯

防風 荆芥 桔梗 山梔仁 石膏 元參
蓮荷 黃連 花粉 牛蒡 貝母 大黃各等分

水二杯煎八分不拘時服

金鎖匙

金鎖匙中用焰硝殼薑片臘雄黃燒加上硼砂茹

更好咽喉腫痛即時消

治喉閉癥疾風痰涎壅塞口禁不開湯水難下

焰硝一兩五錢 硼砂五錢 真片臘一分

白僵蠶一錢 雄黃二錢

各另研爲末和勻以竹筒吹患處痰涎即出如疾

雖出腫痛仍不消急取患處去惡血服煎藥

人中黃

治小兒諸胎毒痘瘡黑陷內收脣焦口乾風熱斑

疹赤遊無有不效

毛竹一投兩頭留節一頭鑽一小孔用粉草磨爲細末從孔灌滿以木條塞緊孔眼用磚扎之沉入大糞池內半年取起長流水浸一日帶竹風乾磁罐收貯

每服三四分涼水調服

胎毒爛斑土茯苓湯調服

尋常熱病入應病藥中調服即效

麥錢散

麥錢散治痘風瘡硫黃人信要相當川椒生熟枯葉等麻油調搽自然光

治小兒痘風作痒疊成片甚則頑麻不知痛

小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內 硫黃四兩

白砒一兩

右先將硫砒爲細末乘熱時同入鉢內攪勻待

冷取起加烟膠半斤川椒三兩生枯礬各二兩共
研細末臨用葱湯洗淨用麻油調搽油紙扎三
日一換三次愈

升麻葛根湯

升麻葛根湯芍藥柴胡梔子共連翹木通甘草同
煎服丹毒遊行效最高

治小兒丹毒身體發熱面紅氣急啼叫驚搐等證

服之效

蘆薈消疳飲薄荷元參甘草共柴胡升麻牛蒡羚

羊角梔子黃連竹葉服

治小兒走馬牙疳身熱氣粗牙齦腐爛氣味作臭

以及穿腮破脣者竝服之

桔梗 銀柴胡 胡連 川連 牛蒡 元參

木二鍾煎八分不拘時母子同服

消毒犀角飲

治小兒丹毒身熱氣粗啼叫驚搐不寧等證

犀角 防風各一錢 甘草五分 黃連三分

右水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之

紫雪

紫雪羚羊犀角同升麻寒水石膏達元參沉木香

甘草硝片硃砂金箔從

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨脹氣急

不乳即宜此藥救之又治傷寒熱躁發狂及外科

一切蓄毒在內煩躁口乾恍惚不寧等證

升麻 寒水石 石膏 犀角 羚羊角各一兩

元參二兩 沉香 木香各五錢 甘草八錢

水五碗同藥煎至一碗濾清再煎滾投提淨朴硝

三兩六錢微火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入

碗內下硃砂冰片各一錢金箔一百張各預研細
和勻碗頓水內候冷凝成雪也大人每用一錢小
兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效病重者加一
錢亦可或用淡竹葉燈心湯化服

蘆薈消疳飲

蘆薈消疳飲薄荷元參甘草共柴胡升麻牛蒡羚

羊角梔子黃連竹葉服

治小兒走馬牙疳身熱氣粗牙齦腐爛氣味作臭

以及穿腮破脣者竝服之

桔梗 山梔 石膏 薄荷 珍珠角各五分

甘草 升麻各三分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食後服

人中白散

人中白散力奇絕黃藥兒茶青黛列薄荷冰片要

相研口瘡擦上湯沃雪

人中白湯壺者佳煅紅一兩 孩兒茶二兩

薄荷 黃藥 青黛末各六錢 冰片五分

共再研極細末用溫湯漱淨吹藥府上日用六七

次吹藥涎從外流爲吉內收涎毒入裏爲凶

黃連瀉心湯

解毒瀉心湯芩連荆芥山梔牛子散薄荷甘草連

荳等木通加上效如神

治小兒心火妄動結成重舌木舌紫舌脹腫堅硬

語言不利者並宜服之

薄荷 山梔 荆芥 黃芩 連翹 木通

右爲末先用葱根湯洗後用香油調敷

又方

治陰囊生瘡疼痛

川椒 荆芥 槐枝 柳枝 蛇牀子

右煎湯洗後用朴硝爲末雞子清調敷

又方

治陰生瘡脹水不乾

烏鱗魚骨

右爲末乾摻患處

又方

紫蘇葉

右煎湯淋洗及作細末摻之妙

又方

治小兒陰生瘡不乾

輕粉 蜜陀僧

右爲末貼之

如痒加山梔子阿魏研同前藥爲末先將

米泔水洗淨然後敷貼此藥

研下四分

治小兒渾身破爛瘡凡父母生過廣瘡育兒鮮有

免者自頂至踵兩目外幾無完膚

真臘攀治筋而滋肝其色青應東方甲乙木

大辰砂養血而益心其色赤應南方丙丁火

明雄黃長肉而補脾其色黃應中央戊己土

明礬理脂膏而助肺其色白應西方庚辛金

磁石榮骨液而壯督其色黑應北方壬癸水

此方見焦氏筆乘惜其不用水銀製而用之功效

遲緩因加水銀一兩與前五味等分共入陽城罐內打火三香取出加數藥內用之效如神

神效敷藥方

珍珠五錢 冰片一錢 夜合花白者陰乾

象皮同黃沙炒候軟切片再炒候脆方研 血竭

降香炒研 乳香 没藥各去油 花蕊石

孩兒茶蠟 五倍子色紅者半生半煅各一兩

右各極細末方入白占八錢研勻最後入冰片

如欲去腐每兩加五靈散一錢

欲生肌每兩加前散三分或五分

如疮後膿水淋漓下疳等瘡只加二三分

治湯火傷每兩加絲綸灰二錢刷牙松皮煅存性

韶粉煅黃各五六錢或乾摻或香油調

四黃散

研下四分

治小兒身上一切熱毒瘡疾燥痒抓破有汁不乾

淨黃連 黃藥 黃芩 大黃 滑石各半兩

五倍子去蟲屑一錢半

右剉碎爲末用清油和調二錢至三錢塗搽患處

仍服四順散消毒飲

一抹金

治小兒遍身生瘡潰爛如糜爛痛濃汁不乾

藜蘆洗焙 蛇牀子 紅丹水飛過各五錢

硫黃 赤石脂 明礬火飛過 五倍子去蟲屑

黃藥去粗皮各一錢半 輕粉五十帖

右前八味或曬或焙爲末仍同輕粉在乳鉢再杵

勻用生肥豬膏碎切以瓦鉢和藥末杵爛塗患處

或清油調搽亦可

解表消毒飲 治小兒瘡瘍腫高焮痛便利調和脈浮而洪有表證者用之

黃芪上部酒炒中部泔炒下部鹽水炒一錢半

葛根 升麻 赤芍藥 元參 牛蒡子炒

麻黃去根節 甘草各五分 連翹一錢

更看是何經分野加引經藥

手少陰加細辛三分

足太陰加桔梗白芷各五分

足太陰加蒼术七分

手厥陰加柴胡七分

足厥陰加柴胡青皮各五分

手太陽加藁本五分

足太陽加羌活七分

手陽明加白芷五分

足陽明加升麻葛根各七分

手足少陽加柴胡七分

水一鍾生薑三斤荳白一根煎七分溫服不拘時

攻裏消毒飲

治小兒瘡瘍腫硬痛甚大便祕脈沉而實有裏證者用之

瓜蒌連皮子細切三錢 連翹 牛蒡子炒研

當歸 白芍各一錢 大黃一錢半 砒硝五分

甘草七分

右用水一鍾煎至七分大溫服未利再服

連翹散

治癰瘍等

連翹一錢 沉香 黃芪各半兩 白斂 破硝

川大黃地 甘草各一分

右搗爲粗散每服一錢水一盞抄入麝香一錢煎

五分去滓放溫食後服

寄生散

治毒瘡甚者

桑寄生 独活 大黃各一兩 犀角屑 破硝

甘草各半兩

右搗羅爲細末每服一錢水一盞煎五分去滓放

溫服量兒大小加減

右解表攻裏之藥皆爲瘡瘍挾有內證者設也瀰

瘍勿拘此例

托裏榮衛湯

治瘡瘍外無癰腫內亦便利調和乃邪客經絡宜

用此藥調理

黃芪炒 紅花各一錢 蒼朮米泔浸炒 柴胡
連翹 羌活 防風 當歸身酒拌 甘草

黃芩 人參各一錢 桂枝七分

右用水一鍾酒半鍾煎八分食遠服

托裏散

治一應瘡毒始終常服不致內攻

瓜蒌大者一枚杵 當歸酒拌 黃芪如前法製
白芍藥各一兩半 皂角刺炒 金銀花 花粉
熟地黃各一兩右爲粗末每服以三歲兒爲率用藥一兩以酒一
鐘入磁器內厚紙封口再用油紙重封重湯煮之

仍覆以蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈

神效解毒散

治一切瘡毒初起腫者卽消已潰仍腫者卽散已
潰毒不解者卽愈

金銀花一兩 甘草節五錢 黃芪 皂角刺炒

當歸各三錢 乳香 没藥各一錢

右爲散每服二錢酒煎溫酒調服亦可嬰兒病乳
母亦服如瘡已潰腫痛已止者去沒乳銀花倍黃芪甘草
發背癰瘍方治陰瘡頭平向內者服之卽突出其功效不可盡
述若小兒痘瘡黑陷者止一服而起萬不失一

羌活一兩 穿山甲炒焦半兩 麝香少許

生人骨煅存性半兩

右末煎麻黃薄荷酒調

生地 防風 當歸 犀角屑 荆芥穗各一兩
牛蒡杵炒 赤芍 連翹 桔梗各七錢 薄荷

黃芩 甘草各五錢

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

接前方善損中氣傷陰血若大人形病俱實脾胃

健旺者庶可用之恐芽兒臟腑羸嫩不能勝此經

云氣主嘯之血主濡之氣者胃中冲和之元氣若
胃氣一傷不能噏濡消散脹已成者不能腐潰脹已潰者不能生肌收斂因而難治甚致不起不可
不慎也

托裏消毒散

治胃經虛弱或因冠伐致瘡不能潰散瘡未成卽
消已成卽潰腐肉自去新肉自生人參 黃芪 當歸酒拌 川芎 芍藥炒
白朮炒 枳苓各一錢 金銀花

甘草炙 連翹各五分

右作二劑水煎徐徐服

托裏散

治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發
熱宜用此補托之人參氣虛倍用 黃芪炒 當歸血虛倍用
白朮 茯苓 當藥酒炒各五分 熟地黃一錢

右作兩三劑水煎服

八味茯苓補心湯

治心氣不足血氣不和而患瘡瘍

茯苓 藜仁炒各二錢 五味炒 當歸各一錢
人參一錢五分 白朮炒一錢 菖蒲五分

遠志去心六分 甘草炒五分

右作二三服水煎

敷藥鐵錠散

治一切瘡瘍癰疽

芙蓉葉 黃葉 大黃 五倍子 白芨

右爲末用水調搽四圍

按前方乃寒涼解熱收斂之劑或有用白朮商陸
根者有用寒水石天花粉者有用蒼耳金銀花者
有用芭蕉赤小豆者有用草烏白芷之類者皆不
分寒熱溫涼之雜何內經云先腫而後痛者形傷

氣也先痛而後腫者氣傷形也又云五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰外科精義云凡瘡腫高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋脈肉色不變發於骨髓蓋必有諸中而形諸外故受證之經與所患之位各有不同豈宜一槩外敷涼藥惟脾胃無虧血氣不和者庶幾有效若服化毒之類脾胃復傷血氣凝滯亦不能消矣至如疔瘡之類正欲宣散其毒若復用前美肌肉受寒血氣凝滯必致毒氣入內而不救治法必察其腫之高漫色之赤白痛之微甚作腫之難易出膿之稠薄生肌之遲速以別其屬陰屬陽或半陰半陽或純陰純陽而用相宜之藥以涼之熱之和之又當審受證之傳變五臟之相勝而以調補脾胃爲主庶不致發惡語也

葛根白水散

治小兒赤白丹毒

白朮 根殼各一錢 茶荳二錢 木香一錢半

葛根三錢 甘草二錢半

右剉散用水一盞煎不拘時服

犀角解毒散

治小兒赤丹瘡壯熱狂躁睡臥不安晝膈悶滿咽

牛蒡子炒一兩五錢 防風 甘草各二錢半

荆芥穗五錢 犀角一錢半

右剉散用水煎不拘時服

防風升麻湯

治小兒丹瘡赤腫

防風 升麻 山梔去殼 蕺門冬去心 藥通
甘草節各一錢

右咬咀用淡竹葉三片煎食遠服

荆芥散

防風 花粉 羌活 生地 當歸 蟬蛻各等分

右水煎服

化丹湯

解利丹毒遍身燥痒發熱煩渴

川獨活 射干 麻黃去根節 青木香 甘草

石膏末 黃芩 薄桂各五錢

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服

藍葉散

治小兒月內發一切丹

藍葉一兩 黃芩 犀角屑 川大黃剉微炒

柴胡 桔子各一分 升麻 石膏各一分半

甘草半分微炒

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓下竹瀝半合更煎三兩沸放溫無時量兒大小加減服後同

氣怯弱者可去大黃

升麻散

治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻一分 黃芩一分 麥冬三分 葛根三分

川大黃微炒一分 川砂硝一分

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時

大黃散

治小兒一切丹毒遍身赤痛
川大黃半兩剉微炒 防風半兩 川升麻
黃芩 麻黃去根節 泰朮各一分 砂硝二分

右同咬咀每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時

又

升麻膏

治小兒丹毒腋脣壅熱太過心神煩悶二便不通

川大黃微炒 川升麻 川砂硝 蔡子各半兩
梔子仁一分

右爲粗末每一錢水一小盞煎五分去滓量兒加減溫服以利爲度

升麻膏

治小兒一切丹毒發無常處身熱如火燒宜用此膏

川升麻 川大黃 護火草 蛇膽草 梔子仁

寒水石 川砂硝 藍葉 生地黃 芭蕉根

羚羊角屑 梧桐皮各半兩

右細剉以竹瀝浸一宿明日濾出却入鑄中以臘

月猪脂一斤慢火熬一食久乘熱以繩濾去滓候

冷成膏磁盒盛底取磨塗之兼以膏如棗大竹瀝

化服之

又方

治小兒丹毒大腫身熱百治不折

寒水石十六分 乾藍青 竹瀝各一升 犀角
柴胡 杏仁去皮尖研各八分 生葛汁四合

知母十分 甘草五分 羚羊角六分 蜜二升
白芍藥七分 梔子仁十一分 川黃芩七分
石膏十三分

治小兒丹毒大腫身熱百治不折

右水五升井竹瀝煮三升三合去滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎一升三歲兒服二合大者量加之藥

分太大小兒服未得

又方

治小兒丹數非一皆主之

大黃 甘草 當歸 川芎 白芷 黃芩

獨活 白芍藥 川升麻 沉香 青木香

木蘭皮各一兩 硼硝三兩

右以水一斗二升煮取四升去滓內硝湯中適寒

溫搗之乾再用差乃止

生料四物湯

治血熱生瘡遍身腫痺及脾胃常弱不禁大黃等

冷藥尤宜服之

生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風各半兩

右咬咀水煎量大小加減忌酒麵猪羊肉豆腐

藍青散

治小兒一切丹毒大赤腫身體壯熱如火已服諸

藥未減

乾藍青切 知母 桔子仁炒 甘草微炙

杏仁去皮尖雙仁熟炒微黃各半兩 寒水石

石膏 犀角屑 柴胡 黃芩各一兩 赤芍

羚羊角屑各三分

右爲粗末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹

瀝蜜生葛等汁共一合更煎三兩沸放溫無時服

量兒大小加減

解毒散

寒水石 滑石 石膏各等分

右爲末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

赤葛散

治因血熱與風熱相搏遍身丹毒燥癩日久不消

赤葛二兩 甘草三錢

右碎每服二錢無灰酒一盞煎七分無時溫服不

飲酒者止用水一盞入酒一大匙同煎服

必效方

此泉州大智禪師文宥經進必效方治小兒頭面

皮膚忽生瘡瘍火燎丹發起赤腫量有碎小瘡及

赤量上瘡初發如錢漸量開一二尺良久遍身入

口耳到臟腑卽不救此證可畏速治之此乃自積

熱得

甘草一兩或半兩

右拍破入水一盞或半盞煎湯溫溫含乳母全口

呷含漱徐徐吐淋洗病處以手掌與揩不得犯指

甲仍與兒甘草湯吃一用卽不暈開良久再淋三

用立瘥

紅散子

治丹毒并土虺咬

苦根半斤

右爲末每服一錢溫酒調下立效

又方

治小兒一切丹毒通用

礦石散

治小兒一切丹毒遍身發熱

硝石一兩 乳香一分

右爲末以鷄子清調塗之

又方

太陰元精石一兩 白礬一分

爲末水調塗

治小兒諸丹遍身如火經屢卽殺人

薑薑子不拘多少

右研細酒調飲兼塗丹上

一方以酒研細溫服無時

治小兒一切熟毒丹及赤腫疼痛

又方

大黃 馬牙硝研各一兩

右先將大黃爲末入牙硝同研水調塗患處乾再

易之

柳葉湯

治小兒一切丹煩

柳葉一斤

右用水一斗煮湯八升日洗七八次

綠袍散

菜豆五錢 大黃一錢

右爲極細末用生薑薄荷汁入蜜塗

碧雪

礦硝 青黛 寒水石 石膏 孙硝 馬牙硝

右爲極細末傳

冰黃散

治小兒赤癰丹毒丹鉗刀子疏去瘤頭亦量惡血
毒汁

土硝五錢 大黃一錢

右爲極細末用新井水調白塗

又方

傅丹毒只一夜消盡

花蕊石

右以生薑薄荷自然汁調鵝毛刷上患處爲妙

黃芩四物湯

治諸瘡丹毒赤癰瘍癥

黃芩一兩 當歸酒洗 生乾地黃 赤芍藥

川芎各半兩 何首烏去粗皮 草烏炮去皮

元參各二錢五分 甘草六錢 薄荷二錢

右咬咀每服水一盞煎七分無時溫服

張漢香豉散

治白丹症痛虛腫如吹

香豉二兩炒焦 伏龍肝一兩

右爲末生香油調塗之

枳實湯

聖惠云夫白痴者由風氣折於肌中與風相搏遂
爲疾也得天陰而冷則劇出風中亦劇得晴暖則
減身暖亦差宜用此方

枳實剉

右用水煮取汁洗拭丹上

又方

外臺備急治白丹

草根三斤 小豆四升

右以水二斗煮日浴三四次兼治一切丹毒

升麻膏

治小兒赤丹腫毒

川升麻 白斂 漏蘆 川硝各一兩 黃芩

枳殼 連翹 蛇膽草各一兩半 桔子仁

桔梗各二兩

右剝細以猪膽一斤半慢火煎諸藥令赤色去滓
放冷研盒收旋取塗之

又方

治小兒面身卒得赤丹或痄或腫不速療之卽效

人宜用此方

殺羊角屑八兩

右以水五升煎一升絞濾人煉豬脂五兩和塗

張漢升麻膏

治赤丹初發肉如火色如鷄冠又名茱萸丹

川升麻 白斂 漏蘆 砧硝各一分 連翹

梔子仁各半兩

右細剉以猪膽半斤慢火同煎諸藥令赤色去滓
放冷塗

張漢祐毒丹

治丹黑色痒痛腫起

大黃散

右爲粗末每以水二盞煎兩匙頭末微熱以帛搗

丹上以消爲度

張氏戎鹽散

右爲粗末每以水二盞煎兩匙頭末微熱以帛搗

戎鹽一兩 附子一枚 雄黃末飛半兩

右同研爲末每用少許以雄鷄血調塗
升麻湯

治小兒心熱身上赤流色如臘脂皮膚壯熱

升麻 川大黃剉微炒 川硝 元參各半兩

犀屑 黃芩 桔子仁 木通 炙草各一分

右爲末每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服無

時量兒加減

乳香散

天仙蕪一兩焙爲末 乳香一錢研

右每服一錢溫酒下

牛黃散

治小兒初生至二三歲一切風發赤白流走遍四肢

牛黃 碎砂 蝴牛肉 全蠟 白僵蠶 天麻

白附子 乳香 膜香各一分 生龍膽一錢

蟬螵蛸五對五月中採

右爲細末每服一字薄荷水調下初生小兒洗了

後用乳調少許塗口中胎疾永除

大黃散

治小兒赤流熱如火

又方

護火草汁三合 赤地利末三錢 膜粉一錢

右相和量兒大小加減服之良久瀉下血片爲效

其滓數在赤處亦佳

治小兒赤流半身色紅漸漸展引不止
又方

牛膝去苗一兩 生甘草半兩

右剉以水一大盞煎五分去滓調伏龍肝末塗效

又方

生大黃一兩 赤小豆半合炒紫色 砂硝三分

右爲末雞蛋白調傅勿令乾

李子油三兩 硫砂末一分

右一味調如膏塗之

元胡散

治小兒赤流

元胡索一兩 天南星二兩 川朴硝半兩

巴豆二十七箇去油

右爲末薑薑汁調胡毛掃之

治赤流白流火篋諸丹

生臍攀一錢 烏鰓魚骨一錢 蟠蟲一條全焙

麝香三十文 輕粉二十文

右一處乳鉢內研極細看丹多少用藥醋調令稀

毛翎掃丹上立止

治赤白流

雄黃半兩 白礬一分 白芥子一分

右爲末水調捕

治小兒表裏受熱之甚多發遍身赤腫狀似丹疹

又方

若於腹中周匝則不可救名曰赤油腫此藥如神
葫蘆不拘多少
右研取自然汁調水銀粉又曰輕粉鵝毛掃上病
處須臾赤色便變爲白或上有白癟子不妨或自
破亦無害乃是病去也調時不須太稠
消腫散

幼幼書譚氏殊聖方歌云五遊忽發遍身形恐悚
令人怕怖驚乍睡利羅生滿體莫冤神鬼錯看承
甘泉硝石蒼龍骨感攝消磨去痛疼更取鐵槽連
底水調和頻掃便身輕

伏龍肝一兩爲末 亂頭髮二兩煅灰研

右水調塗赤處

丹參散

右研勻淨器收以鐵槽水調一錢掃塗立瘥

清泉硝石 白龍骨各一兩
丹參散

治小兒身上有赤引於頰上或口旁眼下赤如蟻

脂向上皮即皴剝漸漸引多此是心熱血凝所爲
其治法宜以小刀子鋒頭砭破令血出後宜服此

丹參 黃芩 枳殼炒炒 葛根 丹橘各一分
麻黃去根節半兩

右爲末每一錢水一小盞入竹葉十片竹茹半錢
煎五分去滓放溫量兒加減無時服

麥門冬散

治小兒身上有赤煩熱
麥門冬

右爲末每服一錢水一盞竹葉十片去滓放溫量
兒加減無時服

右爲末新汲水下半錢或一錢立瘥

銅線一錢 麻香少許
右爲末如患者用針穿破却用針眼上度藥在丹
內上面用醋麪膏子掩之如人有患不覺數日後
吃食不得即先服下項藥

大黃 甘草各等分
右爲末新汲水下半錢或一錢立瘥

犀角散
右爲末每服一錢水一盞竹葉十片去滓放溫量
兒加減無時服

漢防己 川朴硝各一分 牛黃半分研

治小兒身上有赤或瘡腫或如火丹煩渴渾身赤
壯熱
鉛霜研 菜豆粉各半兩
右用羹羹菜自然汁調塗

伏龍肝一兩爲末 亂頭髮二兩煅灰研
右水調塗赤處

又方

烏梅焙 楊梅杏仁去皮尖研 沖花各一兩
鹽豉一兩半 巴豆二十粒去心皮油研

蓋之服一二丸亦佳
靈苑方

治土鬼丹及馬汗入瘡大效
烏梅焙 楊梅杏仁去皮尖研 沖花各一兩
鹽豉一兩半 巴豆二十粒去心皮油研

右爲末糊丸先挑破瘡即以醋磨藥塗更以醋麪
蓋之服一二丸亦佳
靈苑方

治土鬼丹此病初發如湯泡頃刻則大連發不已
或至數處便能致困宜速治之

赤足蟠蟲一條 鵝腸草 金蕎麥各一分
靈苑方

右爲末煎竹葉湯調半錢無時量兒加減

升麻膏

治小兒頭面身體赤毒腫起作片者宜用此方

升麻一兩 星角屑 射干 赤芍 元參

黃芩 桔子仁 川大黃 净大青 藍子

羚羊角屑各半兩 生地黃一兩

右剉以猪脂一斤半於鍋中慢火熬不住手攬藥

色變青成去滓磁盒內盛頻摩腫處

又方

黃芩末 川大黃末 川砂硝各半兩 馬勃

水銀各一分木銀於手心內用津研令星盡

雞子三箇去殼

右同研成膏先以鍛鐵鍛破然後以膏塗之

又方

雞冠花 商陸 紫草 川大黃各半兩

右爲末以雞蛋清入生油等分調塗乾再塗

又方

附子去皮臍半兩 川椒半兩去目 石鹽三分

右爲末以煉了猪脂四兩相和慢火熬成膏磁盒

盛候冷頻頻塗以療爲度

雙金散

治游腫攻頭面焮腫赤熱疼痛宜用此

川蠻金半兩 赤小豆一合 甜葶苈半兩

伏龍肝一兩 川砂硝半兩 生川大黃半兩

右爲末以生雞子白并蜜少許令稀稠得所塗之

乾再塗

治遊腫赤者
川大黃末一兩 護火草五兩

右相合杵塗之乾易
又方

治赤白遊腫
又方

紫礬子半合 鹽一錢 米醋一鷄子殼

右杵如泥看大小塗紙上貼之如走即隨處貼之

不三兩上效
又方

治青白赤遊腫手近微痛
又方

生川大黃 蒲黃 伏龍肝各一兩

右爲細末水和如薄泥塗之乾再用

又方

川大黃一兩 故一合 紫檀一兩

右爲末醋和塗乾再用

又方

治遊腫流遍身赤色入腹卽死以生豬肉傅上數

數擦之其肉蟲鳥不食蓋臭惡甚也

紫檀香一兩

右爲末水調塗

與瘧方

主丹人腹及下至卵者不治

麻黃炒 升麻各三分 砂石四分

右爲末以井花水服方寸匕日三服

一方加大黃半分服之

劉氏家傳方

治走馬胎赤腫走入心腹則不救

槐葉取鮮者一握 生瓜蔓去皮同槐葉搗
赤小豆末各三分
右和塗患處其效如神

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百七十六卷目錄

醫部彙考四百五十六

小兒瘡瘍門四

藝術典第四百七十六卷

醫部彙考四百五十六

小兒瘡瘍門四

方三

飛龍奪命丹
通氣散葛根牛蒡子湯
透氣散加味解毒散
金黃散如聖散提風清毒散又方人參白芍散
元參散升麻散葛根散清肝益榮散
即味小柴胡湯柴胡散川芎白芍散
柴胡散桂枝散渴散良方
葛根散補陰散大黃炒散
葛根散羌活散
葛根散大黃炒散
葛根散散解毒散
葛根散大黃炒散
葛根散

右各爲末入蠟酥蠅牛或加酒少許和丸菉豆大
每服一二丸溫酒或葱湯下重者外用隔蒜灸法
通氣散

治時毒瘧痛咽喉不利取嚏以泄其毒

元胡牽猪牙皂莢 川芎各一錢 藥蘆五分

羊羃鱉花三分

右爲細末用紙搘鼻內取嚏爲效

犀角升麻湯

治風熱口脣頰車連牙腫痛

犀角錫二錢 升麻 防風 羌活 川芎

白芷各五分 黃芩 甘草各一錢 白附四分

右每服三五錢水煎

治時毒腫痛大便祕結 桔子仁湯

右爲細末每服二三錢蜜水煎服

葛根牛蒡子湯

葛根牛蒡子湯

葛根牛蒡子湯

葛根管仲江西豆豉牛蒡子半生半炒研
甘草各等分右每服三五錢水煎

治瘡瘍初起焮腫作痛或溫毒下注或環跳穴痛
健脾滲濕飲

葛根管仲江西豆豉牛蒡子半生半炒研
甘草各等分右每服三五錢水煎

柴胡 茄葉 人參 白朮 茯苓 陳皮
當歸各五分 牡丹皮 山梔炒 甘草各三分

右每服二錢水煎服

加味解毒飲

治天泡瘡發熱作痛

元參 連翹 升麻 茄葉 當歸 羌活

生地 牛蒡炒各三錢 茯苓 甘草各二錢

金銀花 漏蘆各五錢

右每服一二錢水煎服或爲末蜜丸亦可

金黃散

治天泡瘡消毒止痛

滑石 甘草

右各另爲末和勻傅患處如泡挑去水傅之加黃

藥尤妙

換肌消毒散

一名草解散治楊梅瘡不拘初患日久並效

土茯苓 即草薢 當歸 白芷 甘草 皂角刺

薏苡仁 白蘚皮 木瓜不犯鐵器各等分

右水煎食前并空心服

又方

治大人之瘡如用前方未應或兒大宜用此方

土茯苓五錢 川當歸 白芷 皂角刺炒

苡仁各一錢 白蘚皮 木瓜忌鐵 木通

金銀花各七分 甘草 連翹 防風各五分
茯苓 茄葉各一錢 黃芪炒一錢 川芎

生地黃各八分
右作一三劑水煎兒大者作一劑煎分兩三次服

白斂散

治小兒王瘡瘍一身盡如麻子有膿汁乍痛乍癢
或時壯熱

赤芍藥 甘草 白斂各三分 黃芩 黃連

黃葉微炙各半兩
右爲末蜜水調塗日兩次即瘥

又方

治小兒王瘡瘍及惡瘡

林米 竹簽

右燒灰細研以田中禾下水調塗之效

黃連散

治小兒王瘡瘍初患一日肉色變二日泡癰出或

四畔時赤漸長若泡漿匝身即不可治其狀如湯
火燒宜速用此

黃連末 胡粉各一兩

右研勻以生油調塗之

浸淫瘡方

治小兒身體發瘡初出甚小後有膿汁浸淫不已
漸大名漫淫瘡若先從四肢起漸向頭面者難治

也

鯽魚一尾長三寸者 豆豉一合

右杵如膏塗之又療馬鞍瘡

苦瓠一兩 蛇蛇半兩燒 露蜂房半兩微炙

梁上塵 又方

右爲末油調塗

又方

伏龍肝三分 亂髮三分燒

右爲末猪脂和塗
元參飲

治療癰及頭上生惡核腫痛

元參 川升麻各五錢 川烏炮裂去皮臍

草烏炮裂去皮 當歸酒洗 川芎 赤葛
生乾地黃 赤芍藥各二錢半 甘草三錢

大黃半生半炮四錢

右剉每服二錢水一盞薑一片煎七分無時溫服

升麻湯

升麻 射干 連翹 犀角屑 大黃微炮
砂硝各半兩

右咬咀水煎大小加減忌酒燭灸燙物

柴胡 茄葉 人參 白朮 茯苓 陳皮
當歸各五分 牡丹皮 山梔炒 甘草各三分

右薑棗水煎服

治肝火血熱遍身搔痒或起赤暈或筋掣結核

柴胡 茄葉 人參 白朮 茯苓 陳皮
當歸各五分 牡丹皮 山梔炒 甘草各三分

右薑棗水煎服

清肝益榮湯

治肝膽經風熱血燥筋掣結核或作癩子

柴胡 龍膽草酒拌炒各五分 當歸 川芎
芍藥各一錢 热地黃自製 白朮炒 木瓜
山梔炒 茯苓 薏苡仁各五分 甘草三分

右水煎服

加味小柴胡湯

治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核焮痛或寒熱
補熱口苦耳聾等證

柴胡一錢 黃芩炒一錢 人參 半夏各七分
甘草炙各五分 山梔 牡丹皮各一錢

右薑水煎徐服

益氣養榮湯

治氣血虛弱四肢頸項等處患腫不問腫潰日久

不效俱宜服之

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附炒 當歸

川芎 黃芪炒 熟地黃自製 茄葉炒各一錢
甘草炙 桔梗各五分 白朮炒 柴胡六分

右每服二三錢薑水煎

必效散

治療癰元氣無虧者宜用此方若元氣怯弱者宜

先補而後服之療癰毒已下便與滋補庶無他患

若孕婦及虛勞氣鬱所致者尤不可服世以此方

爲良劑故併注之

南硼砂一錢五分 輕粉一分 麻香五分

大�豆五粒去皮心膜油淨 白僵榔一箇

蟬蛻四十箇去頭足翅同白糯米炒去米

右爲末取鷄子一箇去黃用清調藥入殼內以溫紙數重糊口瓶蒸熟取出曝乾研細每服五分用炒生薑酒五更調服

如毒出小便澀痛用金元散一服其毒出而不痛

貼惡核方

赤小豆 牙皂 硝石 黃藥 木鼈子各半兩

右末鷄子清調塗患處

貼散療瘡神效方

白膠香 降真香用心無土氣者

海螵蛸

右等分爲末捲患處外以水紙掩之一夜而退

神效良方

興化李人哥傳貼療瘡膏藥未破者卽消已破者卽出惡物收斂

輕粉 麻香 珍珠 血竭 沒藥 乳香
黃蠅 銅青各六分 松香八錢 杏仁二十枚

蓖麻子二十枚去殼

以上十一味各研極細末攪和用磁杵鉢搗成泥膏不犯鐵器不見火將膏捏成泥膏上以手撲薄貼

燒人場上紅黃土研細

洗淨患處擦之神效

皂角子九

治瘰疬破潰不斂

治瘰疬不潰或潰而不愈變成漏證

琥珀 木通 桂心 當歸 白芷 防風

松香 朱砂 丁香 木香 木鼈子肉各二兩

右先用琥珀丁香桂心朱砂木香爲末其餘㕮咀以麻油二斤六兩慢火熬煎至白芷焦黑濾去粗

徐下黃丹一斤以柳枝不住手攪至黑色滴水捏

軟硬得中却入琥珀等末攪匀于磁器盛之用時

取少許攤貼

補陰八珍湯

治元氣虛弱不能漸效或內熱肺熱肌體消瘦

即八珍湯加酒炒黑黃藥知母

右爲末米糊丸菜豆大量兒大小加減滾湯下

九味柴胡湯

治肝經熱毒下注患便毒腫痛或小腹脅間結核

凡肝膽經部分一切瘡瘍或風毒惡核瘰疬

柴胡炒 黃芩炒各五分 人參 山梔炒

右水煎服若腫痛赤色元氣無虧者宜用漬後腫

消痛止者不宜用大凡腫硬不潰潰後不愈者因

右水煎服若腫痛赤色元氣無虧者宜用漬後腫

消痛止者不宜用大凡腫硬不潰潰後不愈者因

君芎歸柴胡爲主佐以九味蘆薈丸若飲食少思者宜用五味異功散專補胃氣若腹水溝稀而見一切諸證皆因血氣內虧但溫補脾胃飲食加進血氣化生諸證自退設治瘡邪是虛其虛也禍不旋踵矣

琥珀膏

治瘰疬不潰或潰而不愈變成漏證

春用柳條荆芥 夏用棗葉槐枝 秋冬用苦參

右俱煎湯洗浴

加味羌活散

治小兒四氣外搏肌膚發爲瘡瘍增寒發熱身痒

羌活 前胡各一兩 人參 桔梗 茯苓

甘草炙 川芎 枳殼炒各三分

天麻各半兩

右剉碎每服三錢水一盞生薑三片煎至五六分不拘時服

當歸飲子

治小兒心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或癰或痄或腹水浸淫

當歸 赤芍藥 川芎 生地黃 菟葵炒去刺

荆穗 防風各一兩 首烏 黃芪 炙草各半兩

右剉碎每服四錢水一盞薑三片煎六分服無時

牛黃解毒丸

牛黃三錢 甘草 金銀花一兩 草紫河車五錢

右爲末煉蜜丸量兒大小加減服

立效散

治瘻瘍耳瘻及一切瘡疥

定粉 松香 黃藥 黃連 枯萎末各一兩

右各另爲末用清油燭油調搽

敷藥解毒散

治一切毒瘡風疹痛痒

大黃 黃藥 山梔 寒水石各等分

右爲末水調搽若破而腹水淋漓用當歸膏或清

燭油調尤善

傳瘻藥方

剪刀草 黃連 苦參

右等分爲末先洗淨次用麻油輕粉調傅

苦瓠散

治小兒浸淫瘡帶屎不止

苦瓠二兩 蛇蛻燒灰 蜂房微炒各半兩

梁上塵一合

右爲細末生油調塗擦帛上貼

毒金散

治小兒濕瘻浸淫瘡

白膠香研一兩 輕粉半兩 青黛二錢半

右研爲細末乾燥瘡上

人參敗毒散

治瘻瘍邪氣在表應發者若增寒壯熱項強脊疼

或惡心咳嗽亦宜用之

人參 茯苓 川芎 羌活 獨活 前胡

柴胡 枳殼鈎皮炒 桔梗 甘草炒各等分

右每服二三錢水煎

東垣人參安胃散

治瘻瘍因服峻厲之劑脾胃虛熱泄瀉嘔吐飲食少思等證

人參一錢 黃芪炒二錢 甘草生炙各五分

白芍酒炒七分 白茯苓四分 陳皮三分

黃連炒一分

右爲末每服二錢水煎服

犀角消毒散

治斑疹丹毒發熱痛痒及瘡疹等證

牛蒡 甘草 荆芥 防風各五分 犀屑一分

金銀花三分

右水煎熟入犀角領出服

地龍散

治小兒風熱瘻疹狀如傷寒耳尖及手足冷

地龍洗去土焙 穿山甲以皂角灰炒黃各半兩

硃砂二錢研細

右前二味爲細末後入硃砂一處再研和勻每服一錢用紫草煎湯調下不拘時服量兒大小加減

癰瘍方

治大人小兒癰瘍入腹卽殺人

蕪菁子末

右酒調服三錢小兒加減

九味解毒散

治熱毒胎毒而發瘻瘍之類未潰作痛者

黃連炒 芍藥 防風 甘草各三分 金銀花

連翹各一分 當歸八分 山梔四分 白芷六分

連翹各一分 當歸八分 山梔四分 白芷六分

右作一劑水煎母子並服

加味清涼飲

治熱毒積毒在內患瘻瘍大便不通而欲痛作渴者

當歸 赤芍藥 甘草炙 大黃炒各三分

山梔炒三分

牛蒡子炒杵四分

右水煎服

人參消風散

治諸風上攻頭目昏眩項背拘急肢體煩疼肌肉顫動耳若蟬鳴鼻塞多嚏皮膚頑麻瘻瘍瘻瘍目澁昏困

人參 白僵蠶 茯苓 防風 蒼朮 蕺香

蟬蛻 厚朴薑製 羌活各三錢 荆芥穗

炙甘草 陳皮各五錢

右每服一二錢水煎

連翹防風湯

治小兒肝脾風熱時毒頭面生瘡

連翹研碎 防風 黃連 陳皮 茵藥 當歸

獨活 白蒺藜炒去刺 荆芥 茯苓 甘草

黃芩 牛蒡子炒研各等分

右每服二錢水煎服

和肝補脾湯

治風熱瘡疹脾土不及肝木太過

人參 陳皮 川芎各五分 山梔炒四分

白朮 茯苓 茄葉各七分 柴胡 炙草各三分

右分二劑水煎服

益脾清肝湯

治肝脾風熱瘡疹體痛脾胃虛弱

人參 白朮 甘草 茯苓 川芎 當歸

黃芪各三分 柴胡 牡丹皮各二分

右分三黃散

治風熱瘡疹寒熱體痛脾胃虛弱

松香 五倍子 黃連 黃丹 海螵蛸各一錢

輕粉 雄黃各少許

右爲末用蠻肌散煎洗塗之乾者油敷

養心湯

治心氣不足虛熱上攻而患瘡瘍者

黃芪炒 白茯苓 半夏炒 當歸 川芎

幹桂 柏仁 薏仁炒 五味子 人參各二錢

甘草炒四錢

右每服二錢薑棗水煎爲末服亦可

牛黃解毒散

治胎毒頭面生瘡或延及遍身瘡瘍不安浸淫不愈及眉癢瘡

生甘草一兩 牛黃五錢膏藥之人必用之

金銀花一兩 右各爲末每服二三分乳汁調服或用甘草煎膏

爲丸芡實大每一丸白湯化服外傅青金散亦可

拔毒散

治證同前及疥癬瘡瘍

黃芩 黃連 白藜三味俱生用 雄黃各五錢

銅線二錢牽甚加之 松香

右各另爲末乾炒患處或用油調搽

疥瘡宜加枯礬三錢

又方

川芎 酒芩 酒芍藥 陳皮各半兩 酒白朮

酒當歸各一兩 酒天麻七錢半 蒼耳七錢半

酒黃藥 防風 酒粉草各三錢

右㕮咀煎服四五次服之服過睡片時

頭瘡方

豬油一錢半生半熟 雄黃 水銀各二錢半

右研和勻傅瘡上

治瘡頭方 松香一兩乾銚鎔開安在石上候冷取起輕輕研細

黑龍尾卽屋上塵垂掛者 黃丹炒各三錢

白芷半兩 松樹皮燒灰存性 水銀 雄黃

白簪各二錢

右爲末以血餘入香油煎爛調傅患處

青金散

治小兒疥癬眉瘡或延及遍身瘡瘍或膿水淋漓經年不愈

松香二兩 真蛤粉五錢 青黛一錢五分

右爲末用燭油調搽或乾撲之或加輕粉枯礬各三錢以治前證及胎毒疥瘡尤效

水銀膏

治月瘡瘍在兩耳上及竇傍隨月虛盈

水銀二錢半 胡粉 松脂 黃連爲末各半兩

猪脂四兩

右先熬猪脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻

磁盒盛先以鹽湯洗淨瘡塗敷二五度

胡粉散

治月瘡瘍

胡粉炒微黃 白藜殼 虞丹 川黃連淨

輕粉各一錢 融脂一錢 麻香少許

右未先以溫漿水入鹽洗拭後捲藥如瘡乾麻油

調敷

蔓荆子湯

治內熱耳出膿汁

升麻 木通 麥門冬 赤芍藥 生地黃

前胡 甘菊花 甘草 桑白皮 赤茯苓

蔓荆子各等分

右用薑棗水煎食後服

上清散

治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡瘍亦治胎熱眼睛腫赤黃色稀黃壯熱啼哭及身上紅腫

川芎 甘草 北桔梗 天花粉 乾葛