

曹氏傷寒叢書

卷之三



曹氏傷寒發微 目次

原序

自序

丁序

沈序

凡例

卷一

太陽篇 上

卷二

太陽篇 下

卷三

陽明篇

卷四

少陽篇

少陰篇

太陰篇

厥陰篇

霍亂篇

勞復差後陰陽易篇

痝濕暎篇

跋

曹氏傷寒發微目次終

曹氏傷寒發微卷第三

漢南陽張機仲景撰

江陰曹家達穎甫釋義

武進丁濟華
四明沈石頑
校訂

陽明篇

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥實。大便難是也。不識三陽之名義。不可與知。病不識三陽之病情。不足與論治。惲鐵樵以最外一層釋太陽。予常非笑之。夫太陽爲最外一層。豈太陰爲最裏一層乎。脾爲統血之臟。外主肌肉及四肢。而部分亦主腹。以腹爲最裏似矣。然肌肉四肢並爲血脉經絡所繫。恐不得概以最裏名之。無怪自陽明以下。其名義俱不可通矣。蓋太者太。

初太始之謂陽。則以發熱言之。太陽之病。風寒襲於表。血液之溫度抗於裏。血熱戰勝。始發表熱。故名太陽。猶太陰之病。寒濕由表內陷。血液之溫度不能外抗而轉少陽。血分不充。始生裏寒。故名太陰也。可謂陽明。明之言盛也。太陽表氣不由汗竭。則腸胃不燥。當是時。表熱雖發。猶爲未盛也。及肺藏之衛氣。脾藏之營氣悉化爲汗。胃中始病燥實。表熱與裏熱一氣而熱乃熾矣。故知陽明者。實壯熱之變文。亦猶厥陰因手足厥冷而名爲厥陰也。少陽者。寒熱往來。雖病從燥化熱。尙有時而解。其熱固未甚也。從太陽水氣則寒。從陽明燥氣則熱。不似陽明之獨陽無陰。此正如少陰之陰盛。則宜四逆。陽復則宜承氣。不類厥陰之獨陰無陽也。故名少陽。三陽之名義既悉。病之異同乃可得而辨焉。太陽陽明。所以爲脾約者。太陽部分外則爲表。內則爲肌。脾主肌肉。肌腠汗泄太過。則脾氣不濡而約。脾氣不濡。則潤澤不及於下。而腸胃燥。此其所以爲太陽陽明也。胃中陽熱直透肌肉。潮熱日發。則胃中益燥。而胃家始實。此其所以爲正陽陽明也。少陽之府爲胆。爲三焦。

三焦水道外散爲汗。下行爲溺。發汗利小便傷其胃與大小腸之液。胃中消食之胆汁以涸而增益燥煩。於是燥屎結而大便難矣。此其所以爲少陽陽明也。陽明之爲病。胃家實是也。

正陽陽明爲胃家實。前條已詳言之。蓋寒沴於表。風襲於肌。則脾陽頓滯而不能食。新食不進。宿食不去。加以潮熱日作。胃中之液悉爲潮熱所奪。遂成燥屎。由是舌苔黃燥。大渴飲冷。中脘痛而拒按。闕上痛。闕上必痛此予門人王慎軒親驗之右髀有筋牽掣右膝外旁痛。此爲予親驗得之皆胃家實之明證也。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣內實大便難者。此名陽明也。

太陽病之傳陽明。厥有三因。曰發汗。曰下。曰利小便。夫發汗則肌表病氣當從汗衰。不當反因汗而劇。或其人陰液本虧。不勝劫奪。或其人陽氣本盛。易於化燥。則胃中津液衰耗於汗後。渴飲而轉陽明。亦或於一汗之後。潮熱不已。而轉陽明。此

因汗而傳者也。太陽下證極少。設不當下而下。標陽本寒同陷心下。則爲結胸。或標陽獨陷。或表寒獨陷。則爲痞。甚或衛分陽氣先傷於汗。營分陰氣繼傷於下。而心下所結。獨存無氣之濕痰。間亦有下利不止者。惟下後潮熱爲實。故有先用丸藥下之。至自利後而仍宜大柴胡湯者。過經譖語爲熱爲內實。故又有先用丸藥下之。至自利後而仍宜調胃承氣湯者。此本在當下之例。以下非其法而病氣仍留陽明者也。三焦水道與太陽相出入。隨陽上升。則爲汗。水寒下降。則爲溺。惟上出者。有時復降。下行者不能自還。故有汗後胃中燥竭。津液當還入胃中。汗後液少不得小便。得小便利必自愈。此汗後津液當還之明證也。若利小便太過。雖膀胱水結易去。身之發黃易消。而津液既涸。胃必因燥增熱。宿食不下。小腸大腸無所衝激。大便格而不下。此因利小便而轉陽明者也。此太陽轉屬陽明。所以不離乎三因也。

問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒反惡熱也。

予前既言陽之爲熱。明之爲盛矣。此節仲師答詞固卽當解陽明爲熱盛之碠據。身熱與太陽之標熱同。身熱而汗自出。如逢炎暑。如近熾炭。則與太陽之標熱異。人非腸胃中有實熱。雖當暑令遇冰及井水。毛髮爲之凜然。無他心有所畏忌也。至遇之輒喜。絕然無所違忤。甚至好風雨而畏晴日。飲寒泉而拒沸湯。則身中陽熱無可復加矣。蓋必如是。乃謂之陽明矣。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。卽自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

此二節申內經一日太陽。二日陽明之義篇中。一日二日皆以一候言之。謂七日也。太陽傷寒本無熱而惡寒。既而血熱與外邪相拒。血熱漸勝。因而發熱不已。因而汗出。奪其胃液。胃中燥實。因而惡熱。二日惡寒自止者。言七日以上當傳陽明也。按此二節意味不深。合太陽篇二三。三日陽明少陽證不見者爲不傳也。觀之理。

解方爲充足。不然太陽之病原自有從汗解後不更傳陽明者。何所見病致兩候惡寒自止而必傳陽明乎。至如陽明居中土三語既與所問不符。又與下答詞不接。卽非後人僞譏亦必他節脫文於辨證無甚關係。當刪蘿之知我罪我聽之而已。

本太陽病初得時發其汗。汗先出不微。因轉屬陽明也。傷寒發熱無汗。嘔不能食而反汗出濺濺然者。是轉屬陽明也。

此節爲不敢用麻桂者痛下鍼砭以見畏葸太甚者之必遺後患也。予遇惡寒甚者輕者二三錢重者四五錢甚或一劑不愈連服二劑者一年中類此者常百數十證迄未見亡陽之變。蓋發汗必期透暢然後肺與皮毛乃不至留戀餘邪。若汗出不微時時發熱久乃有汗不解津液日損因而轉屬陽明且其證嘔不能食與寒邪初犯太陽者同發熱亦同惟汗出濺濺然者爲獨異知邪傳陽明之必由潮熱矣。予嘗由仲師所未言推闡之傷寒心下有水氣則爲乾嘔寒鬱肌表脾陽內

此乃藏機溫病
辨處之說相同

停則不能食。若病傳陽明則下燥上濕。津液被胃熱蒸迫悉化痰涎。胃熱與濕邪抗拒。因而病嘔。不能食者。胃中本有宿食。胃液因汗而耗。燥結不復下行。胃中壅阻。因不能食。由此觀之。嘔不能食者同。所以嘔不能食者異也。太陽標熱雖盛。常欲擁被而臥。至一傳陽明。則不欲近衣。發熱同。而所以發熱者異也。此條不過示初學以同中求異之法。使不誤於疑似耳。若不於病理求之。則大謬矣。

傷寒二日陽明脈大

此亦申內經二日陽明受之之義也。二日卽七日以上。與上節惡寒二日自止。同例。此云三日傳寫之誤耳。脈爲血管中含有動氣者。裏寒則見縮。故少陰寒證。脉見微細。裏熱則擴張。故證傳陽明脉見洪大。不獨在足之趺陽喉旁之人迎見大。卽手太陰六部之脉亦大。計其時日皆當在七日以上。雖然此亦指冬令傷寒言之耳。若春日皮毛漸開。傳熱較易。則爲日亦少。至於夏秋間溫病。更有朝見太陽而日中即傳陽明者。尤不可以常例論之。自來注家不明。一日之爲七日以上。反

謂內經傳經期日爲不足據。張隱庵又強爲之說。以爲正氣相傳而不關病氣。夫正氣之不受病者。一日之中何經不達。不知何者爲傳。皆夢囈也。傷寒脈浮而緩。手足自溫者。是謂繫在太陰。太陰者身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞭者。爲陽明病也。

傷寒轉繫陽明者。其人濶然微汗出也。

太陽表解未徹。留著肌理。卽見浮緩。浮爲風。緩屬足太陰脾。此與中風之證脉見浮緩正同。手足自溫。卽發熱有汗。惡風之證也。肌肉內應於脾。故曰繫在太陰。風與濕交阻於肌理。則身當發黃。金匱云。濕家身色如薰黃。是其明證。惟小便自利。則濕從下泄。故不能發黃。按內經陽明標陽而本熱。標陽者卽太陽之標。熱本熱者。乃胃底之胆汁。胆汁不能容涓滴之水。惟賴肝液以濡之。若汗泄太過。胃乃生燥。然陽明中氣實爲太陰。陽明不從標本而從中氣。中氣化燥。則大便鞭而轉屬陽明。不化燥。則脾家實而腐穢當去。故此條亦見太陰篇中。但轉繫陽明亦必待

濶然汗出。否則七八日當傳陽明之期。不惟大便不鞭。抑且暴煩下利而見太陰濕證。惟此下利與汗出同一泄之後。卽無餘病。故雖日十餘行而必自止也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。若下之則小便難也。

此節上下兩腹滿字。必有一衍文。玩則腹滿之字之義。似腹滿見於誤下之後。未下時。不應腹滿。然非腹滿。醫者何因而誤下。此必後之腹滿字當衍也。所以爲陽明中風者。太陽初轉陽明。必有潮熱。邪風閉遏皮毛。肺氣不舒。因而微喘。肌表同病。故發熱惡寒。濕熱不從汗解。流入太陰部分。因而腹滿。陽明燥熱。迫胃中胆汁上抗。因而口苦咽乾。皮毛不開。故脈浮緊。若以腹滿之故。疑爲陽明內實。妄行攻下水液。一下而盡。小便遂難。况濕邪粘膩。滲入膀胱。尤難疏泄。蓋此證宜桂枝麻黃各半湯。或大青龍湯之表裏雙解。俾風濕由汗而解。設中脘不運。更爲斟酌下法。以去內實。此亦先解其表後攻其裏之意也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。

陽明之爲病。以潮熱爲驗。潮熱若汗出而肌表虛。風固能中之。寒亦能中之。但風氣散。散則脾陽不受阻阨。胃中能磨水穀。所以能食者。胃中暖故也。寒氣凝。凝則脾陽內停。胃底肝胆之液不能消穀及水。所以不能食者。胃中冷故也。張隱庵注中寒之中讀平聲。謂陽明中見之氣虛寒。殊不必。

陽明病若中寒者。不能食。小便不利。手足濶然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞶後溏。所以然者。以胃中冷水穀不別故也。

陽明者。熱盛之變文。至於中寒。則外陽而內陰。表熱而裏濕。陰寒凝沕。則機發內停。不能食者。脾不引胃不磨也。寒濕下注。則水道腐穢。小便不利者。上汗濁下粘滯也。寒濕在裏。逼浮陽而外泄。故手足濶然汗出。濶然者。微出沾漬而不挾蒸氣也。寒濕滲入腸胃。由臍下痛引少腹。因作固瘕。固瘕卽俗名白痢。粘膩凝結如膠痰狀。設令外見潮熱渴飲。闕上痛。夜不安寐。不大便諸證。亦當以大承氣湯下之。然所下之物。有時初不見糞。但有粘膩之白物。甚有下至三三次而始見糞者。予

嘗治四明胡姓親見之。若但見腹痛下重而時出白物一滴。直四逆湯證耳。但以上二證皆已成固瘕之候。若欲作固瘕而未成者。大便必初鞭後溏。大腸稟陽明之燥。中脘受太陰之濕。設攻其下燥。中脘之濕必且隨之俱下。不急溫之恐寢成寒濕下利矣。

陽明病初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節痛。翕翕如有熱狀。奄然發熱。濺然汗出而解者。此水不勝穀氣與汗共併。脈緊則愈。

陽明病初欲食。既非胃中水穀不別。斷無粘膩之濕邪滲入膀胱。則小便當利。大便當燥。其人骨節反痛。此風濕相搏之證也。夫濕痺之證。關節疼煩而痛。小便不利。大便反快者。則但當利其小便。若風濕相搏。骨節疼煩而痛。小便不利。大便反快者。則當用甘草附子湯以發其微汗。小便不利。大便反快者。濕趨於下。故宜從膀胱以泄之。同一小便不利而濕流於關節。故宜從腠理以泄之。此證小便不利。大便自調。骨節痛與小便不利。大便反快。

之證略相似。然則仲師何不言當利小便。曰此可以片言而決也。反快云者。水濕有直趨下游之勢。自調不過潤下而已。非有暴迫下注之狀也。水氣不下陷其勢猶能外泄。故當有熱狀翕翕外浮奄忽之間發熱汗出而解者。但仲師所謂此水不勝穀氣。與汗共併脈緊則愈三言。向來注家多未了解。不得不略爲分析。蓋水氣屬衛行脈外而達皮毛。穀氣屬營行脈中而發腠理。營氣勝於衛氣。則脾陽內動。汗當由肌出表。營氣勝故內外相持而脈緊。此正如太陽病之脈浮緊。營氣方盛。病邪在表。不難一汗而愈也。

陽明病欲解時從申至戌上。

日昃而陽衰。陰氣乘之地。水氣爲天陽蒸迫。陽盛之時不能超越。必待陽衰而始見。觀夏令暑雨多在日斜之候。卽晴日村落霧靄之氣亦多在傍晚。此可見申至戌上乃太陰濕土當旺之時。張隱庵以爲陽明所主。此真爲古人愚殆不啻桃梗土偶人之冥頑不靈矣。蓋熱盛之證遇陰氣而始解。故陽明欲解時從申至戌

上故有熱發於申至戌上者皆太陰病也。金匱云病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕是爲明證或言日晡所本篇兩見一爲吐下後五六日至十餘日不大便日晡所發潮熱一爲病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明似申至戌上實爲陽明主氣不知陽明熱證得日晡所陰氣當解而反劇者自非本有寒濕得微陰而增重必腸胃燥實而反抗之力強也然則陽明主氣其在已至未上乎大凡陽明證日中必劇其反見形寒者並宜溫藥歷來注家泥於干支生克而不明天人相感之理故特表而出之。

陽明病不能食攻其熱必嘔所以然者胃中虛冷故也。

陽明胃府受病於寒濕以致脾胃不磨水穀不化此時陰盛則病進而爲寒濕下利之四逆證陽回則病退而爲潮熱便溏胸脇滿之小柴胡證若以汗出熱重而漫投白虎或葛根芩連以攻其熱則胃中微陽爲陰寒所錮必且格拒上出遂病呃逆蓋不能食者胃中本自虛冷今更迫之以寒藥故也夫夫中虛冷者飲水猶

病呃逆。豈能更容寒藥。若得此證。非用大劑四逆理中合吳茱萸湯以驅寒而止呃。致胃中寒濕宿垢下陷太陰。甚或一轉而成腹滿加嘔之死證。此其不可不慎也。以其人本虛二句似屬編纂者注文。當刪去之。

陽明病脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩必小便難。此欲作穀癉。雖下之腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

胃底肝胆之液並能消穀。若胃中虛寒。肝胆之液不足。則其脈必遲。遲者虛寒之脈也。太陽篇云。脈數者當消穀。爲其稟肝膽之氣也。夫數爲客熱。尙然不能消穀。何況乎遲。以故食難過飽。飽卽氣壅濕聚而生內熱。氣逆於上。則爲頭眩。濕壅於下。則小便難。此寒熱不食。食卽頭眩心胸不安。所以久久發爲穀癉也。加以小便既難。其腹必滿。此證非去其寒而行其濕。雖下以茵陳蒿湯。其腹滿當然不減。竊意當於茵陳蒿湯內重加生朮。生附以行之。所以然者。則以胃虛脈遲。中陽不運。非如胃實之穀癉。脈見滑大者可以一下而卽愈也。此條並見金匱