

鼎鑠幼幼集成卷之四

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勳案孟氏 校正

滋陽周宗頤盧中氏 參定

○腫滿證治

經曰膚脹者寒氣客於皮膚之間腹大身盡腫皮厚
按之窅而不起腹色不變此其候也又曰諸濕腫
滿皆屬於脾又曰水病下爲跗腫大腹上爲喘呼
不得臥者標本俱病

夫腫滿之證悉由脾胃之虛也脾土喜燥而惡濕因中氣素弱脾虛無火故水濕得以乘之而脾愈不運則乳食凝而不化停積於中而腫滿作焉治腫者當以脾胃爲本而以浮腫爲標斯庶幾矣若以消伐剋削爲能事未有不致危殆者

治腫當分上下經曰面腫者風足腫者濕凡腫自上而起者皆因於風其治在肺宜發散之參蘓飲合五皮湯

腫自下而起者因於腎虛水汎或因於脾氣受濕宜

滲利之。故仲景云。治濕不利小便。非其治也。宜五苓散。加防己。檳榔。

一身盡腫者。或胎稟不足。卒冒風寒。或因癰痢脾虛。皆能作腫。輕者胃苓丸。重者加味胃苓丸。當與末條參攷。

凡小兒之腫。在表者。頭痛身熱。此風寒在表。宜微汗之。五苓散少加麻黃。葛根。蘓葉。杏仁。以發之。若身無熱。五苓散加肉桂。膀胱氣化。小便利而腫消矣。陽水腫。身熱大便秘。小便赤澀。煩燥口渴。以五皮湯。

作煎送沆瀣丹微下之

陰水腫身不熱口不渴身冷怯寒二便自調平胃散
加白苓草菓木香藿香

凡腫證先起於腹而散於四肢者可治先起於四肢
後歸於腹者不可治

若小兒元氣本虛復遇大病之後而渾身浮腫四肢
冷不渴小便清長大便滑泄不思飲食此陰寒之
極脾胃將絕治腫之方俱不可用惟以四君子湯
加青化桂炮薑砂仁白蔻以救其脾胃斯可矣昧

者但見其腫不知元氣之竭絕而猶消導利水復以舟車禹功暨大戟芫花甘遂劫奪之者此殺人
之事慎之戒之、

○入方

參蘓飲

方見三卷咳嗽門

五皮湯

方見二卷傷濕門

五苓散

方見二卷傷暑門

胃苓丸

方見二卷傷濕門

加味胃苓丸

卽胃苓丸本方加後藥

頭面腫初起畧加麻黃 作喘加桑白皮杏仁

小便黃赤加木通 身腫加五加皮

腹脹加砂仁白蔻丁香枳殼

脚冷不溫加附子上桂防已

平胃散

方見三卷瘧疾門

加味四君子湯

治脾敗胃傷陰寒作腫多服自消

官揀參

錢一

漂白朮

錢一

白雲苓

錢五

上青桂

分八

黑炮薑

錢一

西砂仁

錢一

白荳蔻

錢一

公丁香

分三

炙甘草

分五

大棗三枚水煎半饑溫服以愈爲度

○水腫簡便方

凡小兒患腫切須忌鹽鹽助水邪服之愈甚必待腫消之後以鹽煨過少少用之

治水腫從腳起入腹則難治用紅飯豆五升水煮極熟取湯四五升溫浸兩膝之下冷則重煖若已入腹以紅豆煮湯日日服之亦消蓋紅豆之功專於行濕利小便故也

治腳腫掘杉木根切斷而內色紅者爲油杉方可用若切開白色者不堪以紅根切碎煎濃湯將腫腳先熏後洗一二次自消

又方以紅糟一大碗加入生薑生葱三味同煎湯先
熏後洗

又治頭面手足俱腫用苦苧藤一兩隔紙炒熟研細
末以大紅棗蒸過去核取肉和前末杵勻爲丸如
小大豆每服七粒白湯下日三服五七日則小便
多腫自消也忌鹹酸生冷

傷寒傷濕腫以羌活切片萊菔子二味等分同炒香
取起揀去萊菔不用只以羌活爲末每服一錢初
日一服二日二服三日三服效

曉明按大
豆恐倒

曉明按熱
當作熟

腫證氣喘男婦大小腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者至此束手蓋中下二焦氣不升降爲陰寒否隔水遂凝而不通用熱附子三錢生薑二錢沉香三分同煎濃湯冷服大人附子一兩生薑六錢沉香磨濃汁以附薑湯對服不拘服數以愈爲度身面浮腫坐卧不得取向東桑枝燒灰淋汁煮紅豆數升每饑卽食之不得別飲湯水

水腫本於脾虛不能制水水積妄行而爲腫當以參

木補脾爲主使脾氣實則能健運而水自行

切不可下

○脹滿證治

經曰足太陰虛則鼓脹又曰胃中寒則脹滿又曰濁氣在上則生脹○夫脹滿者腹脹氣滿也由於脾肺氣虛不能健運所以作脹也有虛脹實脹熱脹寒脹大抵虛脹冷脹十之七八實脹熱脹十之二三蓋實熱之證人所易見或因傷食或因傷寒入裏所以易知而易治虛冷之證由中氣虛衰脾氣不化而脹所以難見而難醫若以虛冷之脹而

誤以爲實熱之脹治之其變不可勝言矣、

虛脹者或因吐瀉之後或因服藥攻下太過致成腹
脹者宜溫中調氣厚樸溫中湯若虛而兼寒者加
附桂、

實脹者腹中原有食積或飲食過飽固結於中外證
則胃口胸前高脹身熱口渴倦卧不語腹痛微喘
目閉不開儼然虛極之象小兒此證最多而難識
昧者不爲詳察見其四肢不舉目閉不開誤以爲
慢驚而用寧神導痰之藥千中千死無一活者不

知大實有羸狀卽此是也、急宜下之集成沆瀣丹
集成三仙丹同服

熱脹者或傷寒熱邪入裏大便閉結小便短赤渾身
壯熱面赤煩燥集成沆瀣丹

寒脹者由中氣素寒、冷滯鬱結無身熱口渴面唇青
手足厥冷、氣喘腹脹先以塌氣丸消之後以異功
散調其脾胃、

凡遍身瘡疥因淋洗塗搽逼毒歸內而腹脹者輕則
荆防敗毒散升散之重則集成沆瀣丹微利之瘡

出脹消者言瘡不出者凶

經謂臟寒生脹滿蓋脾爲陰中之至陰因脾濕有餘無陽不能施化如土之久於雨水則爲泥矣豈能生育萬物必待和風暖日濕去陽生自然生長也凡此宜以辛熱之藥運用之可也

經謂下之則脹已此以濕熱飲食有餘脾胃素實形體氣質壯實者言之也若脾虛內寒而氣不能運精微以成脹滿者只宜以甘溫補脾爲主少佐辛熱以行壅滯之氣庶使脾土健旺脹滿運行斯可

愈矣此經之所謂塞因塞用從治之法耳醫者不
察乎此惟執下之脹已急於獲效病者喜行利藥
以求通快不知暫快一時則真氣愈傷脹滿愈甚
去死不遠矣

諸家治脹治腫但知行氣利水剋削並行輒用猛劑
下之此速死之道不知脾氣虛極而腫而脹愈下
愈虛惟劫目前之快而陰損真元禍不旋踵後賢
幸加意焉

○入方

厚樸溫中湯

治胃寒心腹脹

紫厚樸

錢五

真廣皮

錢一

黑薑灰

錢一

白雲苓

錢一

草薢仁

分五

南木香

分五

炙甘草

分五

虛兼寒者加熟附子

分五

青化桂

分五

生薑三片大棗三枚水煎半饑服

塌氣丸

治寒氣鬱結肚腹虛脹

胡椒仁

兩一

全蝎尾

錢五

揀去鉤子洗淨炒乾