

金匱鈎玄

丹溪心法

附錄

丹溪先生金匱鈔玄卷第二

門人戴元禮錄 明新安吳勉學校正

心痛 即胃脫痛

心痛雖自數多不喫飲食不可妄用五痛方止梗與緩

痛必須三五服藥後方可喫物

大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食  
寒物而病於初得之時當以溫散或溫利之藥  
若曰病得之稍久則成營矣營則蒸熱熱則久  
必生火原病式中備言之矣若欲丹溫散寧無  
助火妄病耶是古方中多以山梔爲熱藥之

何導則邪伏而病易退正易復而病易安雖然  
病安之後若縱恣口味不改前非病復作時必  
難治之也

山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生姜汁令  
辣再煎小沸服或入芎一錢尤炒山梔大者用  
七箇或九箇大概冒口有熱而作痛非山梔二  
不可佐以姜汁或半夏橘紅各五黃芩三甘草一  
用二陳湯加蒼朮倍加炒梔痛甚者加炒乾姜近  
之反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加  
石鱸川芎蒼朮梔子必炒去皮用作丸服之

凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因  
平日喜食熱物以鉗血流於胃口作痛用桃仁  
承熱湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣  
血藥中兼用之

以物挂按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾姜  
和之有蟲痛者面白白斑唇紅能食屬蟲證苦  
練根錫灰之類脈堅實不大便者下之

痛甚者脉必伏多用溫藥不用參术可用附子  
諸痛不可用補氣藥

客寒犯胃草豆蔻丸用之熱亦可用止用一二服

草豆蔻

一錢  
燒熱去皮

分裹

吳茱萸

湯泡洗  
梗焙秤  
分

去皮

益智仁

白僵蚕

橘皮

人參

黃芪

上

各八分

生甘草

歸身

炙甘草

桂皮

各六分

洗一錢

麥蘖

一錢半

澤鴟

一錢小便多  
黃酒咸半用之

半夏

紫胡四分

詳膈下痛多為用之

右一十八味除榧仁另研如泥外餘極細末同桃仁研勻用湯汽蒸餅為丸如桐子大每服三十丸食遠用熱白湯送下旋斟酌多少用之又方用黃荊子炒焦為末米飲調服亦治白帶

又方脾痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生  
姜煎辣湯調服為佳

又方單用牡粉酒調下一二錢氣實不可用

腰疼 濕熱 腎虛 瘀血

濕熱腰疼者遇天陰或生火而發者是腎虛者疼  
之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

脈大者腎虛用杜仲龜板黃柏知母枸杞五味子

類用猪脊髓丸

脉澁者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花  
濕熱者用蒼朮杜仲黃柏川芎

痰者用南星

凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥  
諸痛不可用人參蓋人參補氣氣旺不通而痛愈  
甚矣

臍下忽大痛者人中如黑色者多死難治也

人面上忽有紅點者多死

腸痛

肝火盛

木氣實 有死血

肝急

有瘀流注

木氣實

川芎

蒼朮

青皮

當歸

龍會丸瀉火要藥

死血

桃仁

紅花

川芎

痰流注

二陳湯加

南星

蒼朮

川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎荳木血病入血藥  
中行血腸痛甚者用姜汁下龍會丸肝火盛故也  
咳嗽腸痛二陳湯加南星多香附青皮青黛姜汁  
腹痛 有寒 積熱 死血 食積 濁痰

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者  
是熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積  
者甚欲大便利彼痛減者是濕痰者凡痛必小便  
不利

脉弦強者食

脉滑者痰

滑痰多作腹痛用苦苣蒼术香附白芷生姜汁入  
湯服腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加黃  
芩黃連梔子

凡心腹痛必用溫散此是鬱結不散阻氣不運故  
病在下者多屬食宜溫散之

一老人腹痛年高不榮下者用

川芎 蒼朮 香附 白芷 乾薑 茶葉

滑石

癰風

四肢百節走痛

風熱

風濕

血虛

大法主方

蒼朮

南星

川芎

白芷

當歸

酒黃芩

在上者加羌活

桂枝

桔梗

威靈仙

在下者加牛膝

防已

木通

黃柏

血虛者多用川芎

當歸

佐以桃仁

紅花

薄桂治偏風無味而薄者獨此能橫行手臂領南  
星蒼朮等治之

上中下痛風方

威靈

三錢

南星一兩

苦芎一兩

桃仁五錢

白芷五錢

桂枝錢

防已半錢

蒼术

二兩

黃柏

酒浸炒

紅花

二兩

一錢

羌活三錢

神曲

一兩

草龍胆

五分

張子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參

一兩

白术

二兩

黃柏

二兩炒黑色

山藥

一兩

海石

一兩

瑣陽錢

乾姜

五錢

燒灰

南星

一兩

敗龜板

酒炙

熟地黃

二兩

粥為丸

治臂痛

半夏

一錢

陳皮伍

茯苓

五分

蒼术

半錢

酒芩

一錢

威靈仙

白术一錢

甘草

炒許

南星 一錢 香附

勞瘵 其主在乎陰虛

痰與血病

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減二  
斗去蒿熬至一斗入猪胆汁一箇再熬數沸甘

草末收之

虛勞身瘦屬火因火燒燥

勞病四物湯加人尿姜汁

咳血 痰盛 身熱多是血虛

戴云咳血者嗽出痰內有血若是嘔血者嘔全血  
若是咯血者每咯出血皆是血疣瘡劙血者鼻中

出血也溺血小便出血也下血者大便出血也雖有各色分六俱是熱證但有虛實新舊之不同或妄言為寒者誤也

青黛 虞子 山梔 海石 瓜萎仁

右為末姜汁蜜調噙化嗽甚者加杏仁後以八物湯加減調理

身熱多是血虛四物湯加減

嘔血 火載血上錯經妄行

脈大發熱喉中痛者是氣虛用參黃芩蜜炙黃柏荆芥并當歸生地黃用之

嘔血用韭汁童便薑汁磨鬱金同飲之其血自清  
火載血上錯經妄行四物湯加炒梔子童便姜汁  
山茶花童便姜汁酒調

鬱金末治吐血入姜汁童便

瘀帶血絲出者童便姜汁竹瀝

又方用韭汁童便二物相吞用鬱金細研入在二  
物之內同飲其血自消

又方治衄血以鬱金如無鬱金以茶姜汁童便和  
好酒調服即止之

各血

姜汁童便青黛入血藥中用之加四物湯地黃膏

牛膝膏之類

衄血

涼血行血為主 犀角地黃湯入麝金同用  
經血逆行或血腥或唾血吐血用韭葉汁立効

溺血 屬熱

山梔子炒水煎服 或用小薊琥珀

有血虛者四物湯加牛膝膏

下血

不可純用寒涼藥必於寒涼藥中用辛味並溫如

酒浸炒涼藥酒煮黃連之類

有熱四物湯加炒梔子升麻秦艽阿膠珠  
下血屬虛當歸散四物湯加炮乾姜升麻

又方用白芷五倍子丸

凡用血藥不可單行單止

有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝生血故也有  
濕傷血宜行濕消熱可也

內經謂身熱即死寒則生此亦是大慨言之必兼  
證詳之則可今豈無身熱生寒而死者

脉沉小流連或微者易治

脉浮大洪数者難愈宜滑不宜弦

仲景治癆可溫者五法可清者十法或解表或利小便或待其自己區分易治難治極密但與濕同立法不分學者當辨之

大孔痛一曰溫之一曰清之

久病身冷自汗脈沉小者宜溫

暴病身熱脈浮洪者宜清

有可吐者 有可下者 有可汗者

初得時元氣未虛必推蕩之此通用之法稍久虛則不可