

2017

执业药师资格考试

押题秘笈

药学专业知识(二)

免费赠送

习题精讲班网络课程

阿虎医考命题研究中心 组编

三套卷子 题题解析



上海科学技术出版社
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位
Top 100 Publishing Houses in China



阿虎医考
AHUYIKAO.COM

执业药师资格考试 押题秘笈

药学专业知识(二)

模 拟 试 卷 一

阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2017 执业药师资格考试押题秘笈. 药专业知识. 二/
阿虎医考命题研究中心组编. —上海:上海科学技术出版
社,2017. 1

ISBN 978-7-5478-3386-5

I. ①2… II. ①阿… III. ①药理学—资格考试—习题
集 IV. ①R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 292515 号

授权码粘贴处

2017 执业药师资格考试押题秘笈·药专业知识(二)

阿虎医考命题研究中心 组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5.75

字数: 88 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3386-5/R·1290

定价: 25.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

执业药师资格考试

药学专业知识(二)

姓 名：_____

准考证号：_____

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 选择性 5-HT 再摄取抑制剂突然停药后，最常见的症状是

- A. 颤抖
- B. 运动障碍
- C. 出汗
- D. 恶心
- E. 意识模糊

2. 属于苯并吗啡烷类合成阿片类镇痛药的是

- A. 芬太尼
- B. 美沙酮
- C. 右丙氧芬
- D. 左啡诺
- E. 喷他佐辛

3. 有明显肝功能损害的患者禁用

- A. 氨己烯酸
- B. 地西泮
- C. 氯硝西泮
- D. 加巴喷丁
- E. 丙戊酸钠

4. 可以减少尿酸的生成，降低血尿酸和尿尿酸含量的药物是

- A. 秋水仙碱
- B. 别嘌醇
- C. 丙磺舒
- D. 苯溴马隆
- E. 塞来昔布

5. 轻中度骨性关节炎的首选药是

- A. 阿司匹林
- B. 贝诺酯
- C. 对乙酰氨基酚
- D. 萘普生
- E. 丙磺舒

6. 下列 NSAID 药具有潜在的心血管风险最大的是

- A. 布洛芬
- B. 塞来昔布
- C. 依托考昔
- D. 双氯芬酸
- E. 吲哚美辛

7. 缓解轻、中度急性哮喘症状宜首选

- A. 特布他林
- B. 沙丁胺醇控释片
- C. 沙美特罗
- D. 异丙托溴铵
- E. 倍氯米松

8. 口服后可出现一过性口腔和咽喉部麻木感的药物是

- A. 可待因
C. 喷托维林
E. 苯丙哌林
- B. 福尔可定
D. 右美沙芬
9. 肾衰竭者长期使用氢氧化铝制剂可引起
- A. 呃逆
C. 腹泻
E. 痴呆
- B. 腹胀
D. 低血糖
10. 不能与碱性药物合用的是
- A. 哌仑西平
C. 西咪替丁
E. 替普瑞酮
- B. 奥美拉唑
D. 硫糖铝
11. 伪膜性肠炎或食物中毒宜首选的微生态制剂是
- A. 双歧三联活菌
C. 长双歧杆菌
E. 嗜热链球菌
- B. 酪酸菌
D. 乳酸菌
12. 下列属于非选择性 β 受体阻滞剂的是
- A. 比索洛尔
C. 普萘洛尔
E. 奈必洛尔
- B. 美托洛尔
D. 阿替洛尔
13. 可见眩晕、头痛、运动失调、口腔金属异味的抗心律失常药是
- A. 美西律
C. 胺碘酮
E. 卡维地洛
- B. 普罗帕酮
D. 维拉帕米
14. 大剂量服用叶酸时,宜注意同服
- A. 维生素 B_{12}
C. 硫酸亚铁
E. 双嘧达莫
- B. 蔗糖铁
D. 重组人促红素
15. 仅促进血管破损部位的血小板聚集而止血的药是
- A. 维生素 K_1
C. 氨甲环酸
- B. 酚磺乙胺
D. 卡巴克洛

- E. 蛇毒血凝酶
16. 在体外无抗凝作用,体内有抗凝作用的是
- A. 肝素
B. 华法林
C. 尿激酶
D. 维生素 K₁
E. 氨基己酸
17. 华法林的作用与肝素相比,下列说法错误的是
- A. 口服有效
B. 应用方便
C. 价格便宜
D. 起效迅速
E. 作用持久
18. 可作为急、慢性肾衰患者首选的治疗药是
- A. 呋塞米
B. 螺内酯
C. 氢氯噻嗪
D. 阿米洛利
E. 氨苯蝶啶
19. 下列药物中与糖皮质激素无相互作用的是
- A. 利福平
B. 酮康唑
C. 氢氯噻嗪
D. 阿司匹林
E. 头孢曲松
20. 子痫、子痫前期治疗的首选药是
- A. 氯化钙
B. 氯化钠
C. 硫酸镁
D. 氯化钾
E. 氯化铵
21. 氯化铵滴速过快可导致
- A. 血压升高
B. 肺水肿
C. 心力衰竭
D. 肌肉疼痛
E. 惊厥、呼吸停止
22. 下列不属于葡萄糖适应证的是
- A. 低血糖症
B. 高钾血症
C. 低磷血症
D. 饥饿性酮症
E. 青光眼
23. 可导致骨髓毒性不良反应的药品是

- A. 诺氟沙星
C. 替考拉宁
E. 四环素
- B. 氯霉素
D. 林可霉素
24. 为了减轻亚胺培南肾毒性,常与其配伍制成复方制剂的药物是
- A. 克拉维酸
C. 他唑巴坦
E. 头孢西丁
- B. 舒巴坦
D. 西司他丁
25. 下列头孢菌素类药物无双硫仑样反应的是
- A. 头孢孟多
C. 头孢拉定
E. 头孢甲肟
- B. 头孢替安
D. 头孢尼西
26. 不属于抗疱疹病毒的药品是
- A. 阿昔洛韦
C. 恩替卡韦
E. 阿糖腺苷
- B. 西多福韦
D. 膦甲酸钠
27. 既可抗乙肝病毒又可以抗 HIV 病毒的药品是
- A. 金刚烷胺
C. 阿德福韦
E. 干扰素- α
- B. 喷昔洛韦
D. 拉米夫定
28. 下列抗疟药主要用于病因性预防的药品是
- A. 青蒿素
C. 奎宁
E. 乙胺嘧啶
- B. 氯喹
D. 伯氨喹
29. 对儿童具有潜在的神经肌肉毒性的抗肠蠕虫药是
- A. 哌嗪
C. 甲苯咪唑
E. 吡喹酮
- B. 阿苯达唑
D. 噻嘧啶
30. 应用甲氨蝶呤 36 小时后,为了既提高疗效又减少不良反应宜选的药品是
- A. 呋塞米
C. 美司钠
- B. 羟基脲
D. 坦洛新

- A. 0.05%维 A 酸凝胶剂 B. 维胺酯胶囊
C. 15%壬二酸乳膏 D. 5%过氧苯甲酰凝胶剂
E. 异维 A 酸胶囊
39. 可用于治疗深部和皮下真菌感染的多烯类药物是
A. 制霉菌素 B. 两性霉素 B
C. 灰黄霉素 D. 酮康唑
E. 特比萘芬
40. 下列关于使用糖皮质激素的用药监护,说法错误的是
A. 患有活动性肺结核者慎用
B. 肺部真菌、病毒感染者慎用
C. 用量尽量节俭,一旦病情控制,用药次数即应减至最小量
D. 儿童使用强效激素制剂连续使用不应超过 2 周
E. 婴儿尿布皮炎应用外用激素制剂应限于 10 日内

二、配伍选择题(共 60 题,每题 1 分。题目分为若干组,每组题目对应同一组备选项,备选项可重复选用,也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意)

[41-42]

- A. 肌阵挛 B. 高血压
C. 出血 D. 意识障碍
E. 5-HT 综合征
41. 氯米帕明与华法林合用,可导致的不良反应是
42. 氯米帕明与肾上腺素受体激动药合用,可导致的不良反应是

[43-45]

- A. 地西洋 B. 丙戊酸钠
C. 奥卡西平 D. 加巴喷丁
E. 苯妥英钠
43. 属于乙内酰脲类的抗癫痫药物是
44. 属于二苯并氮草类的抗癫痫药物是
45. 属于 γ -氨基丁酸类似物的抗癫痫药物是

[46-47]

- | | |
|---------|---------|
| A. 沙美特罗 | B. 孟鲁司特 |
| C. 多索茶碱 | D. 布地奈德 |
| E. 噻托溴铵 | |

46. 属于 M 胆碱受体阻滞剂的平喘药是

47. 属于吸入性糖皮质激素的平喘药是

[48-50]

- | | |
|----------|-----------|
| A. 可待因 | B. 孟鲁司特 |
| C. 沙丁胺醇 | D. 乙酰半胱氨酸 |
| E. 异丙托溴铵 | |

48. 可导致眼压升高的是

49. 可减弱青霉素抗菌活性的是

50. 可引起痰液增稠的是

[51-52]

- | | |
|--------------|--------|
| A. 乳果糖 | B. 酚酞 |
| C. 甘油 | D. 硫酸镁 |
| E. 聚乙二醇 4000 | |

51. 既可用于导泻,又可治疗胆绞痛的是

52. 既可治疗慢性功能性便秘,又可治疗高氨血症的是

[53-55]

- | | |
|----------|---------|
| A. 枸橼酸铋钾 | B. 雷尼替丁 |
| C. 西咪替丁 | D. 山莨菪碱 |
| E. 多潘立酮 | |

53. 急性胰腺炎患者禁用

54. 前列腺增生患者禁用

55. 苯丙酮尿症患者禁用

[56-58]

- | | |
|----------------|------------|
| A. 1 mg | B. 2.5 mg |
| C. ≤ 5 mg | D. 5~10 mg |
| E. 12.5 mg | |

56. 依那普利用于原发性高血压,初始剂量一次

57. 依那普利用于肾性高血压,初始剂量一次

58. 依那普利用于心力衰竭,初始剂量一次

[59-60]

- | | |
|---------|---------|
| A. 硝酸甘油 | B. 普萘洛尔 |
| C. 硝苯地平 | D. 氟桂利嗪 |
| E. 双嘧达莫 | |

59. 连续应用易产生耐药性的抗心绞痛药物是

60. 宜用于冠状动脉痉挛引起的变异型心绞痛的药物是

[61-63]

- | | |
|---------|--------|
| A. 苯妥英钠 | B. 奎尼丁 |
| C. 艾司洛尔 | D. 氟卡尼 |
| E. 地尔硫草 | |

61. 属于I a类抗心律失常药的是

62. 属于I b类抗心律失常药的是

63. 属于I c类抗心律失常药的是

[64-65]

- | | |
|---------|---------|
| A. 甲萘氢醌 | B. 氨甲环酸 |
| C. 酚磺乙胺 | D. 鱼精蛋白 |
| E. 卡巴克洛 | |

64. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

65. 属于促凝血因子合成药的是

[66-67]

- | | |
|---------|---------|
| A. 阿司匹林 | B. 氯吡格雷 |
| C. 替格瑞洛 | D. 双嘧达莫 |
| E. 替罗非班 | |

66. 属于整合素受体阻滞剂的是

67. 属于磷酸二酯酶抑制剂的是

[68-69]

- | | |
|---------|---------|
| A. 氢氯噻嗪 | B. 氨苯蝶啶 |
| C. 呋塞米 | D. 螺内酯 |
| E. 阿米洛利 | |

68. 明显液体潴留心力衰竭的首选治疗药是

69. 醛固酮升高引起的顽固性水肿宜选的治疗药是

[70-71]

- | | |
|---------|---------|
| A. 坦洛新 | B. 度他雄胺 |
| C. 西地那非 | D. 丙酸睾酮 |
| E. 普适泰 | |

70. 松弛前列腺平滑肌,减轻膀胱出口压力的是

71. 缩小前列腺体积,减少膀胱出口梗阻的是

[72-73]

- | | |
|---------|---------------------|
| A. 辛伐他汀 | B. 华法林 |
| C. 二甲双胍 | D. ¹³¹ 碘 |
| E. 利福平 | |

72. 慎与甲巯咪唑合用的是

73. 慎与卡比马唑合用的是

[74-76]

- | | |
|---------|----------|
| A. 二甲双胍 | B. 丙硫氧嘧啶 |
|---------|----------|

C. 格列齐特

D. 司坦唑醇

E. 格列吡嗪

74. 空腹血糖较高的患者宜选用

75. 餐后血糖升高的患者宜选用

76. 肥胖的 2 型糖尿病患者宜选用

[77-79]

A. 甘精胰岛素

B. 精蛋白锌胰岛素

C. 门冬胰岛素

D. 普通胰岛素

E. 低精蛋白锌胰岛素

77. 属于超短效胰岛素的是

78. 属于中效胰岛素的是

79. 属于超长效胰岛素的是

[80-81]

A. 维生素 B₂

B. 维生素 C

C. 维生素 A

D. 维生素 A、维生素 D

E. 维生素 E

80. 大量或长期服用可引起牙龈出血的是

81. 大量应用可致血清胆固醇及三酰甘油升高的是

[82-83]

A. 精氨酸

B. 赖氨酸

C. 复方氨基酸注射液(3AA)

D. 复方氨基酸注射液(18AA)

E. 复方氨基酸注射液(9AA)

82. 可用于慢性迁延性肝炎治疗的是

83. 用于急性和慢性肾功能不全患者的肠外营养支持的是

[84-85]

A. 四环素

B. 链霉素

- C. 红霉素
D. 多西环素
E. 阿米卡星

84. 使用后患者在日晒下可出现光敏现象的是

85. 静脉快速滴注可发生心脏毒性的是

[86-88]

- A. 白细胞减少的机会增加
B. 血清半衰期缩短
C. 肾毒性增加
D. 抗凝作用增强
E. 血小板减少的机会增加

86. 甲氧苄啶与利福平合用可使

87. 甲氧苄啶与环孢素合用可使

88. 甲氧苄啶与华法林合用可使

[89-91]

- A. 食欲减退
B. 失眠
C. 红绿色盲
D. 呕吐
E. 关节痛

89. 吡嗪酰胺常见的不良反应为

90. 乙胺丁醇常见的不良反应为

91. 对氨基水杨酸钠常见的不良反应为

[92-94]

- A. 多烯类抗真菌药
B. 咪唑类抗真菌药
C. 丙烯胺类抗真菌药
D. 棘白菌素类抗真菌药
E. 灰黄霉素抗生素类抗真菌药

92. 特比萘芬属于

93. 米卡芬净属于

94. 制霉菌素属于

[95-97]

- | | |
|---------|-----------|
| A. 月经不调 | B. 男子乳房发育 |
| C. 高钙血症 | D. 血栓栓塞 |
| E. 男性化 | |
95. 属于孕激素类抗肿瘤药迟发毒性的是
96. 属于抗雌激素类抗肿瘤药迟发毒性的是
97. 属于抗雄激素类抗肿瘤药迟发毒性的是

[98-100]

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 左氧氟沙星滴眼液 | B. 硫酸阿托品滴眼液 |
| C. 毛果芸香碱滴眼液 | D. 去氧肾上腺素滴眼液 |
| E. 更昔洛韦滴眼液 | |
98. 用于单纯疱疹病毒性角膜炎宜选用
99. 用于急性闭角型青光眼宜选用
100. 用于眼底检查及验光前的睫状肌麻痹宜选用

三、综合分析选择题（共 10 题，每题 1 分。 题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。 每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

[101-103]

患者，女性，45 岁。近两年来经常头痛、头晕、耳鸣、心悸、记忆力减退、手脚麻木，近一年来于清晨睡醒时经常出现心前区疼痛并向右肩部放散。就诊时，血压 175/105 mmHg，心电图表现为弓背向下型 S-T 段抬高。诊断为高血压合并心绞痛。

101. 根据诊断，此患者最宜使用的降压药物是
- | | |
|---------|---------|
| A. 卡托普利 | B. 厄贝沙坦 |
| C. 阿利克仑 | D. 利血平 |
| E. 硝苯地平 | |
102. 该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是
- | | |
|---------|--------|
| A. 干咳 | B. 癫痫 |
| C. 水肿 | D. 光过敏 |
| E. 心动过缓 | |

103. 若想克服或缓解上述不良反应,联合用药宜选用

- A. 卡托普利
- B. 卡马西平
- C. 阿利克仑
- D. 利血平
- E. 地高辛

[104-106]

患者,女,65岁。体检发现血糖高前来就诊。经诊断为“2型糖尿病”。医师处方吡格列酮(15 mg, qd)控制血糖。

104. 该患者适宜的服药时间是

- A. 餐前半小时
- B. 餐后半小时
- C. 餐后一小时
- D. 随餐服用
- E. 与进食无关

105. 该药常见的典型不良反应是

- A. 胰腺炎
- B. 体重减轻
- C. 体重增加
- D. 视物模糊
- E. 荨麻疹

106. 若患者反馈疗效不佳,可考虑加量直至

- A. 20 mg
- B. 25 mg
- C. 30 mg
- D. 40 mg
- E. 45 mg

[107-110]

抗菌药物的应用涉及临床各科,合理应用抗菌药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及减少或延缓细菌耐药发生的关键。抗菌药物临床应用是否合理,基于以下两方面:有无抗菌药物应用指征;选用的品种及给药方案是否适宜。

107. 关于青霉素的使用,说法不正确的是

- A. 使用前须询问过敏史
- B. 可根据患者服药途径选择是否需要做皮肤敏感试验
- C. 结果呈阳性反应者禁用
- D. 过敏反应一旦发生,可即给患者皮下注射肾上腺素进行抢救