

本草綱目

下冊

R281.3

22

新安陳嘉謨延永纂輯

門生 欽邑葉斐 鮑倚 校刊
譚陽後學 劉孔敦 姪晨 若樸 增補



木部

〔桂〕味甘辛氣大熱浮也陽中之陽也有小赤採皮宜冬至同餌忌生葱收必陰乾勿見天日用陳祖片餘剝須密紙重

畏犯風免辛氣泄揚種類多服地產各處〔箇桂〕正圓無骨形類竹生交趾桂林〔牡桂〕區區薄皮產南海山

谷〔官桂〕品極高而堪克進貢却出觀賓州名屬廣東一說世人以觀字筆畫多懶書之故只作官如寫黃藥作柏薑作姜同意亦通〔木桂〕皮極厚而

肉理微虛不發從嶺〔箇桂〕因皮嫩如箇卷束〔板桂〕謂皮老若板坦平〔柳桂〕係至軟枝梢〔肉桂〕

指至厚脂肉〔桂枝〕枝梗小條非身幹簾厚之處〔桂心〕近木黃肉但去外甲錯簾皮品分既明欺罔難入

又各主治亦煩詳知箇桂箇桂相同一說箇字近似人誤書之習以成俗也養精神和顏色耐老牡桂桂枝一類堅骨節通血脈墮

胎四者性并辛溫難作風寒正治柳桂桂枝味淡能治上焦頭目兼橫行手臂調榮血和肌表止煩出汗疎邪散

風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂性熱堪療下焦寒冷併秋冬腹疼泄瀉利水道溫筋煖臟破血通經經云

氣厚則發熱是也桂心美之之義性暑守治多在中官桂貴之之辭味甚辛治宜解表如此之異蓋緣本乎天者

親上本乎地者親下理之自然性分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑桂心入心在牙少經之經本經註

云桂有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏頭附子為使全得熱性與人參麥門冬甘草同用能調中益氣實衛護榮與柴胡紫石英乾地黄同用却主吐逆與巴豆礬砂乾漆穿山甲水蛭蜜蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒矣春夏禁服秋冬宜煎

誤

按諸桂所治不同與非各因其材而致用也然本經謂桂止煩出汗仲景治傷寒乃云無汗不得服桂枝又云汗過多者桂枝甘草湯是又用其閉汗何特反其經義耶抑一藥而二用耶噫此正所謂殊途而合轍也蓋桂善通血脉本經言桂止煩出汗者非桂能開腠理而發出汗也以之調其榮血則衛氣自和邪無容地遂自汗出而解矣仲景言汗多用桂枝者亦非桂枝能開腠理而止住汗也以之調和榮衛則邪從汗出邪去而汗自止矣昧者不解出汗止汗之意凡病傷寒便用桂枝湯幸遇太陽傷風自汗者固獲奇効倘係太陽傷寒無汗者而亦用之為害豈淺鮮乎猶有謂仲景之治表虛而一概用歛虛汗者此又大失經旨矣

官桂

桂 牡

桂 蘭



〔栢實〕味甘辛氣平無毒近道俱有乾州

屬四

獨佳屋邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以醇酒浸曝

乾次取黃精汁和煮熱筋連攪盡汁纔休研細成霜入刮方効畏辛薊麴麵諸石

年根薊元神
麴白麵一切石


使牡蠣瓜子桂

皮聰耳目却風寒濕痹止疼益氣血去恍惚虛損欬汗治腎冷腰冷併膀胱冷膿宿水潤腎燥体燥及面顏燥澁


不先與陽通殺百邪止驚悸安五臟頭風眩痛亦可煎調久服不餓增壽耐老○〔側栢葉〕苦澁翠區者採

收務向月令建方春採東夏採南秋冬微此纔得節候生氣即止吐衄崩痢重生髮鬚眉為燥濕仙丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒蟲痢立痊（白皮）燒灰敷火灼爛瘡長毛髮亦驗（枝節）釀酒主惡節風痺癰癤疥犬靈凡患癩瘡及牛馬畜產有疥並燒敷二三次無不愈

乾州栢實



密州側栢



藥皮一味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒樹高蜀產皮宜夏收擇內黃緊厚為優去外褐簾造纔製先漬蜜水

日際曝乾

糖火邊炙燥惡乾漆治三焦二製則治上焦單製則治中焦不製則治下焦也乃足少陰本藥

又足太陽引經加黃耆湯中使足膝氣力湧出痿癰即差和蒼朮散內即二俾下焦濕熱散行腫脹易退佐澤瀉

利小便赤澁配細辛擦舌賴紅瘡

一方同青黛研細入水片少許擦之亦効

安虛噦就蟲瀉隱伏龍火解消渴除骨蒸補腎強陰洗肝

明目腸風通下血者立効熱痢先見血者殊功去臍腹內濕瘡逐膀胱中結熱女人帶濕亦可治之○（根）

名（檀桓）如苓結塊瘡心腹百病主長生神仙不渴不餓安魂安魄

誤按內經云腎苦燥也活人解毒湯用黃蘗黃連黃芩梔子蓋梔子黃芩入肺黃連入心黃蘗入腎
燥濕所歸各隨其類而然也上下內外並可治之換熱門中試為要藥至今醫家氣虛用四君子血虛用四物
有疾用二陳有熱用解毒故常案述而不易焉

黃蘗



商州黃蘗




〔摘實〕味甘氣寒無毒近道雖有柴陽屬河南獨多每產廢田又名穀實葉類蒲葦作辦實如彈子結蓬初生綠青漸

熟紅赤待深秋採摘浸水以去皮瓢取中子曝乾投酒再浸晝夜務蒸後已至亥任用煎膏為丸陰痿能強水腫
可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞悅顏色輕身壯筋骨明目〔葉〕主小兒身熱食下使生肌〔皮〕煎逐水
利便浸爛又可作紙〔莖〕煮淨洗疥癩立效〔皮開白汁〕薦收塗解更數蛇咬○〔紙〕燒存性調酒汁
亦止血暈血崩男一有印紙一燒吞衛門中有新婦人產如神効

漢按橘有二種名亦不同葉有辨者曰橘葉無辨曰橘音殺一說皮斑者橘皮白者橘多生久廢穀田結實味甘
 又因名曰穀實也詩云爰有樹檉其下維穀是爾即今幽州猶云穀桑荆揚文廣咸謂之橘每逢秋月剝取其
 皮或織為履穿或搗作紙賣色甚光澤媒利無涯所入醫方惟貴其實赤者頻服不先不飢筋力倍增行及奔
 馬並載經注決無欺人奈創補華中用者稀少惜哉惜哉

橘實



以竹葉一味甘淡氣平寒陰中微陽無毒竹類頗多難指何是惟嘗笋味淡者為然篁竹雷竹水竹味淡兼甜治病
 第一筴竹猶竹味皆純淡採用亦宜苦竹紫竹苦棘而難不堪入藥東坡種公云淡竹者對苦竹為文陰苦竹之
 外皆淡竹也述此觀之足可徵矣逐上氣欬喘促退虛熱煩燥不眠專涼心經尤却風症一種草類如鐵線莖似嫩稷葉長尺餘亦名淡
 竹葉落多採利小水治喉痺等證並神効一根一止消渴散毒補虛一實一通神明輕身益氣一皮茹一剝去青色惟取肉裏黃皮主

胃熱飢逆疎功療噎膈呃噦神効 ○ 一敗胎茹 原亦竹皮刮下大扁扁用程漏處極多取乾煮之亦止諸血

○ 燒取 一竹漚 與荆漚同橫鋸截天餘直劈作數塊而磚架起緊火中烘漚後兩頭流出少加薑汁調服 每漚

加生薑自 然汁二匙 却陰虛發熱理中氣噤牙小兒天吊驚癇入口便定婦人胎產向暈下咽即甦衍義云胎前不損子產

後不得虛止驚悸却痰涎痰在手足四肢非此不達痰在皮裏膜外有此可破但世俗反以大寒置疑不用殊不

知係大熱出又佐薑汁有何寒乎 ○ 一竹肉 一狀如肉腐無生苦竹枝上鳴譚般大生咬毒多載人喉類朱紅

且令爪甲變黑煩灰汁煮鍊三度然後依常藥食之殺三蟲破老血別有功效人未盡知 ○ 一竹箐 惟感夏

間以類麻角色白係慈竹逢雨淋漓每滴汁着地發生同薑苗煮嘗痢赤白治驗 ○ 節內黃粉即 一天生黃

俗云天竺 旋飛塵沙結成老竹間或可得形類黃土一名竹膏治小兒急慢驚抽療肥人卒暴風中鎮心明目解

熱去邪 ○ 一竹笋 發氣托瘡瘡更止消渴利小便 ○ 一桃竹笋 苦有毒 懶笋不成竹者 俗謂頑笋是也 用搗成膏六畜

皮肉生蛆納入盡出灰汁煮纔可食不爾亦載人喉 ○ 更有 一仙人杖 味鹹是笋成竹時之灰色黑如漆收

宜及初惟苦筍竹多生專主噦氣呃逆大人翻胃反食以水煮嘗小兒驚癇夜啼安身伴睡痔漏去血燒末湯吞

○ 一舊篋齒 亦載醫方治活蟲入腹為病狀如癰癰煮服即除

淡竹葉



松脂一味苦甘氣溫無毒番天下植蒼州土不拘大水中流米漚清

松脂别名

便是採取煤利鑿多竅可逐貪心鍊餌延

年待自流易奏捷効擇通明成顯分向背陰陽向向日月照者為陽脂向北日月背者為陰脂陽脂補陽

陰脂補陰仙經亦云不見日月者皆可取服以人多陰虛欲其專補陰爾製鍊有方依式無錯水盛釜內瓢安水

旁白茅藉甑底兩層黃沙蓋茅上寸許松脂任布垂紫紫炊湯減少旋添脂沉盡方出新鼠為棕投冷水沈釜底者勿用

候凝結復灶如前週畢三迴色白如玉研和群藥加白茯苓柏子仁甘菊花共剉亦可單服為丸酒吞逐諸風安五臟除伏熱胃脘解

消渴咽嗑輕身通神延年耐老熬膏貼瘡毒長肉作散治齒痛殺蟲一寶主少氣虛羸兼敗風痺一花一維輕

身益氣發熱上焦一善

花底善


收晒乾研末羅細雞清雞彈

丸或豆粒暑痢止澀如神一根白皮主辟穀不飢

補虛損勞乏一節一性溫燥血中之濕却脚痺軟痿一葉一味苦溫能生毛髮搗爛敷風濕瘡効懸挂辟瘟疫氣

靈應節諸風漬酒可服〔松蘿〕一名女蘿詩云葛藟女蘿施于松上陶云
 葛是寄生當用桑上者女蘿當用松上者苦甘無毒煎濃可作吐湯湧客疾截濕
 瘡利水道敗頭風掃頂上瘡痰去項間瘤癭坐汗堪止嗅怒能清

松脂



〔茯苓〕味甘淡氣平屬金降也陽中陰也無毒近道便有雲貴雲南貴州獨佳產深山谷中在枯松根底由木被斧斤砍

伐或老遭風雷折摧枝葉不復上并津氣旋向下泄凝結成塊乃名茯苓因其本体相離故取附之之義小如鵝

卵大若瓠瓜猶類龜鼈人形並尚沉重結實四五斤塊者愈佳久藏自有異朽蛀初收採須仗陰乾咀片水煎黑皮淨剝

研末先服赤筋盡淘茯苓中有赤筋最損目為丸散久服者研細末入細布袋中以冷水揉撮如作膏粉狀澄取粉而筋滓在袋中者棄去不用若煎湯則不須爾方益心脾不損眼目

忌酸物惡白飲仍畏牡蒙地榆雄黃秦艽兔甲種赤白主治略異經上行走自殊一赤茯苓一入心脾小腸屬

己丙丁瀉利專主（白茯苓）入膀胱腎肺屬辛壬癸補益兼能甘以助陽淡而利竅通便不主精氣功並車前
利血僅在腰臍効同白朮為除濕行水聖藥乃養神益智仙丹生津液緩脾敗痰火益肺和魂鍊魄開胃厚腸却
驚痛安胎孕久服耐老延年不飢餒汗多陰虛者誤煎傷元天壽若小使素利者過服助燥損明暴病有餘相宜
久病不足切禁凡須細察不可妄投。○（茯苓）附結本根因津洩少謂既不離其本故此為名体比苓略鬆
皮與木瀆去所忌畏惡悉做於前專理心經善補心氣止恍惚驚悸除悲怒健忘心木名（黃松節）載經偏風
致口喎僻治驗

誤

按經注有曰松木既樵根尚能生物者何也蓋因精英未淪沾其土氣不能不為物爾正猶馬勃茵蓐五芝
木耳石耳之類多生枯木潤石壘土之上則可知焉其上莖絲下有茯苓之說甚為輕信者矣又曰茯苓為在
天之陽陽甯上行何謂利水而瀉下也經云氣薄者陽中之陰所以茯苓利水瀉下亦不離乎陽之本體故入
手足太陽經焉丹溪又曰茯苓猶蒼澤瀉各有行水之能久服損人八味丸用之亦不過接引諸藥歸就腎經
去胞中久積陳垢以為搬運之功也

第一卷白朮款後 誤 按宜參看

茯苓



〔琥珀〕味甘氣平屬金陽也無毒出自松脂所化入土千歲變成初如桃膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光南群亦

生色深重濁

嵌首飾澈光為奇入藥剉重濁不計

手摩挲可拾草芥湯煮軟儼若錫糖遇物即粘如是方妙今市家多煮雞彈及青

魚枕造成不可不細詳爾入藥研末用湯調吞利水道通五淋定魂魄安五臟破癥結瘀血殺鬼魅精邪止血生

肌明目摩腎治產後血暈及兒枕痛療延熾金瘡併胃脘痛○又種〔瑩〕者名異產同狀似玄玉而輕質亦

松脂化出歷二千載方得成形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造器見風即開小兒帶之謂能辟惡

誤

按丹溪云古方琥珀利小便以燥脾土有功益脾能運化肺得下降故小便可通也若血少而小便不利者

用之反致燥急之患不可不謹別況又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生於陰陰琥珀生於陽而成


於陰故皆治榮而安心利水其効同也

〔墨〕味辛無毒擇係松煙造成摩入藥創主治煙細繞効煙瘡不靈其桐油煙石油煙併罌草及偽為者俱不可以治病也止血果捷因黑勝紅故天行熱毒鼻衄下血敷汁水摩滴入若產後血暈崩中卒暴來紅摩醋服之遊絲纏眼中摩鴉血速點客忤中腹內摩地漿頓吞下死胎而逐胎衣合金瘡以生膚肉

槐實〔味苦辛鹹氣寒無毒析枝插地即活人家多植門庭實生莢中十月收採粒大如豆色紫而堅一莢兩粒三粒者為良若係卑粒五粒者勿用小銅錘擊碎烏牛乳浸宵蒸過繞煎炙為使主五內邪熱去五痔腫疼七月取搗紋汁貯銅器內置高處曝二十日以上止涎唾補絕傷涼大腸消乳痂除男子陰瘡濕瘡不歇却女人產戶前痼硬圓如鼠薹大納穀道內三易之乃愈

痛癢難當仍理火瘡且墮胎孕酒吞七粒催產尤良〔嫩房莢〕收煎代茶去頭風明目補腦〔老莢〕疎導風熱亦可取搗煎膏〔白皮〕煮酒治風皮膚不仁服効消陰疝卵腫却壯熱驚瘋〔莖葉〕功同忌治瘡毒熱膏貼癰疽潰爛煮汁漱口齒風疳〔根〕作神燭可燒仍主喉痺寒熱〔枝〕洗瘡佳瘡嫩搗齒殺蟲〔花〕味甚苦炒黃亦涼大腸去熱理腸風瀉血及皮膚風止痔瘻來紅併赤白痢去胃脘卒痛殺腹臟蛔蚘〔膠〕主諸風化涎任作湯散丸服却風痺肢難舉動散風毒身如蟲行噤口急風珠功破腦傷風立効〔槐耳〕係菌亦樹所生堅如桑耳者良用你細末酒服去婦人陰中瘡痛治痔瘻穀道血流

槐實



〔枳實〕味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽無毒商州

屬河南

所生似橘極小擇如鵝眼色黑陳者良

近道亦生一種俗呼臭橘

其皮微綠不堪墜用今市家每採指為綠衣者欺世媒刊無益有損故凡入藥則必求黑色為真也

剉淨內瓢剉片麩炒用本與枳殼一物因收遠近異名枳實秋

收枳殼冬採今醫者不以此泥惟視皮厚小者為實完大者為殼也殼大則性詳而緩治高者主氣治在胸膈

實小則性酷而速治下者主血治在心腹故胸中痞肺氣結也有桔梗枳殼湯之類心下痞脾血積也有白朮

枳實湯之用

白朮補脾枳實去脾經積血脾無積血則不病也

此高下緩急之分易先詳定以為準的也除脹滿消宿食削堅積化痼疾

破氣佐牛大黃芒硝益氣佐人參乾薑白朮仲景加承氣湯內取疏通破結之功丹溪入瀉痰藥中有剉壁衝

墻之捷〔樹皮〕治風中身直久不能屈伸〔根皮〕主痔瘡赤紅及腸風臟毒〔樹莖〕併〔皮〕收採水脹

風痛齊敗○其大枳殼亦貴陳年取翻肚如盈口唇製剉片麩炒瀉肺臟寬大腸結氣胸中兩脇靈脹者

急服發疹肌表遍身苦瘡者宜加逐水飲傳函關節並利破痰癖積聚宿食亦推同甘草瘦胎即損殼散和薑連減痔

第七卷青橘皮款後讀按宜參看

枳實



〔女貞實〕即冬青樹子 味苦甘氣平無毒鄉落幽居多植遮護能欺霜雪又名冬青黑實遇冬至採收去皮將布袋按淨

酒浸一宿日曝待乾研末為丸用旱蓮草熬膏合妙搗碎漬酒同生地黃投罐煮良黑髮黑鬚強筋強力安五臟補中氣除百病養精神多服補血去風久服健身不者〔樹皮〕涼而無毒若漬酒每日飲亦益肌膚〔枝葉〕

煎可染緋又燒灰面膏塗能治瘡疥〔木〕白紋細而板堪為○〔蟲白蠟〕附樹枝結成係小蟲食樹汁化者蟲類蟻蠹有白有黑每食冬青樹汁久而化為白脂蠟則成蠟人謂蟲屎看樹而然非也亦有不變蠟者則結 芭披上切如黍米折團大青紫宛若樹之結實土人呼為蠟種來年春深則芭折而蟲出延樹矣欲廣蓄者候

芭將折時連枝採繫他
 樹其蟲亦應候而出
 連秋刮取以水煮熟濾置冷處之中
 或濾冷水內亦可
 但去渣滓淨為美
 自然凝聚成塊文理瑩澈不忝

膏本經原脫漏未書丹溪始珍重
 續用膏與戴原禮簡云白蠟者稟氣收斂堅凝誠為外科要藥生肌止血定痛
 接骨續筋補虛與合歡皮同煎入長肉膏神効但未試可服否其合歡皮服之驗矣
 蠟有二種蜜白蠟人可服
 白蠟本經未載後因丹溪此簡有未試可服
 否一句乃知言此蟲蠟也故採之以補脫漏
 〔百蠟塵〕取能治瘡蟲
 本經石蜜款內曾已載詳其

女貞實



〔棟〕音
 練〔實〕即金
 鈴子
 味苦氣寒有小毒蛟龍極畏堤岸多栽在處有之川蜀獨勝木高丈餘略大葉密如槐稍長花

紅紫甚香實青黃類彈待冬收採向日曝乾取肉堪煎去皮去核一說將核搗碎漿水煮一伏時瀝晒收藏亦堪
 入藥大抵用枝莫用肉用肉莫用核此常理也主中濕傷寒大熱煩狂理膀胱小腸疝氣昂痛利小便水道殺三
 蟲疥癬〔根〕性微寒雌雄兩種雄根赤與于大毒忌煎雌根白子多微毒宜採擇向東者纔入藥靈驗刮外青

只淘粟白單味煎酒大能追蟲宜月前忌月後月半後蟲頭向上先啖鳴彈餅引蟲口開頓飲濃藥湯過晝即利
多則成團追下少則逐條推來積聚行疼痛止亦堪研細末敷作癰蟲瘡○又一石茱萸一即花落子外科亦
用醫者當知

棟實

狔扶一味甘氣溫微寒無毒生函谷及巴西河東類烏豆但略圓而匾外有紋理六月採收碎揅殼取仁去皮尖研
 燭輔佐良藥專治眼科消上下胞風腫爛弦除左右眦熱障努肉退火止淚益水生光〔雜子〕咳之亦止鼻衄