

08706

514313

秦氏幼科折衷

秦氏幼科折衷

上海古籍書店複印

二冊定價十一元

五五·一·四〇〇·八〇·七

幼科折衷下卷目錄

汗症

滯頤

魚症

耳症

喉痺

大便閉

小便閉

口疳

疳症

五淋

眼目

鼻症

口症

陰囊腫

尿管道溺

麻木

諸瘡

風毒

疔症

小兒初生諸疾

乳哺宜慎擇論

發蒸

五臟相勝之邪

五臟補瀉法

鷓鴣雞

甘毒

夜啼

胃氣虛寒

脉法

護養法

五臟虛實所主

五臟虛實鬼賊微正

五臟伏飲喜傷主病

五臟氣絕症

運氣摠論

五臟氣絕症

幼科折衷卷下

廣壁山人景明秦昌運編集

摠括

汗症

小兒自汗症多端。切莫將為一例看。

要識陰陽虛實候。調理自平安。

脈法

脈大而虛浮而濡者。在尺為自汗。在

寸為盜汗。

傷寒脈陰陽俱緊。當無汗。若自汗者。

為亡陽之症。不治。

凡汗出髮潤。一不治也。汗出如油。二

不治也。汗凝如珠。三不治也。

通身有汗。謂之熱越。熱氣越于四體。

內經曰。心之液為汗。原病式曰。心熱則汗出。東垣云。西南坤土也。在人為脾胃。夫人之汗。猶天地之雨。陰滋其濕。則為霧露。為雨也。按內經。獨主于心。而東垣又指脾胃。而言。何也。蓋心為君火。主熱。脾胃屬土。主濕。濕熱相搏。為汗明矣。亦如地之濕氣為

也。雖熱汗出，醒而收者為盜汗。

丹溪云：自汗為氣虛，入參黃芪以佐。

以桂枝湯，虛甚附子湯亦可。

桂枝湯 見驚風症內

附子湯

盜汗屬血虛，當歸大黃湯。神如火，氣上蒸，胃中之濕亦然，作汗涼膈散主之。

當歸大黃湯

當歸

生地

熟地

黃芪

黃連

黃芩

黃柏

涼膈散

桔梗

甘草

薄荷

山梔

胃氣服全蝎觀音散

雲霧而上升于天，若不下降，則不成霖雨也。夫五臟皆令人出汗，獨心與脾胃主其濕熱，此乃總司耳。故經曰：飲食飽甚，汗出于胃；驚而奪精，汗出于心；持重遠行，汗出于腎；疾走恐懼，汗出于肝；搖體勞苦，汗出于脾。若自汗與盜汗者，病雖似而實不同也。細詳如左。

小兒脾虛自汗，多出額上，沾粘人手，速救。

連翹

大黃

芒硝

全蠲觀音散

蓮肉

人參

扁豆

天麻

脾虛瀉自汗遍身冷而出有時遇瀉則無

防風

全蠲

羌活

白芷

服之

木香

黃芪

茯苓

神曲

甘草

肺虛自汗右臉色多皸白肺脈按之無力

參苓白朮散

見霍亂症內

補肺散

久因咳嗽連聲不已乃肺經虛氣上壅致

阿膠

茯苓

龍鈴

糯米

令汗出宜補肺散為治及以藿香飲調脾

杏仁

甘草

此又益母救子之義也

藿香飲

人參

半夏

赤茯苓

甘草

慢驚自汗遍體俱有其冷如水此症已危

蒼朮

陳皮

藿香

厚朴

詳慢驚論內

百解散 見熱症內 一方加升麻

五苓散 見驚風症內

三稜散 見諸吐症內

抱龍丸 見驚風症內

茯神湯

茯神 人參 當歸 甘草

黃根服

有實症自汗、外因感冒風邪發熱、無問昏醒、浸、汗出、常用百解散、或間投五苓散、有小兒無疾、睡中汗出如水、覺而經久不乾、此名積症盜汗、脾冷所致、用三稜散、有時、冷汗微出、髮根如貫珠、面額上澱、然、此為驚汗、宜抱龍丸、及茯神湯、加麻

有睡中汗自出者、曰盜汗、此陽虛所致、久不已、令人羸脊枯瘦、心氣不足、津液妄出

故也用灰神湯加黃芪煎服

提括

脈有七症君瀆訖於癰寒水筋血氣
提之寒氣結而成丹溪獨新提括致

脈法

寸口脈強而緊弦則衛氣不行衛氣
不行則惡寒惡則不欲飲食弦脈相
搏則為寒疝

怒則氣上喜則氣緩悲則氣消悲則

氣下寒則氣收熱則氣泄陽則氣耗

思則氣結

疝症

宜與囊腫參看

內經曰腎脈太急沉肝脈太急沉皆為疝
又曰三陽結為瘕三陰結為疝難經曰任

脈之為病其內苦結男子為七疝夫謂七

疝者寒水筋血氣於癰是也自素問而下

俱稱寒氣結聚之所為故令臍腹絞痛也

而丹溪獨新為濕熱為疝或者熱鬱于中寒

五苓散 見驚風症內

龍胆瀉肝湯

胆草

澤瀉

車前子

木通

生地

當歸

山梔

黃芩

甘草

治抽神方用蒴麻根搗汁入無灰酒

調下以查塗症四圍効 朱仁甫傳

總括

滯頤之症口流涎脾家有熱湧而然亦有胃寒而作者出痛涎流濕熱魚

牛黃清心丸

藥鋪中不可用以其藥味不純也

束于外者有矣宜用五苓散加茴香橘核

金鈴子換柳木通之類斯愈矣又或肝經

濕熱而物腫痛者服龍胆瀉肝湯

滯頤

內經曰足太陰之經通于口蓋脾之液為

涎小兒口流涎出而積于頤間者因脾家

受病不能收攝耳此作渴飲冷者屬實熱

宜瀉胃火作渴飲湯者屬虛熱宜補中氣

不如用萬氏牛黃清心丸較穩

六君子湯 見瘧疾症內

瀉黃散 見熱症內

五味異攻散

人參 白朮 茯苓 陳皮

四順清涼飲 即四順飲 見傷寒症內

大安丸 即保和丸 加白朮神曲山楂

半夏茯苓陳皮連翹卜子

若脾經實熱而廉泉不能約制者用牛黃

清心丸脾經虛熱而廉泉不能統攝者用

六君子加水香胃經實熱而虫動津涎流

出者用瀉黃散虛熱用五味異攻散大便

閉結用四順清涼飲食積內熱用大安丸

五淋 附便濁

提括

淋痛雖然分五種要明各類在詳明

白膏曰冷同其症血石均為熱一般

內經曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽

不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲

初年所表下

五淋

四

脉法

少陰脉數女子則陰中生瘡男子則
為氣淋脉細而緊小便澀滯常有餘
澀不盡此為氣淋其鼻準色黃者知
其為小便難而成淋也

小腸有氣則小便澀脹小腸有血則
小便澀小腸有熱則小便痛治當行
滯清熱疎利小便不可用補氣藥氣
得補則愈脹血得補則愈澀熱得補
則愈盛此兩段正巢氏所謂諸淋
皆腎虛所致也

以滴水之器譬之上竅開則下竅不出此
理甚明故東垣使灸百會丹溪使吐以提
其氣之橫格是皆開上竅之法也

原病式曰淋者小便澀痛也熱客膀胱鬱
結不能滲泄故也

巢氏曰諸淋皆腎虛所致腎與膀胱為表
裏俱主水水入小腸下于胞行于陰為小
便也膀胱熱則津液內澀水道不通停積
于胞腎氣熱則澀故令水道不利小便淋

瀝故謂之淋其狀小便出少而數其小腹急痛引臍是也

膏淋者小便時有肥脂似膏而浮于小便之上此腎虛不能制其肥液而下行也

冷淋者必先戰慄而後小便此亦腎虛而下焦受冷之氣入胞與正氣交爭故小便澀而先戰慄也

熱淋者是下焦有熱之氣搏于腎流入于胞其溺黃多而澀間有鮮血也

血淋者熱之極也。心者血之主，外行經絡，內行臟腑，熱盛失其常道，心與小腸為表裏，故下流而入于胞，則為血淋。

石淋者，腎主水，水結則化為石，腎為熱所乘，遇小便則莖中痛，不得流利，痛引小腹，則砂石從小便出，甚至塞痛，令人昏悶，遍身有汗，而後醒，此痛之使然也。並以局方

五淋散

赤茯苓

赤芍

山梔

當歸

甘草

香芎丸

香附

川芎

海金沙

赤茯苓

選而用之，如腎虛者，大味地黃丸，如鹿茸

消石

枳殼

澤瀉

石葦

川牛膝名補腎地黃丸

款柳

木通散

附便濁

木通

消石

黑丑

五苓散

見驚風症內

導赤散

小便白如米泔者內乳哺失節有傷于脾致令清白不分而色白也久則成疳此示

生地

木通

黃苓

甘草

心膈伏熱煎而得之茯苓散主之可也

赤花

補腎地黃丸

即六味地黃丸

又云小便白如米泔者乃脾胃受寒而得

加鹿茸川牛膝

茯苓散

脾屬陰脾遇寒則飲食愈積滯而不化胃

三棱

莪朮

砂仁

赤花

氣愈乖戾而不和致使傳送失常水火不

青皮

陳皮


消石

甘草

濟故色白也

六氣之圖

子午卯酉年
 辰戌丑未年
 寅申巳亥年
 司天主上半年
 在泉主下半年
 地支有十二配
 合則為六氣



子午少陰君火司天
 卯酉陽明燥金司天
 辰戌太陽寒水司天
 丑未太陰濕土司天
 寅申少陽相火司天
 巳亥厥陰風木司天
 陽明燥金在泉
 少陰君火在泉
 太陰濕土在泉
 太陽寒水在泉
 厥陰風木在泉
 少陽相火在泉
 宜清之
 宜溫之
 宜涼劑以和之