

校正
加批

金匱心典

上海廣益書局
印行

卷之

加批
校正
金匱心典
目錄

卷上

臟腑經絡先後病脉證治第一

一

瘧濕喝病脉證治第二

七

百合狐惑陰陽毒病證治第三

十三

瘧病脉證并治第四

十六

中風歷節病脉證并治第五

十九

血痺虛勞病脉證并治第六

二十三

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

二十七

卷中

奔豚氣病脉證治第八

一

胸痺心痛短氣病脉證治第九

二

腹滿寒疝宿食病脉證治第十

四

五臟風寒積聚病脉證治第十一

九

痰飲欬嗽病脉證治第十二

十三

消渴小便不利淋病脉證治第十三

二十

水氣病脉證并治第十四

三

卷下

黃痺病證并治第十五

一

驚悸吐衄下血胸滿瘀血證治第十六

五

嘔吐噦下利病脉證治第十七

八

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

十七

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病脉證治第十九

十八

婦人妊娠病脉證治第二十

二十

婦人產後病脉證治第二十一

二十三

婦人雜病脉證并治第二十二

二十六

加批
校正
金匱心典
卷中

張仲景先生原著

青浦御醫陳蓮舫加批

尤在涇先生集註

古吳後學江忍庵校正

奔豚氣病脉證治第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚欬有火邪此四部病皆從驚發得之

此節言奔豚而兼及吐膿等三症是推究其病因之相同也愚按奔豚與吐膿驚欬火邪四者皆屬氣逆上行之證其從驚發得之者蓋因驚恐發汗而得也此發字方有者落統觀下數節便知

奔豚具如下文吐膿有欬與嘔之別其從驚得之旨未詳驚怖即驚恐蓋病從驚得而驚氣即為病氣也火邪見後驚悸部及傷寒太陽篇云太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圜血名為火邪然未嘗云從驚發也驚悸篇云火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之此亦是因火邪而發驚非因驚而發火邪也即後奔豚證治三條亦不必定從驚恐而得蓋是證有雜病傷寒之異從驚恐得者雜病也從發汗及燒鍼被寒者傷寒也其吐膿火邪二病仲景必別有謂姑闕之以俟知者

或云東方肝木其病發驚駭四部病皆以肝為主奔豚驚怖皆肝自病奔豚因驚而發病驚怖即驚以為病也吐膿者肝移熱於胃胃受熱而生癰膿也

此節言驚恐而得之奔豚證

張從政曰驚者為自不知故也恐者為自知也

周揚俊曰少陰脈循喉嚨因其所繫之經而上衝殊使也

此節言奔豚之輕證並詳治法以調血散逆為主

此節言發汗及燒鍼後之奔豚證並詳治法

周揚俊曰奔豚北方腎邪也燒針令汗縱

不合治法與少陰何與而作奔豚蓋太陽相表裏也針處被寒核

火邪者木中有火因驚而發發則不特自燔且及他藏也亦通

師曰奔豚病從少腹上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

前云驚發此兼言恐者腎傷於恐而奔豚為腎病也狔水畜也腎水藏也腎

氣內動上衝咽喉如豕之突故名奔豚亦有從肝病得者以腎肝同處下焦

而其氣並善上逆也

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

此奔豚氣之發於肝邪者往來寒熱肝藏有邪而氣通於少陽也肝欲散以

薑夏生葛散之肝苦急以甘草緩之芎歸芍藥理其血黃芩李根下其氣桂

苓為奔豚主藥而不用者病不由腎發也

奔豚湯方 甘草

芎藭

當歸

黃芩

芍藥各二兩

半夏

生薑各四兩

生葛五兩

甘李根白皮升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

發汗後燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上至心灸其

核上各一壯與桂枝加桂湯主之

此腎氣乘外寒而動發為奔豚者發汗後燒鍼復汗陽氣重傷於是外寒從

起而赤吾知前此之邪未散後此之邪又入惟桂能伐腎邪也所以用桂加入桂枝湯一以外解風邪一以內泄陰氣也先灸核上者因寒而腫惟灸消之也

此節亦言發汗後欲作奔豚證並詳治法周揚俊曰汗本心之液發汗而臍下病悸者心氣虛而腎氣動也

鍼孔而入通於腎腎氣乘外寒而上衝於心故須灸其核上以杜再入之邪而以桂枝湯外解寒邪加桂內泄腎氣也

桂枝加桂湯方

桂枝五兩

芍藥

生薑各三兩

甘草二兩

大棗十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓服一升

發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

此發汗後心氣不足而後腎氣乘之發為奔豚者臍下先悸此其兆也桂枝能伐腎邪茯苓能泄水氣然欲治其水必益其土故又以甘草大棗補其脾氣甘瀾水者揚之令輕使不益腎邪也

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤

甘草二兩

大棗十二枚

桂枝四兩

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

日三服

甘瀾水法取水二斗置大盆內以杓揚之上有珠子五六千顆相逐取用之也

胸痺心痛短氣病脉證治第九

師曰夫脉當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也

此節言胸痺心痛證之脉象

李廷曰內經云胃脈平者不可見太過不及見則病矣寸脈為陽以候上焦正應胸中部分若陽脈不及而微則為陽虛主病上焦故受病胸痺尺脈太過而弦則為陰盛知在下焦故上逆而為痛也

此節言表無邪而裏有實之證

李廷曰上節云責其極虛此又云實何也經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病為實是也然短氣與少氣有辨少氣者氣少不足于言內經云言而微終日乃復言此奪氣是也短氣者

陽微陽不足也陰弦陰太過也陽主開陰主閉陽虛而陰干之即胸痺而痛痺者閉也夫上焦為陽之位而微脈為虛之甚故曰責其極虛以虛陽而受陰邪之擊故為心痛

平人無寒熱短氣不足以息者實也

平人素無疾之人也無寒熱無新邪也而乃短氣不足以息當是裏氣暴實或痰或食或飲碍其升降之氣而然蓋短氣有從素虛宿疾而來者有從新邪暴遏而得者二端並否其為裏實無疑此審因察病之法也

胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數括樓薤白白酒湯主之

胸中陽也而反痺則陽不用矣陽不用則氣之上下不相順接前後不能貫通而喘息欬唾胸背痛短氣等證見矣更審其脈寸口亦陽也而沉遲則等於微矣關上小緊亦陰弦之意而反數者陽氣失位陰反得而主之易所謂陰疑於陽書所謂牝難之晨也是當以通胸中之陽為主薤白白酒辛以開痺溫以行陽括樓實者以陽痺之處必有痰濁阻其間耳

括樓薤白白酒湯方

括樓實一枚

薤白半斤

白酒七升

氣短不能相續。似喘非喘。若有氣上衝。故似喘不搖肩。似呻吟而無痛是也。

此節言胸痹之脈證及其治法。

趙良曰。凡寒濁之邪滯於上焦。則阻其上。下往來之氣塞其前。後陰陽之位。遂令為喘。息為欬。唾為痛。為短氣也。

程林曰。胸中者心肺之分。故作喘息欬唾也。諸陽受氣於胸。而轉行於背。氣痹不行。則胸背為痛。而氣為短也。

口上節胸痹祇言胸背痛。此節云心痛微背不得臥。氣逆甚矣。

右三味同煮取二升分溫再服

胸痹不得臥。心痛徹背者。栝樓薤白半夏湯主之。

胸痹不得臥。是肺氣上而不下也。心痛徹背。是心氣塞而不和也。其痹為尤甚矣。所以然者。有痰飲以為之援也。故於胸痹藥中。加半夏以逐痰飲。

栝樓薤白半夏湯方 栝樓實一枚 薤白三升 半夏半升 白酒一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痹心中痞氣。氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。人參湯亦主之。

心中痞氣。氣痹而成痞也。脇下逆搶心。氣逆不降。將為中之害也。是宜急通其痞結之氣。否則速復其不振之陽。蓋去邪之實。即以安正。養陽之虛。即以逐陰。是在審其病之久暫。與氣之虛實而決之。

栝樓薤白桂枝湯方 枳實四枚 薤白半升 桂枝二兩 厚朴四兩 栝樓實一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

人參湯方 人參 甘草 乾薑 白朮各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

故用前方加半夏以
降其逆氣

此節言胸痹治法
有二當分別虛實及

先後施之

魏荔彤曰胸痹自是

陽微陰盛矣心中痞

氣氣結在胸正胸痹

之病狀也再連膈下

之氣俱逆而搶心則

痰飲水氣俱乘陰寒

之邪動而上逆胸胃

之陽氣全難支拒矣

故用枳實雞白桂枝

湯行陽開鬱溫中降

氣猶必先後煮治以

融和其氣味俾緩緩

蕩除其結聚之邪也

再或虛寒已甚無敢

恣為開破者故人參

湯亦主之以溫補其

胸痹胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳生薑湯亦主之

此亦氣閉氣逆之證視前條為稍緩矣二方皆下氣散結之劑而有甘淡苦

辛之異亦在酌其強弱而用之

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓_{三斤}

杏仁_{五十}

甘草_{一斤}

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服

橘枳生薑湯方

橘皮_{一斤}

枳實_{三斤}

生薑_{半斤}

右三味以水五升煮取二升分溫再服

胸痹緩急者薏苡附子散主之

陽氣者精則養神柔則養筋陽痹不用則筋失養而或緩或急所謂大筋輓

短小筋弛長者是也故以薏苡仁舒筋脉附子通陽痹

薏苡附子散方

薏苡仁_{十五}

大附子_{十枚}

右二味杵為散服方寸匕日三服

心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

諸逆該痰飲客氣而言心懸痛謂如懸物動搖而痛逆氣使然也桂枝枳實

生薑辛以散逆苦以泄痞溫以祛寒也

陽使正氣旺而邪氣自消也

此節言胸痹輕證之二治法

魏蕩形曰此證乃邪實而正不甚虛陽微而陰不甚盛蓋痹則氣必塞塞則必短氣前言之矣今開降其氣而諸證自除矣此節言胸痹痛有緩急者之治法

李廷曰緩急者或緩而痛暫止或急而痛復作也薏苡仁入肺利氣附子溫中行陽為散服則其效更速矣

此節承前心中痞氣而言惟前云氣逆搶心而不痛此云心

桂枝生薑枳實湯方 桂枝 生薑各三兩 枳實五兩

右三味以水六升煮取三升分溫三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

心背徹痛陰寒之氣遍滿陽位故前後牽引作痛沈氏云邪感心包氣應外俞則心痛徹背邪襲背俞氣從內走則背痛徹心俞臟相通內外之氣相引則心痛徹背背痛徹心即經所謂寒氣客於背俞之脉其俞注於心故相引而痛是也烏附椒薑同力協濟以振陽氣而逐陰邪取赤石脂者所以安心氣也

烏頭赤石脂丸方 烏頭一分炮 蜀椒 乾薑各一兩 附子半兩 赤石脂一兩

右五味末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服不知稍加服

附方

九痛丸治九種心疼 附子三兩炮 生狼牙 巴豆去皮熬如膏 乾薑

吳茱萸 人參各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸兼治卒中惡腹脹口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車

懸痛故又另立治法

此節承前心痛徹背而言復云背痛徹心是痛無已時而陰寒益盛也故別用大辛大熱之劑以治之李杲曰心痛在內而微背則內而達於外矣背痛在外而徹心則外而入於內矣故既有附子之溫而又

有烏頭之迅佐乾薑行陽大散其寒蜀椒下氣大開其鬱恐過於大散大開故復佐赤石脂入心以固澀而收陽氣也

此節言虛寒腹滿

之脈證雖無主治之方而云當以溫藥服之則後人不難按證

血疾等皆主之忌口如常法

按九痛者一蟲二注三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛是也而並以一藥治之者豈痛雖有九其因於積冷結氣所致者多耶

腹滿寒疝宿食病脉證治第十

跌陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

跌陽胃脉也微弦陰象也以陰加陽脾胃受之則為腹滿設不滿則陰邪必旁攻胠脇而下閉穀道為便難為兩胠疼痛然其寒不從外入而從下上則病自内生所謂腎虛則寒動於中也故不當散而當溫

病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之古黃未下者下之黃自去

腹滿按之不痛者無形之氣散而不收其滿為虛按之而痛者有形之邪結而不行其滿為實實者可下虛者不可下也古黃者熱之徵下之實去則黃亦去

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥

腹滿不減者實也時減復如故者腹中寒氣得陽而暫開得陰而復合也此

立方矣。

此節言腹滿以痛不痛辨虛實。

趙良曰腹滿亦有屬實實則非虛寒也明矣。豈概以溫藥治之乎。故有試之之法。在痛與不痛之分。虛實較然矣。蓋胃必熱熱蒸必古黃下其實熱古黃不自已乎。有此一辨并虛者愈審已。此節申言虛寒腹滿之證及當用溫藥之意。

按金鑑云當與溫藥之下當有宜厚朴生薑甘草半夏人參湯主之十四字。閱傷寒論太陰篇自知。魏荔彤曰腹滿或服

亦寒從内生。故曰當與溫藥。

病者痿黃燥而不渴。胸中寒實而利不止者死。

痿黃脾虛而色敗也。氣不至故燥。中無陽故不渴。氣竭陽衰。中土已敗而復寒結於上。藏脫於下。何恃而可以通之止之乎。故死。

寸口脉弦者。即脇下拘急而痛。其人嗇嗇惡寒也。

寸口脉弦亦陰邪加陽之象。故脇下拘急而痛。而寒從外得。與跌陽脉弦之兩胠疼痛有別。故彼兼便難。而此有惡寒也。

夫中寒家喜欠。其人清涕出。發熱色和者善嚏。

陽欲上而陰引之。則欠。陰欲入而陽拒之。則嚏。中寒者陽氣被抑。故喜欠。清涕出。發熱色和。則邪不能留。故善嚏。

中寒其人下利。以裏虛也。欲嚏不能。此人肚中寒。

中寒而下利者。裏氣素虛。無為捍蔽。邪得直侵中藏也。欲嚏不能者。正為邪逼。既不能却。又不甘受。於是陽欲動而復止。邪欲去而仍留也。

夫瘦人繞臍痛。必有風冷。穀氣不行。而反下之。其氣必衝。不衝者心下則痞。瘦人臟虛氣弱。風冷易入。入則穀氣留滯不行。繞臍疼痛。有似裏實。而實為

下藥或服補藥有時減退未幾旋腹滿如故則不可作實與熱治也

此節言虛寒之敗證程林曰痿黃者脾胃

病也見燥而渴者為熱不渴者為寒病人

既痿黃又兼下利不禁則脾氣衰絕故死

此節申言首節兩

肢疼痛屬寒之義程林曰弦肝脈陰也

肝脈膈脇裏寒主收引故脇下拘急而痛

以寒勝於內而陽氣不行於外故外亦當

當而惡寒也

此節言中寒之病

象

此節承上文善噦

虛冷是宜溫藥以助脾之行者也乃反下之穀出而風冷不與俱出正乃益虛邪乃無制勢必犯上無等否亦竊據中原也

病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

腹滿裏有實也發熱脉浮數表有邪也而飲食如故則當乘其胃氣未病而攻之枳朴大黃所以攻裏桂枝生薑所以攻表甘草大棗則以其內外並攻故以之安臟氣抑以和藥氣也

厚朴七物湯方 厚朴半斤 甘草 大黃各三兩 大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩

生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

下焦濁陰之氣不特肆於陰部而且逆於陽位中土虛而隄防撤矣故以附子輔陽驅陰半夏降逆止嘔而尤賴粳米甘棗培令土厚而使斂陰氣也

附子粳米湯方 附子一枚 半夏 粳米一升 甘草一兩 大棗十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

而言申明欲嚏不能之為中寒證

沈明宗曰此脾經受寒現證也寒中太陰陰寒濕盛陽虛不固其人下利但通多不足故為裏虛蓋陽和則嚏欲嚏不能乃陰寒凝滯於裏所以肚中病也

此節言虛寒作痛者之不可妄下

此節言腹滿而兼發熱故用表裏並治之法

程林曰腹滿者內有實熱也十日脈尚浮而數浮為在表表熱邪未已故發熱數為在裏裏熱能消穀故飲食如故此方蕩腹

痛而閉者厚朴三物湯主之

痛而閉六府之氣不行矣厚朴三物湯與小承氣同但承氣意在蕩實故君

大黃三物意在行氣故君厚朴

厚朴三物湯方

厚朴_{兩八}

大黃_{兩四}

枳實_{枚五}

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利

為度

按之心下滿痛者此為實也當下之宜大柴胡湯

按之而滿痛者為有形之實邪實則可下而心下滿痛則結處尚高與腹中

滿痛不同故不宜大承氣而宜大柴胡承氣獨主裏實柴胡兼通陽痺也

大柴胡湯方

柴胡_{斤半}

黃芩

芍藥_{各三兩}

半夏_{升半}

枳實_{枚四}

大黃_{兩二}

大棗_{枚十二}

生薑_{兩五}

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

減不足言謂雖減而不足云減所以形其滿之至也故宜大下已上三方雖

緩急不同而攻泄則一所謂中滿者瀉之於內也

滿而除表熱。夫表裏俱實。當先解表。乃可攻裏。今表邪微而裏邪甚。故用承氣桂枝。

二湯相合。以和表裏。如傷寒之用大柴胡湯。此其義也。

此節言寒氣腹痛之治法。

此節言腹痛氣閉者之治法。

此節承前痛者為實。可下之一語。詳其治法。

按金鑑云。按之心下滿痛者之下。當有有潮熱三字。方宜用此湯方。

此節言實滿之當下。

此節言腹中陰寒。

大承氣湯方

見瘕病

心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中滿。上衝皮起出。見有頭足。上下痛而不可觸近者。大建中湯主之。

心腹寒痛。嘔不能食者。陰寒氣甚。而中土無權也。上衝皮起出。見有頭足。上下痛而不可觸近者。陰凝成象。腹中蟲物乘之而動也。是宜大建中。藏之陽以勝上逆之陰。故以蜀椒乾薑溫胃下蟲。人參飴糖安中益氣也。

大建中湯方

蜀椒二合。炒去汗。

乾薑四兩。

人參一兩。

右三味以水四升。煮取二升。去滓。內膠飴一升。微火煎取二升。分溫再服。如一炊頃。可飲粥二升。後更服。當一日食糜粥溫覆之。

脇下偏痛發熱。其脉緊弦。此寒也。以溫藥下之。宜大黃附子湯。

脇下偏痛。而脉緊弦。陰寒成聚。偏着一處。雖有發熱。亦是陽氣被鬱所致。是以非溫不能已其寒。非下不能去其結。故曰宜以溫藥下之。程氏曰。大黃苦寒。走而不守。得附子細辛之大熱。則寒性散而走泄之性存是也。

大黃附子湯方

大黃三兩。

附子一枚。

細辛二兩。

右三味以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人煮取二升半。分溫三服。服後

堅凝成積痛連心胸
上逆作嘔是寒之甚
者也故宜用大建中

溫之

此節言下寒實之

治法

按金鑑云膝下偏痛

之偏字當是滿字

此節言寒氣厥逆

之治法

此節言寒疝之重

者當治以辛熱之峻

劑按金鑑云此條脈

重出下條有證無脈

其脈沉緊者五字當

在下條裏急之下

如人行四五里進一服

寒氣厥逆赤丸主之

寒氣厥逆下焦陰寒之氣厥而上逆也茯苓半夏降其逆烏頭細辛散其寒

真朱體重色內之以破陰去逆也

赤丸方 烏頭二兩 茯苓四兩 細辛一兩 半夏四兩

右四味末之內真朱為色煉蜜為丸如麻子大先食飲酒下三丸日再夜一

服不知稍增之以知為度

腹滿脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝

繞臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

弦緊脈皆陰也而弦之陰從內生緊之陰從外得弦則衛氣不行而惡寒者

陰出而痺其外之陽也緊則不欲食者陰入而痺其胃之陽也衛陽與胃陽

並衰而外寒與內寒交盛由是陰反無畏而上衝陽反不治而下伏所謂邪

正相搏即為寒疝者也繞臍痛發則白津出手足厥冷其脈沉緊皆寒疝之

的證白津汗之淡而不鹹者為虛汗也一作自汗亦通大烏頭煎大辛大熱

為復陽散陰之峻劑故云不可一日更服

大烏頭煎 烏頭大者五枚熬去皮不必咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合弱人五合不差明日更服不可一日更服

寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之

此治寒多而血虛者之法血虛則脉不榮寒多則脉絀急故腹脇痛而裏急也當歸生薑溫血散寒羊肉補虛益血也

當歸生薑羊肉湯方 當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多加生薑成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之
寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

脾邪散而痛自止方後云痛而多嘔乃肝氣上逆臨胃故加橘木補之

此節言寒疝之輕證並詳治法
沈明宗曰按此連衝脈為疝治當溫補也肝木受邪乘脾則腹中痛本經之氣不舒故脇亦痛連及衝脈則裏急矣所以當歸補養衝任而散風寒羊肉溫補榮衛之氣

腹中痛逆冷陽絕於裏也手足不仁或身疼痛陽痺於外也此為寒邪兼傷表裏故當表裏並治烏頭溫裏桂枝解外也徐氏曰灸刺諸藥不能治者是或攻其內或攻其外邪氣牽制不服也如醉狀則榮衛得溫而氣勝故曰知得吐則陰邪不為陽所容而上出故為中病