

醫統正脈全書

傷寒論十卷目錄

卷第一

辨脉法

平脉法

卷第二

傷寒例

辨痊濕喝脉證

辨太陽病脉證并治法上

卷第三

辨太陽病脉證并治法中

卷第四

辨太陽病脉證并治法下

卷第五

辨陽明病脉證并治法

辨少陽病脉證并治法

卷第六

辨太陰病脉證并治法

辨少陰病脉證并治法

辨厥陰病脉證并治法

卷第七

辨霍亂病脉證并治法

辨陰陽易差後病脉證并治法

辨不可發汗病脉證并治法

辨可發汗病脉證并治法

卷第八

辨發汗後病脉證并治法

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治法

辨可下病脉證并治法

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治法

傷寒論藥方目錄

卷一

無方

卷二

方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷三

方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

傷寒論
目錄
二
大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁圓

梔子蘗皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

卷六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷七

方五道

理中圓

理中湯附

燒裨散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷八

無方

卷九

無方

卷十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚樸杏子湯

桂枝加附子湯

尤附湯方附

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加桂湯

已上六方證
在第三卷

柴胡桂枝湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證
在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯已上五方證
在第六卷

四逆加人參湯

四逆加豬膽汁湯方已上五方證
在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如呔咀者

卽今之剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也

云銖者六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三

兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大者

只合三分之一足矣

注解傷寒論卷四

江陰朱氏校刊本

漢張仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨太陽病脉證并治法下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮

關脉沉名曰結胃也何謂藏結答曰如結胃狀飲食如

故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白

胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入

裏與陽相結者為結胃以陽受氣於胃中故爾與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而塞故

痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉知邪結在陽

也寸脉浮關脉小細沉緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者邪氣結胃中亦寒故云難治藏結無

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

結藏

於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒邪氣以病發於陽而反下之熱入因作結表裏皆寒故不可攻

胃病發於陰而反下之因作痞所以成結胃者以下之

太早故也

發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胃中為結胃無熱惡寒者發於

陰也而反下之則表中陰邪入裏結於心下為痞

結胃者項亦強如柔痙狀下

之則和宜大陷胃丸方

結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下緊實但能仰而不

能俛是項強亦如柔瘥之狀也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半升熬味苦寒

芒硝

半升味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒硝之苦鹹所以熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達之蜜取其潤利皆以下泄滿實也

右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢七白蜜貳合水貳升煮取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下爲効