

LINEAR ALGEBRA

线性代数

学习辅导

(经管类)

主 编 卢俊峰

副主编 李剑秋 宋秀迎



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

线性代数学习辅导

(经管类)

主 编 卢俊峰

副主编 李剑秋 宋秀迎



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

线性代数学习辅导 / 卢俊峰主编. — 杭州: 浙江
工商大学出版社, 2012. 11(2013. 7 重印)

ISBN 978-7-81140-635-1

I. ①线… II. ①卢… III. ①线性代数—高等学校—
教学参考资料 IV. ①O151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 243408 号

线性代数学习辅导

卢俊峰 主编

责任编辑 许 静

封面设计 刘 韵

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571—88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 13

字 数 270 千

版 印 次 2012 年 11 月第 1 版 2013 年 7 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-635-1

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571—88804227

前 言

本书是浙江省“十一五”重点教材《线性代数(经管类)》的配套辅导书,可作为经管类专业本科学生的学习参考书、教师的教学参考书,也可作为本科学生考研的复习参考书。

全书按原教材的章节编写,每章内容分为内容提要、例题解析和自测题三个部分。内容提要侧重介绍各章的主要概念、重要定理与结论及应掌握的基本计算方法;例题解析对各章的典型题型作了归纳和总结,通过典型例题的分析,说明常用的解题思路与方法,对于一些例题还给出一题多解,引导读者深入地学习和体会各章的基本内容;自测题是基本题与综合题的搭配,难易度适中。书后附有五套模拟试卷及详细解答,供学生练习,以巩固所学知识,提高独立解题能力,并检测自己对所学知识掌握的程度。

本书由浙江工商大学杭州商学院三位老师合作完成。第一章、第三章由李剑秋编写,第二章、模拟试卷及解答由宋秀迎编写,第四章、第五章由卢俊峰编写,全书最后由卢俊峰总纂定稿。在编写的过程中,得到金义明和丁嘉华的悉心指导,孙景楠和何丹帮助校对,在此我们表示衷心地感谢。

由于编者水平有限,错误在所难免,敬请同行、读者指正。

编 者

2012年7月于杭州

目 录

第一章 行列式	1
内容提要	1
例题解析	5
自测题	28
第二章 矩阵	34
内容提要	34
例题解析	36
自测题	59
第三章 线性方程组	63
内容提要	63
例题解析	68
自测题	95
第四章 矩阵的特征值和特征向量	99
内容提要	99
例题解析	101
自测题	129
第五章 实二次型	133
内容提要	133
例题解析	135
自测题	159
模拟试卷及解答	162

第一章 行列式

内容提要

一、行列式的递推定义

1. 二阶行列式和三阶行列式

二阶行列式的定义：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} .$$

三阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} .$$

2. n 阶行列式

由 n^2 数组成的 n 行 n 列的记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式. D 表示的算式为

当 $n = 1$ 时, $D = |a_{11}| = a_{11}$,

当 $n \geq 2$ 时, $D = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{k=1}^n a_{1k}A_{1k}$,

其中, $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$) , A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式, M_{ij} 为 n 阶行列式中划去元素 a_{ij} 所在的行, 所在的列剩下的元素按原来的顺序组成的 $n-1$ 阶行列式, 称为元素 a_{ij} 的余子式.

n 阶行列式的计算公式中包含有 $n!$ 项, 其中 $\frac{n!}{2}$ 项前面带正号, $\frac{n!}{2}$ 项前面带负号, 而每一项是由行列式中位于不同行不同列的 n 个数相乘而得.

二、行列式按任意一行(列)的展开定理

行列式等于它的任一行(列)的各个元素与其对应的代数余子式的乘积之和, 即:

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in};$$

$$D = a_{1i}A_{1i} + a_{2i}A_{2i} + \cdots + a_{ni}A_{ni}, \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

三、行列式的性质

1. 行列互换, 行列式的值不变.
2. 交换行列式的某两行(列)的位置, 行列式的值变号.
3. 若行列式中某一行(列)每个元素都有公因子 k , 则 k 可提到行列式符号外.
4. 如果行列式中有两行(列)元素对应成比例, 则行列式的值为零.

推论: 若行列式中有两行(列)完全相同, 则行列式的值为零.

推论: 若行列式中某一行(列)中的所有元素全为零, 则行列式的值为零.

5. 如果行列式的某一行(列)的每个元素都是两个数之和, 则此行列式可以写成两个行列式之和.

6. 行列式的某一行(列)的各元素乘以同一个数 k 然后加到另一行(列)上, 行列式的值不变.

7. 行列式任意一行(列)的各元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式的乘积之和为零, 即:

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0, \quad i \neq j;$$

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad i \neq j.$$

为了使行列式计算过程中表达式简明, 引进下列一些记号:

(1) $r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$) 表示将行列式第 i 行(列)与第 j 行(列)互换;

(2) $\frac{1}{k}r_i$ ($\frac{1}{k}c_i$) 表示将行列式第 i 行(列)的所有元素提取公因子 k ;

(3) $r_i + kr_j$ ($c_i + kc_j$) 表示将行列式第 j 行(列)所有元素的 k 倍加到第 i 行(列)对应元素上. (第 j 行(列)元素不变)

四、几个特殊的行列式

1. 上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

2. 下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

3. 对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n.$$

4. 反对角行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1a_2\cdots a_n.$$

5. 反上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & a_1 \\ a_{21} & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1a_2\cdots a_n.$$

6. 反下三角行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1a_2\cdots a_n.$$

后三个公式下面我们可以得到证明.

7. 范德蒙(Vandermonde)行列式

$$8. \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mk} & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}.$$

五、克莱姆(Cramer)法则

如果 n 个未知数 n 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

其中 $D_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素换成线性方程组右端的常数项 $b_1, \cdots, b_n$ 所得到的 n 阶行列式, 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nm} \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

克莱姆法则的推论(齐次线性方程组有非零解的条件):

含有 n 个未知数, n 个方程的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases},$$

有非零解的充分必要条件是系数行列式 $D = 0$.

例题解析

题型 1 行列式的计算

本章的中心内容是行列式计算,而对于一般行列式的计算,我们介绍几种常用的方法.下面我们通过例题介绍计算的基本思路.

1. 化为三角形行列式计算.

【例 1】 计算四阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 将其化为三角形行列式

为使计算过程尽可能不出现分数,我们先把 a_{11} 变为 1 或 -1 ,本例中可交换第一行与第三行的位置,得

$$\text{原式} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 + (-3)r_1 \\ r_3 + (-2)r_1 \\ r_4 + (-2)r_1 \end{matrix}} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{r_4 + (-2)r_2} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 10 \end{vmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{5}r_3} 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 10 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{r_4 + (-7)r_3} 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 50. \end{aligned}$$

注意: 把 a_{11} 变为 1 或 -1 , 一般可通过下面两种方法:

(1) 交换行列, 即把行列式中元素为 1 或 -1 换到第一行第一列位置上, 尤其是当 $a_{11} = 0$ 时, 只有通过这种办法使 $a_{11} \neq 0$;

(2) 如果行列式中所有元素都不是 1 或 -1 , 我们先将交换行列使 $a_{11} \neq 0$, 然后将第一行(列)乘以 $\frac{1}{a_{11}}$, 即从第一行(列)提取公因子 a_{11} .

【例 2】 计算三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-a-c & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}.$$

分析 该行列式各列元素的和相等.

解 把其他各行都加到第 1 行得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-a-c & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-a-c & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\ &= \frac{r_2 + (-2b)r_1}{r_3 + (-2c)r_1} (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -b-a-c & 0 \\ 0 & 0 & -c-a-b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c)^3. \end{aligned}$$

【例 3】 证明反对角行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n .$$

分析 本题可转化为对角行列式.

证 先将行列式的第 n 列依次与其前面的 $n-1$ 列逐列对换, 得

$$D_n = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_n & \cdots & 0 \end{vmatrix} ,$$

再将上式行列式的第 n 列依次与其前面的 $n-2$ 列逐列对换, 如此下去最后得

$$D_n = (-1)^{(n-1)+(n-2)+\cdots+1} \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n .$$

同理可证反上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & a_1 \\ a_{21} & \cdots & a_2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n ,$$

反下三角行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n .$$

【例 4】 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & z \end{vmatrix} .$$

分析 行列式的最后一行有公因子 z , 主对角线上方的元素都为 y .

解 行列式的最后一行提取公因子 z , 再用最后行乘以 $(-y)$ 分别加到其他各行, 得

$$\text{原式} = z \begin{vmatrix} x-y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ z-y & x-y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ z-y & z-y & x-y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z-y & z-y & z-y & \cdots & x-y & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

上式右端的行列式按最后一列展开

$$\begin{aligned} \text{原式} &= z(-1)^{n+n} \begin{vmatrix} x-y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ z-y & x-y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ z-y & z-y & x-y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z-y & z-y & z-y & \cdots & x-y & 0 \\ z-y & z-y & z-y & \cdots & z-y & x-y \end{vmatrix} \\ &= z(x-y)^{n-1}. \end{aligned}$$

【例 5】 计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2+1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3+1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n+1 \end{vmatrix} \quad (a_i \neq 0, i=1,2,\cdots,n).$

分析 行列式除了主对角元素外, 其他元素均为 1.

解 用第 1 行乘以 (-1) 加到其他各行, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix},$$

上式右端的行列式为三线行列式, 则作变换可化为三角行列式

$$D_n = \frac{c_1 + \frac{a_1}{a_2}c_2, \dots, c_1 + \frac{a_1}{a_n}c_n}{\left| \begin{array}{ccccc} a_1 + 1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{array} \right|}$$

$$= a_2 a_3 \cdots a_n \left(a_1 + 1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_1}{a_i} \right) = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right).$$

上述方法对于计算三线行列式是非常有效的.

【例 6】 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & \cdots & 1 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

分析 该行列式各行(列)元素的和相等.

解 如果把其他各列都加到第 1 列,则可以提出第 1 列的公因子使第 1 列的元素都变为 1.

$$\text{原式} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 4 & \cdots & 1 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix},$$

上式右端行列式的相邻两行数间大都相差 1,则先把第 $n-1$ 行乘以 (-1) 加到第 n 行,再把第 $n-2$ 行乘以 (-1) 加到第 $n-1$ 行,……,最后把第 1 行乘以 (-1) 加到第 2 行,得

$$\text{原式} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix},$$

上式右端行列式按第一列展开,得

$$\text{原式} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1},$$

上式右端行列式各列都加到第一列,有

$$\text{原式} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ -1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1},$$

上式右端行列式第 $n-1$ 行乘以 (-1) 加到其他各行,得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1} \quad (\text{反下三角行列式}) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} (-1)(-n)^{n-2} (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

2. 按行列式展开定理,降阶计算行列式.

【例 7】 计算四阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 利用行列式按行(列)展开定理进行计算行列式. 在展开前,尽可能将某一行(列)元素化为只剩下一个非零元素,然后再按这一行(列)展开.

本题第 2 列已有 2 个元素为零,故按第 2 列展开:

$$\text{原式} \xrightarrow{r_4 + (-2)r_2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ -4 & 0 & -5 & 2 \end{vmatrix}$$

上式右端的行列式按第 2 列展开

$$\text{原式} = 1 \times (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -4 & -5 & 2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \underline{r_1 + (-2)r_2} \\ \underline{r_3 + (4)r_2} \end{array} \begin{vmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 10 \end{vmatrix}$$

上式右端的行列式按第 2 列展开

$$\text{原式} = 1 \times (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -5 & 0 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} = 50.$$

【例 8】 计算四阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

分析 注意到该行列式各行(列)元素的和相等,所以如果把其他各列都加到第 1 列,则可以提出第 1 列的公因子使第 1 列的元素都变为 1.

$$\text{解 原式} \underline{\underline{c_1 + c_2 + c_3 + c_4}} \begin{vmatrix} 14 & 3 & 4 & 5 \\ 14 & 4 & 5 & 2 \\ 14 & 5 & 2 & 3 \\ 14 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

对上式右端的行列式,先进行 $r_3 - r_2$, 再 $r_2 - r_1$, 最后 $r_1 - r_4$ 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 14 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 14 \times (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} \\ &\quad \underline{\underline{r_2 + (-1)r_1}} \quad \underline{\underline{r_3 + (-1)r_1}} - 14 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & 0 \end{vmatrix} = -14 \times 1 \times (-1)^2 \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 224. \end{aligned}$$

【例 9】 设 x_1, x_2, x_3 是三次多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 的 3 个根, 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & 1 \\ -2x_3 & -2x_1 & -2x_2 & 4 \\ 3x_2 & 3x_3 & 3x_1 & 3 \\ a & b & c & d \end{vmatrix}.$$

分析 由已知 x_1, x_2, x_3 是三次多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 的 3 个根, 所以 $x_1 + x_2 + x_3$ 是 x^2 项系数的相反数, 即

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

解 原式 $= (-2) \times 3 \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & 1 \\ x_3 & x_1 & x_2 & -2 \\ x_2 & x_3 & x_1 & 1 \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$

$$\underline{\underline{c_1 + c_2 + c_3}} - 6 \begin{vmatrix} 0 & x_2 & x_3 & 1 \\ 0 & x_1 & x_2 & -2 \\ 0 & x_3 & x_1 & 1 \\ a+b+c & b & c & d \end{vmatrix}$$

对上式右端的行列式, 按第一列展开

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -6(a+b+c)(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} x_2 & x_3 & 1 \\ x_1 & x_2 & -2 \\ x_3 & x_1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \underline{\underline{r_1 + r_2 + r_3}} 6(a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & -2 \\ x_3 & x_1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

【例 10】 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

解 每行元素的和都相等, 把第二、三、四列都加到第一列,

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} x & -1 & 1 & x-1 \\ x & -1 & x+1 & -1 \\ x & x-1 & 1 & -1 \\ x & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$