

千金翼方卷之二十四

瘡癰下

癰疽發背第一方九首

凡發背及癰疽腫已潰未潰方

取香豉三升少與水和熟擣成彊泥可腫作餅子厚二分
已有孔勿覆孔可腫上布豉餅以艾列其上灸之使溫溫
熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當便減決得安
或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差
癰腫發背腫并諸毒腫方

榆白皮

栝樓

各伍兩

婦人月布洗取汁

胡燕窠土

獾鼠土

各拾兩

右五味擣和作泥封之一日漸消五日全差若壞封四畔瘡
諸癰腫無聊賴發背及癰節已疼痛方

蒸糜穀更遞熨之即愈

一云薑薇穀更炙熨之

癰疽發腹背陰隱處通身有數十癰方

取牛糞乾者燒末以雞子白和塗乾則易差止

又方以牡蠣粉大醋和塗即愈

占期散主消腫癰疽消膿方

木占斯

人參

乾薑

一云乾地黃

桂心

細辛

厚朴

敗醬

防風

桔梗

桔樓

甘草

灸各壹兩

右一十一味擣篩為散酒服方寸匕藥入咽覺藥流入瘡中若癰疽灸之不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服藥日七夜二以多為善若病在下當膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫人不知用此

藥發背無有不治者惟服此耳若始覺背上有不好而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但日夜服之勿住也服之腫自消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜速服之一方無桂心

癰疽潰漏男發背女發乳及五痔方

蝟皮

燒

蜂房

燒各壹斤

蜀椒

汗

乾薑

各壹兩

厚朴

壹兩半

附子

炮去皮

桂心

當歸

續斷

藁本

地榆皮

各五分

右拾壹味擣篩為散酒服方寸匕日三加斑猫七枚益良治骨疽百方治不差方

可於瘡上以次灸之三日三夜無不愈

又方

久瘡不愈差而復發骨從孔出者名為骨疽取一死烏雌

雞淨去肉取骨熬令成灰取三家牛拘木刮取屑三家炊單各一兩皆別熬成灰合導瘡中碎骨當出數十片愈

鼠瘻第二

論一首方二十一首灸法三首

論曰一切癰疽皆是瘡瘻根本所患癰之後膿汁不止得冷即是鼠瘻是以漏方次之大須急救之

治鼠漏方

馬齒草

五升 槲白皮

一斤水煮五升取一升澄清

麝香

半兩乾之研末

杏仁

半升剉令黑麝如粉

右四味以瓷器貯之合和以三四重帛密繫口病已成瘡者以泔清煎減半洗作貼子塗藥貼著瘡上日三易之若未作瘡如瘰癧子者以艾一升熏黃如棗大乾漆如棗大三味末之和艾作炷灸之三七壯止

治諸漏方

取新生兒屎一百日以來皆收置密器中五六日取塗瘡孔中

又方

取鯉魚腸切作五段火上煖之先洗瘡拭乾以腸貼之冷即易之從旦至夜乾止覺痒開看蟲出即差

又方

取雞子三顆米下蒸半日出取黃熬令黑先拭瘡汁令乾以藥內瘡孔中不過三度

又方

以臘月豬脂以紙經沾取內瘡孔中日五度夜二度

風漏及鼠漏方

赤小豆

白歛

牡蠣熬

黃耆

右四味等分擣篩為散酒服方寸匕日二

蟻漏方

取陵鯉甲二七枚燒為末猪膏和傅之

又方取半夏一枚屑之以鴨膏和傳之

漏方

鍛鐵屑

狗頰連齒骨

虎矢

鹿角甲半取毛

各貳兩千金云鹿皮合毛

右四味擣篩為散以猪膏和內瘡孔中須更易之日五六

治鼠漏方

死鼠

壹枚中形者

亂髮

壹雞子大

右二味以臘月猪膏纔得沒之微火煎之鼠髮消盡膏成以塗瘡上又以酒服半分許鼠從瘡中出

寒熱瘰癧方

連翹

黃連

苦參

括樓

土瓜根

芍藥

恒山

各壹兩

龍膽

狸頭骨

壹枚炙

右九味擣篩為散酒服五分七日三

治身體瘰癧及常有細瘡又口中有瘡薑微丸方

薔薇根

黃蘗

黃耆

黃芩

芍藥

苦參

白歛

栝樓

防風

枳實

龍膽

鼠李根皮

各壹兩

石龍芮

貳兩

右壹拾叁味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子飲服十九日

三斤金無黃蘗

頸漏

擣生商陸根作餅子如大錢厚三分貼漏上以艾灸之餅乾熱則易之可灸三四升艾便差

一法

葶藶子

貳合

豉

壹升

右二味合擣大爛熟作餅子如上以一餅子當孔上貼以艾炷如小指大灸上三壯一易三餅九炷日三隔三日一灸

一法

凡是一名瘰癧有結核欲作癰節者以獨顆蒜去兩頭灸之如前法日灸三度差

一法

七月七日日未出時採麻花五月五日取艾等分合作炷灸漏上百壯

治瘰方

馬齒草

乾陰

臘月淳麻燭

燼

右貳味等分細篩以臘月猪脂和之先以煖泔清洗瘡拭乾塗之

又方

槲木皮一尺闊六寸去黑皮細切以水二斗煮取五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器中貯之若吐吐著器中看之

又方

五月五日午時取馬齒草一石以水一石煮取三斗去滓
內白糖十挺煎取九升分三服以銅器貯之若吐吐著器
中看之

人參散

主寒熱瘰癧在頸脉如如杏李方

人參

乾薑

白芷

甘草

各壹兩

右四味擣篩為散先食飲服方寸匕日三少小半匕以意
增加

又方

狸骨

伍分

烏頭

柒分炮
去皮

黃蘗

壹兩

右參味擣篩為散先食酒服一錢匕日三

又方

連翹

黃連

芍藥

苦參

土瓜根

龍膽

當歸各半兩

右七味擣篩為散先食以溫酒服錢五匕日三稍加至方

寸匕

欒金無當歸有枯樓恒山為八味

又方取桃枝上不落子擣末以大醋和傳之

鼠乳方

常思根拭去土勿洗以附本繫之一日一夜便斷消

瘰癧第三方八首

瘰癧秘方世所不傳神良無比

升麻

乾地黄

枳實炙略

大黃炙兩

前胡分三

犀角

壹兩半

麝香

射干

甘草

炙兩半

右玖味以水玖升煮三升分三服以差為度不限劑數

猪蹄湯主瘰癧諸疽十指頭爛赤痛癢已潰方

猪蹄

壹具治如食法

大黃

白芷

芎藭

黃芩

黃連

細辛

當歸

藁本

藜蘆炙一分
本無

莽草

甘草各壹兩

右壹拾貳味以水三斗煮猪蹄取一斗煮藥取五升洗漬瘡
搗湯主瘰癧浸淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤炊方

黃芩

黃連

大黃

當歸

芒消

甘草各壹兩

右陸味以水六升煮取三升去滓還鑊中內芒消一沸貼
布帛中以搗腫上數百遍

瘰癧浸淫多日漸大方

胡粉

壹分
熬

黃連

藺茹

甘草各壹兩

右肆味擣篩為散以粉上日三

瘰癧著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發方

黃耆壹兩
半

款冬花

升麻各壹兩

赤小豆

附子炮去皮

苦參各壹分

右陸味擣篩為散酒服半錢匕稍增至壹錢匕旦三服

又方

取虎矢白者以馬矢和之暴乾燒灰以粉之

又方

龍骨

胡粉燒

滑石各半兩

青木香兩

右肆味擣篩為散以米粉一升和之稍稍粉之日四五

瘰癧方

竈室塵

竈突中墨

竈釜下土各壹升

右叁味以水九升煮三沸取汁以洗瘡日三四度

惡核第四論一首方

論曰凡惡核似射工初得無定處多惻惻然痛時有不痛者不痛便不憂不憂則救遲救遲則殺人是以宜早防之此尤

忌牛肉雞猪魚驢馬等肉初如粟或如麻子在肉裏而堅似
醅長甚速初得多惡寒須臾即短氣取茱萸五合作末水一
升和之絞取汁頓服之以滓傳之須臾更服此汁令毒氣散
不入腹入腹則致禍切慎之

江南毒氣惡核射工暴腫生瘡五香散方

甲香 薰陸香 青木香 羚羊角 丁香

犀角 鼈甲炙 升麻 烏鶯 黃芩

黃蘗 黃連 甘草各肆分 吳茱萸分

右壹拾肆味擣篩為末中射工毒及諸毒皆水服方寸匕
日三以雞子白和塗腫上乾則易之兼以水和少許洗腫

上疑少
香

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方

野葛根 巴豆去 烏頭 蜀椒各伍 附子

丹砂

茵芋

各壹兩

雄黃

大黃

躑躅

各貳兩

右壹拾味搗篩為散以不中水猪膏十斤煎三上三下去滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩病上勿近眼凡合名膏皆不用六畜婦人小兒見之

麻子湯主遍身流腫方

麻子

伍升

赤小豆

叁升

防風

叁兩

附子

炮

當歸

各壹兩

右伍味先搗麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓內藥及豆合煮取四升去滓食豆飲汁

治惡毒腫或著陰卵或偏著一遍疼急攣痛牽小腹不可忍一宿殺人方

取茴香草搗取汁飲一升日三四服滓薄腫上此外國方神驗從永嘉以來用之起死人神效無比

凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰胯痛方

取桃仁壹升去尖皮兩仁者熬令黑煙出熱研如脂以好酒三升攪令相和服覆取汗不過兩三度作之差若從脚腫向上稍進入腹殺人方

取赤小豆一斗以水三斗煮爛出豆以汁漬滕以下日一數日則愈矣若已入腹者不須漬滕但煮豆食之斷一切鹽菜飲食米麪惟祗食豆一物渴飲豆汁差乃止

大麻子赤小豆湯主毒腫無定處或救瀆惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也

大麻子

熬

赤小豆

格伍

生商陸

貳升薄

升麻

肆兩

附子

炮

射干

略叁

右六味以水四斗煮諸藥取二斗五升去滓研麻子令破以麻子汁煮豆令極熟去滓可得六七升一服一升一日一夜令盡小便當利即毒除腫減食兼此豆益佳如湯沃

雪凡用麻子皆不得用鬱悒者可揀擇用之

丁腫方

狗尿珠一名龍葵取汁傳之拔出根冬用乾者湯漬取汁用之

又方

取倉耳燒灰和醋泔澱作泥封之乾即塗勿住取拔根出乃止

又方

取黑牛垢封之

又方

刮竹箭上取茹作炷灸上二七壯即消矣

又方

未附子醋和傳上燥即塗

又方

取生薺危根汁一合去滓塗不過二度

丹胗第五方二十八首

治丹毒腫升麻搗湯方

升麻

漏蘆

芒消

各貳

蒴藿根

伍

黃芩

兩

梔子

貳拾枝