

卷
五
五

婦人良方

婦人良方卷之二十

薛氏醫按

臨川陳自明編

吳興陳自明編

新都閔道

校正

產後門

○產後遍身疼痛方論第一

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致肢體沉重
不和筋脉引急發熱頭痛宜用趁痛散治之陳無擇云若兼感
寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗則筋脉抽搐手足厥冷
則變爲瘕當大補氣血爲主

愚按前症若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物炮薑紅
花桃仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物
炮薑人參白朮補而養之

附治驗

一產婦身腹作痛發熱不食煩燥不寐盜汗脇痛服解散祛
血之藥不時昏憤六脈洪大如無用補中益氣加炮薑半夏
一劑頓退二三又劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大補
湯調理而安

一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之症也用
五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而直氣虛也
用八珍湯調補而痊

趁痛散 治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝酒炒 甘草炒

薤白 各一兩 當歸

桂心

白朮炒 黃芪炒

獨活

生薑 各半

右每服半兩

五積散 方見四卷第

九論 此方乃參看 蘇本 考其 陳 氏 桔 枳 枳 實 白 芷 肉 桂 蘇 黃 等 藥 皆 有 其 意 在 此

附方

四物湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

八珍湯

十全大補湯二方見二十四卷第四論

○產後腰痛方論第二

腎主腰脚。產後腰痛者。蓋腎爲胎胞所繫。此因產勞傷腎氣。以致風冷客之。若連背脊痛久未已。後遇娠必至損動。

○愚按前症真氣虛邪乘之者。用當歸黃芪湯。或十全大補爲主。佐以寄生湯。如不應。用十全大補加附子。

附治驗

○一產婦腰痛腹脹善噫。諸藥皆嘔。余以爲脾虛血弱。用白朮

一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲匙許四劑後漸安百餘劑而愈

△治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難

獨活

川芎

芍藥

炒黃

桂心

續斷

生薑

桑寄生

各六

當歸

防風

各八

右水煎服

△如神湯即生料五積散加桃仁逐敗血去風濕

產後惡露不盡腰重痛或兩脇痛如錐刺宜服桃仁湯若作癰

用五香連翹湯

△桃仁湯

治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿股作痛急用

此湯治之如未應多變作癰須用五香連翹湯

桃仁

去皮

蘇木

生

地黃

各半

蟲蟲

去足

炒水

蛭炒各三

兩

右每服五錢姜水煎空心熱服以惡露下為度

五香連翹湯

木香

丁香

沉香

乳香

麝香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

木通各二兩

右每服五錢

水煎入竹瀝少許服

當歸黃芪湯

治腰痛不可轉側或

汗出壯熱氣短

黃芪炒

芍藥炒當歸三兩

右每服四錢水煎

附方

十全大補湯治症同前又治自汗盜

汗或內熱肺熱潮熱發熱

或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨

脹脇肋作痛或臍腹陰冷

二便不調或頭頸時痛眩暈目花

或心神不寧恍惚不寐或

形容不充肢體作痛或鼻吸氣冷

急趨氣促或因飲食勞役

起居失宜或更有一切虛熱之症

但服此藥補其根本諸症

悉退

方見二十四卷第四論

獨活寄生湯

方見四卷第七論

○產後惡露不絕方論第三

產後惡露不絕因傷經血或內有冷氣而臟腑不調故也

愚按前症若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯胃氣下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸

附治驗

一產婦惡露淋瀝體倦面黃食少惡寒晝夜不寐驚悸汗出

此脾經虛熱用加味歸脾湯而痊後因怒脇脹作嘔少食月六君加柴胡治之而痊

一方用蒲黃二兩水煎頓服

一方貫眾醋蘸炙乾為末每服二錢米飲調下

返魂丹

一名益母草丸

治產後惡露不絕及胎前產後諸症

益母草四月採取

陰乾用葉及子○子名充蔚子不許犯鐵器

為末煉蜜丸彈子大每服一九細嚼

米飲下臨產腹痛或胎動不安或漏血當歸湯化下死胎或胎衣不出或牙關緊急或血暈血熱煩悶如見鬼神併童子小便入酒少許化下惡露腹痛或淋瀝或月水不調當歸酒化下

附方

六味丸

方見二十四卷第十一論

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

補中益氣湯

六君子湯

加味四物湯

三方見二十四卷第六論

一味防風丸

方見十二卷第六論

○產後惡露不下方論第四

產後惡露不下因臟腑勞傷氣血虛損或風冷相搏所致

愚按前症若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花薤散

若因去血過多而煩熱不止宜參第七論主治

附治驗方藥

一產婦患前症服峻厲之劑惡露隨下久而昏憒以手護其服余曰此脾氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

失笑散

方見後

人參理中湯

方見後

花蒞石散

方見十八卷第四論

返魂丹

方見前

○產後惡露上攻心痛方論第五

產後心痛爲陰血虧損隨火上衝心絡名曰心胞絡痛宜大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕死夕發朝死無藥可救

愚按前症若陽氣虛寒用岩蜜湯溫之瘀血上衝用失笑散

散之血既散而痛仍作用八珍湯補之。大凡肚腹作痛以手按之却不痛此血虛也須用補養之劑。

附治驗

一產婦患前症昏憤口禁冷汗不止手足厥逆用六君子加附子一錢以廻其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安。

一產婦患前症手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復痛亦用前藥而安。

一產婦患前症用大黃等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憤自以兩手堅護其腹不得診脉視其面色青白余爲脾氣虛寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加薑桂調理而安。

大岩蜜湯

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地黃

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥炒

乾薑炒

甘草炒

桂心

小草略一

細辛半兩

右每服半兩水煎服

失笑散

治產後惡血上攻心腹作痛或牙關緊急一服可愈

五靈脂

蒲黃略一

右醋水煎一味五靈脂尤妙

六君子湯

方見二十四卷第六論

十全大補湯

八珍湯

二方見二十四卷第四論

○產後惡露腹痛方論第六

產後腹痛或因外感五邪內傷六淫或瘀血壅滯所致當審其因而治之

愚按前症若瘀血內停用失笑散風寒外感用五積散

附治驗

一婦產後小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停灌以失笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

一婦人經水來比常度過多不止遂服瀉藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈

隱居澤蘭湯

治產後惡露腹痛或胸滿少氣

澤蘭

生地黃

當歸

芍藥

生薑各一錢

甘草

炒五分

大棗

四個

右水煎服

四物湯

方見二十四卷第六論

五積散

方見第四卷第九論

失笑散

方見前

○產後兒枕腹痛方論第七

產後兒枕者乃母胎中宿血也或因風冷凝滯於小腹而作痛愚按前症若宿血作痛失笑散行之既散而仍痛四神散調之若惡心作嘔此屬氣虛用六君子健其胃氣若發熱頭痛或腹痛按而不痛此屬血虛用四物炮薑參朮補其脾氣

附治驗

一產婦患前症或用驅逐之劑昏憤口噤手足發搐此血氣虛極之變症也用八珍湯加炮薑二錢四劑未應又以十全大補湯加炮薑一錢三劑而甦

一方用山查濃煎汁入砂糖少許再煎熱服

失笑散

方見前

四神散

方見第四卷第四論

四物湯二方見二十四卷第六論

八珍湯

十全大補湯二方見二十四卷第四論

○產後小腹痛方論第八

產後小腹痛由惡露凝結或外寒相搏若久而不散必成血瘕而月水不調。

愚按前症若因氣滯用延胡索散若因外寒用五積散若因怒氣用四物加木香柴胡若因血虛用四物參朮炮薑若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑若因脾虛血弱用六君當歸炮薑治之。

附治驗

一產婦患前症或作嘔或昏瞶此脾氣虛寒用人參理中湯。

漸愈又以補中益氣湯加扶苓半夏全愈後復作痛而兼喘仍用補中益氣湯培補脾肺而瘥

延胡索散 治產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索

桂心各半兩

當歸一兩

右為末每服二錢食前用熱酒調下失笑散尤效

當歸養血丸 治產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸

赤芍藥

牡丹皮

延胡索

炒各二兩桂心一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫酒下

附方

人參理中湯 治陽氣虛弱小腹作痛或脾胃虛弱飲食少思

或去後無度或嘔吐腹痛或飲食難化胃膈不利加附子各附子理中

湯

婦人良方 辛氏醫案卷之二十一

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙各等分

右每服五七錢或一兩水煎服

五積散

方見四卷第九論

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

○產後寒症腹痛方論第九

產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊肉湯治之

愚按前症若脾胃虛弱寒邪所侵用蟠葱散若肝經濕熱小便不利用龍膽瀉肝湯仍參前論恐有瘀血爲患

附治驗