

證治要訣

丹溪心法

成附餘

秘傳證治要訣卷六

太醫院使戴元禮述

諸嗽門

嗽證

古人云臟腑皆有咳嗽夫嗽屬肺何為臟腑亦皆有之蓋咳嗽為病有自外而入者有自內而發者風寒暑濕外也七情飢飽內也風寒暑濕先自皮毛而入皮毛者肺之合故雖外邪欲傳臟腑亦必先從其合而為嗽此自外而入者也七情飢飽內有所傷則邪氣上逆肺為氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而

信
為嗽此自內而發者也然風寒暑濕有不為嗽者蓋所感者重經傷臟腑不留於皮毛七情亦有不為嗽者蓋病尚淺止在本臟未即上攻所以傷寒以有嗽為經而七情飢飽之嗽久而復見凡諸嗽未審內外所感並宜二陳湯加杏仁五味人參各半錢重飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也治熱嗽以小柴胡湯加五味冷嗽理中湯加五味皆已試之驗此出醫餘

吞下養正丹
諸嗽皆可佐以應夢觀音散而加喘者以此於食前

壅嗽聲重痰稠或咳有血以薄荷生胡麻各一撮細
嚼煎蘇子降氣湯送下

感風而嗽者惡風有汗或身體發熱或鼻流清涕桂
枝湯加人參杏仁五味各半錢

應嗽多汗體虛而又不勝熱藥者橘蘇散

感寒而嗽者惡風無汗或身體發熱或鼻流清涕宜
杏子湯

若風寒俱感而嗽者或惡風無汗或惡風有汗頭痛
身疼塞鼻蓋眼涕疾稠枯者小青龍湯以上三藥傷
寒太陽經有嗽者皆可用

感暑而嗽者自汗煩渴或帶寒面垢六和湯加五味子一錢

感濕而嗽者身體痛重或汗或小便不利此多乘熱入水或冒雨露或浴後不解濕衣致此宜白朮湯
熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且濃
或帶血縷或帶血腥臭或堅如蠣肉不若風寒之嗽
痰清而白宜金沸草散仍以辰砂化痰圓或薄荷煎
八風丹含化熱嗽於金沸草散中加五味杏仁茯苓
足成十品入束子一箇同煎功效尤勝名旋覆湯
有熱嗽諸藥不効竹葉石膏湯去竹葉加粳米少加

知母多加五味杏仁此必審是伏熱在上焦心肺間
可用

有熱嗽失聲咽痛多進冷劑而聲愈不出者宜以生
姜汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷熱
嗽後失聲者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有之宜審
其證用藥佐以橄欖圓含化仍濃煎獨味枇杷葉散
熱服

冷熱嗽因增減衣裳寒熱俱感遇乍寒亦嗽乍熱亦
嗽飲熱亦嗽飲冷亦嗽宜金沸草散消風散各一貼
和煎或應夢人參散或欬冬花散二母散仍以辰砂

化痰圓八風丹或四和圓含化七情飢飽嗽無非傷動臟腑正氣致邪上逆結成痰涎肺道不理宣順為先四七湯半貼加桑白皮杏仁五味子人參阿膠各半錢

有嗽血痰與食俱出者此蓋飲食失節致肝氣不利而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二陳湯加木香杏仁細辛枳壳各半錢

有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜紫苑飲勞嗽有久嗽成勞者有因病勞久嗽者其證寒熱往來或濁熱無寒咽喉痛精神疲極所嗽之痰

或燿或時有血腥臭異常語聲不出者補肺湯半貼
加杏仁貝母款冬花阿膠百合各半錢煎去查調鍾
乳粉咽痛者更加桔梗半錢熟甚者更加秦瓦半錢
嘔者去地黃加半夏如其數氣急者加靈砂丹或三
炒丹

經年累月久嗽不已服藥不瘥餘無他證却與勞嗽
不同宜三拗湯仍佐以青金丹

脾胃如常飲食不妨者加味人參清肺湯參粟湯有
暴嗽服藥不効者或教之進生料鹿茸丸大凡絲子
丸方愈此乃賢虛所致有本有標却不可以暴嗽為

疑遽補之非然所以易愈者亦覺之早故也
嗽而有血見諸血門嗽血證

時行嗽發熱惡寒頭痛鼻塞氣急狀如傷寒熱連咳
不已初得病即伏枕一兩日即輕記壬午秋滿城有
此病繼時甲午年夏秋之交此病又自南而北得免
者少並呼為蝦蟆瘧用參蘇飲加細辛半錢

哮喘

喘氣之病哮吼如水雞之噏牽引胸臂氣不得息坐
卧不安此謂嗽而氣喘或宿有此根如遇寒暄則發
一時暴感並於前嗽藥中加桑白皮則續加仍養

正丹間進青金丹風寒喘嗽宜九寶湯若乾喘不嗽
不分久遠近發宜蘇子降氣湯或神秘湯吞養正丹
重則四磨飲或六磨飲吞靈砂丹或應夢觀音散吞
養正丹尤宜

喘而服藥不効者利導之宜神保丸大便已溏者不可用

不嗽而氣自急有二證須用分別有外邪迫肺而氣急者病初得氣不急必兼外證此謂之喘若用耗氣除邪之藥則元氣愈脫而氣愈上奔矣宜於虛損門氣急痰證求之氣急而膈間更有刺痛處宜分氣飲

治嗽與喘用五味為多但五味有南有北生津止渴潤肺益腎治勞嗽者宜用北五味若風邪在肺宜用南五味不芳二者兼用

嘔吐附惡心

嘔與吐之辨已於傷寒論之然証亦有不一有寒嘔
熱嘔氣嘔痰嘔吐食嘔吐血吐涎惡心乾嘔除熱嘔
吐血外近世嘔吐二字皆通用然却無甚利害理亦
自不妨並小半夏茯苓湯或二陳湯或理中湯多加
生姜煎生姜嘔中之聖藥大痛色如青菜葉者死
寒嘔中脘停寒飲食喜辛熱物入口即吐出宜二陳

湯加丁香十粒或理中湯加枳實半錢不効則溫中
湯姜則附子理中湯或丁附湯並須冷服蓋冷遇冷
則相入庶不出有痰飲粥藥到口即吐人皆謂其
番胃非也此乃痰氣結在咽喉之間宜先以姜蘇湯
下靈砂丹俟藥可進則以順氣之藥繼之

止有吐瀉及痢疾或腹冷痛進熱劑太驟以致嘔逆
宜二陳湯加砂仁白豆蔻各半錢甚則入沉香少許
寒熱氣食痰血六呞外有漏氣走哺漏氣者上焦熱
食必先吐而後下汗出身胃熱走哺者下焦熱氣無
不經大小便不通嘔吐不禁

熱嘔見諸傷門傷寒嘔吐證凡進熱藥愈增者當於
寒嘔中求熱嘔宜二陳湯加黃連一錢氣嘔胸膈滿脣
脣閉格不通不食常飽食則常氣逆而吐此因盛怒
中飲食而然宜二陳湯加枳實木香各半錢或吳茱
萸湯不効則丁沉透膈湯及五膈寬中湯

食嘔多因七情而得有外感邪氣并飲食不節而生
大概治以理中為先二陳湯加枳實一錢或加南星
七分沉香本香各四分亦好或只服枳南湯或導痰

方有中脘伏痰遇冷即發俗謂之冷癧或服新法半

夏湯或孤脾湯外有熱痰而嘔者宜小半夏茯苓湯
加竹茹如錢大若嘔痰而或致厥者乃寒痰逆閼謂
之痰厥宜姜附湯以生附代熟附

三疣乃胃寒所生經云疣者長虫也胃中冷則吐疣
成疣屬宜理中湯加炒川椒五粒枳榔半錢吞烏梅
丸恶心乾嘔欲吐不吐心下映漾人如畏魘宜大半
夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯治中湯皆可用

嘔吐諸藥不効常借鎮重之藥以墜其逆氣宜姜蘇
湯下靈砂丹須百粒作一服便要得効却以養正丹
半錠開導之嘔吐津液既去其口必渴不可因渴而

遂以為熱

人有吐諸藥不効又別無前項痰氣等証乃或在
胸膈作逆見藥則動動則不納藥藥出而或不出雖
非吐號之比亦宜用吐藥或於治嘔藥中入炒川
椒十粒或見椒則頭伏故也

曾有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到口即吐
後去乾姜只參附加丁木二两煎熟更磨入沉香藥
立止定蓋虛痰氣凝結丁附既溫佐以沉木香則通
乾姜白术則泥耳

吐血見血門

停飲伏痰

飲凡有六懸溢交痰留伏痰飲特六飲之一耳人病此而止曰痰飲者蓋停既久未有不為痰多因氣道閉塞津液不通譬如溝渠壅遏積淹停滯則倒流逝上瘀濁真穢無所不有若不踈決溝渠而欲澄治已壅之水而使之清無是理也

凡為喘為咳為嘔為泄為眩為脳為暉心嘈怔忡驚悸為寒熱痛腫為痞膈為壅閉或胸脇間轆轤有聲或背心一片常如水冷皆飲食所致此即如水之壅有瘀濁真穢故善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之

津液亦隨氣而順矣並宜蘇子降氣湯導痰湯各半
貼和煎或小半夏茯苓湯枳實木香各半錢吞五
套丸或以五套丸料依分兩作飲子煎服尤好平居
皆無他事只有痰數口或清或堅宜二陳湯小半夏
茯苓湯痰多間進青州白丸子和來復丹服來白丸
如和以八神來復丹即名青神丸此非特治痰飲尤
甚療喘嗽嘔吐逆蓄胃若服藥未効者二生湯加木
香半錢若頑涎隨氣逆上不為藥解當自下部利之
宜五膈寬中散加半夏半錢吞破飲丸仍佐以半硫
丸恐大便復秘飲利不盡半硫丸當常服若大便先