

醫學秘奧
二

此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疽因色慾過度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成串令人口乾身發寒熱百節皆疼治方于後

十奇散 治發背傷于腎者

桔梗

人參

歸身

花粉

五味子

芍藥

烏藥

香附

枳殼

木香

囊腫加

川棟子

檳榔

百節疼痛加木瓜

牛膝

赤芍

寒熱加

柴胡

黃芩

酒煎散

治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者

用手按之如半頸之皮上有黃泡出腥水乃毒入
于肺若不速治卽死

當歸

山甲炮

白芷

升麻

肉桂

木香

川芎


赤芍

甘草

酒煎服

或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁鋒砭去惡
血卽用鷄子清調乳香末敷之時，用芭蕉根汁
潤之以助藥功

蜂巢發



此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉亦紫色風
毒氣傷于腠理可發出卽生不發出卽死此毒因
膏粱之味溫床厚被醉飽房事以致五臟積毒不
流積而爲癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大
便澹泄此毒串于左脇卽死治方于後

內托十宣散

人參

黃芪

白朮

當歸

白芍

厚朴

白芷

川芎

連翹

官桂

桔梗

防風

甘草

荊芥

銀花

水二鍾煎八分食前連進十貼

虛甚者加附子

心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁

大便溏泄加黃連木香白朮土炒蒼朮

內陷不發加穿山甲乳羊角煅

小便頻數加薏苡仁益志

膿不透加歸須地蜈蚣炙赤芍

連服蠟凡九日進五服

膿將透便服排膿內補十宣散即內托散

加木香山甲 仍貼金絲膏

經體發



此毒因暑熱之時空心受其穢氣以致胃氣仍敗
則致嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳
香托裏散再服五香連喬散蠟凡丸外貼金絲膏
內服忍冬酒一日三服忍冬酒方具前

連子發背



此疽發于右胛中恐其毒氣奔入心大要用藥散
之付圍藥点截住不令攻心如在中道通于背皆
腫不可救也消者可療諸瘡痛痒皆属于心以心
生血而行氣之痛諸瘡皆有敷藥就上下打大針
三四針爲妙用前化毒消腫散千金內托散多加
參芪

圍藥

南星

草烏

木鱉

貝母

大蒜

另搗

白芨

五倍

已上爲末

生姜

汁

米醋

調付留口二三日夜卽消盡矣常以醋潤之
護心散蠟凡丸時刻不可缺

上中下三搭手



上中下三搭手受在五臟六府毒熱憂怒氣壅傷
于肺經結聚成毒此是惡症也當用腦疽發背癰
疽等藥治之

圍藥亦然 時進忍冬酒蠟凡丸

上中下三發背




上發背受在陶道經主傷于肺肝心經驚鬱結聚
怒氣傷肝壅出背毒此乃惡毒症也先用敗毒流
氣飲次用護心托裏散后用內托流氣飲治之敗
毒流氣方在後又并護心托裏散流方于後

中發背受在神堂靈道經正心毒心血湧出不能
歸肝氣血壅在于中損于肝經此乃惡症當用煎
藥治之敗毒流氣飲方在後

下發背受在脾肝經絡凝滯于五臟傷于三經此
是三毒之症也先用敗毒流氣飲後用人參內托
散外用圍藥敷之

對臍毒 一名衝疽



衝疽者生于腰腎也發背骨作瘡腫又名對臍又名歷腎主毒流入腎囊三十日可刺其膿赤白色者不死青黃紫色又兼謊語及見物者瘡發則內腎疼變爲渴者萬無一全也多服參芪內托散加知母 黃柏 麥冬 以滋腎水



腰疽



此疽受在陰包氣穴傷于濕氣血不行流注經絡
此是毒症也當用發背藥治之三五日內宜灸七
壯卽消