

金匱心典卷中

漢張仲景著

吳下尤怡在溼集註

奔豚氣病脉證治第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚欬有火邪此四部病皆從驚發得之。

奔豚具如下文吐膿有欬與嘔之別其從驚得之旨未詳驚怖卽驚恐蓋病從驚得而驚氣卽爲病氣也。火邪見後驚悸部及傷寒太陽篇云太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圜血名爲火邪然未嘗云從驚發也驚悸篇云火邪者桂枝去芍藥加

蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。此亦是因火邪而發驚。非因驚而發火邪也。卽後奔豚證治三條亦不必定從驚恐而得。蓋是證有雜病傷寒之異。從驚恐得者。雜病也。從發汗及燒鍼被寒者。傷寒也。其吐膿火邪二病。仲景必別有謂姑闕之以俟知者。

或云東方肝木。其病發驚駭。四部病皆以肝爲主。奔豚驚怖。皆肝自病。奔豚因驚而發病。驚怖卽驚以爲病也。吐膿者。肝移熱於胃。胃受熱而生癰膿也。火邪者。木中有火。因驚而發。發則不特自燔。且及他藏也。亦通。

師曰奔豚病從少腹上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

前云驚發此兼言恐者腎傷於恐而奔豚爲腎病也
純水畜也腎水藏也腎氣內動上衝胸喉如豕之尖
故名奔豚亦有從肝病得者以腎肝同處下焦而其
氣竝善上逆也

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

此奔豚氣之發於肝邪者往來寒熱肝藏有邪而氣
通於少陽也肝欲散以薑曼生葛散之肝苦急以甘
草緩之芎歸芍藥理其血黃芩李根下其氣桂苓爲

奔豚主藥而不用者。病不由腎發也。

奔豚湯方

甘草

芎藭

黃苓

芍藥

各二兩

半夏

生薑

各四兩

生葛

五兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升。溫服一升。日三夜一服。

發汗後燒鍼。令其汗鍼處被寒。核起而赤者。必發奔豚。

氣從少腹上至心。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯主

之。

此腎氣乘外寒而動。發為奔豚者。發汗後燒鍼。復汗

陽氣重傷於是外寒從鍼孔而入通於腎腎氣來外
寒而上衝於心故須灸其核上以杜再入之邪而以
桂枝湯外解寒邪加桂內泄腎氣也

桂枝加桂湯方

桂枝 五兩

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右五味以水七升

微火煮取三升去滓服一升

發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主

之

此發汗後心氣不足而後腎氣乘之發為奔豚者臍

下先悸此其兆也

桂枝能伐腎邪茯苓能泄水氣然

欲治其水必益其

土故又以甘草大棗補其脾氣甘

瀾水者揚之令輕

使不益腎邪也

茯苓桂枝甘草大棗

湯方

茯苓半斤

甘草

二兩

大棗

十五枚

桂枝

四兩

右四味以甘瀾水

一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮

取三升去滓溫服

一升日三服

甘瀾水法取水二斗置大盆內以杓揚之

上有珠子五六千顆相逐取用之也

寒而止瀾水心也

茯苓其色土以桂枝人支膠而以

出藥單會公其

藥法此法西人並然醫家亦

胸痺心痛短氣病脉證治第九

師曰。夫脉當取太過不及。陽微陰弦。卽胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛知在上焦。所以胸痺心痛者。以其陰弦故也。

陽微。陽不足也。陰弦。陰太過也。陽主開。陰主閉。陽虛而陰干之。卽胸痺而痛。痺者閉也。夫上焦爲陽之位。而微脉爲虛之甚。故曰責其極虛。以虛陽而受陰邪之擊。故爲心痛。

平人無寒熱。短氣不足以息者。實也。平人素無疾之人也。無寒熱。無新邪也。而乃短氣不

足以息。當是裏氣。暴實或痰或食或飲。碍其升降之
氣而然。蓋短氣有從素虛宿疾而來者。有從新邪暴
遏而得者。二端竝否。其爲裏實無疑。此審因察病之
法也。

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脈沉而遲。關上
小緊數。括樓薤白白酒湯主之。

胸中陽也。而反痺。則陽不用矣。陽不用則氣之上下
不相順接。前後不能貫通。而喘息欬唾。胸背痛。短氣
等證見矣。更審其脉寸口亦陽也。而沉遲。則等於微
矣。關上小緊亦陰。弦之意而反數者。陽氣失位。陰反

得而主之。易所謂陰疑於陽。書所謂牝雞之晨。是當以通胸中之陽爲主。薤白白酒辛以開痺。溫以行陽。括樓實者以陽痺之處必有痰濁阻其間耳。

括樓薤白白酒湯方

括樓實一枚 薤白半升 白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得臥。心痛徹背者。括樓薤白半夏湯主之。

胸痺不得臥。是肺氣上而不下也。心痛徹背。是心氣

塞而不和也。其痺爲尤甚矣。所以然者。有痰飲以爲

之援也。故於胸痺藥中。加半夏以逐痰飲。

括樓薤白半夏湯方

括樓實

一枚

薤白

三兩

半夏

半升

白酒

一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺。心中痞氣。氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。人參湯亦主之。

心中痞氣。氣痺而成痞也。脇下逆搶心。氣逆不降。將為中之害也。是宜急通其痞。結之氣。否則速復。其不振之陽。蓋去邪之實。卽以安正。養陽之虛。卽以還陰。是在審其病之久暫。與氣之虛實而決之。

括樓薤白桂枝湯方

枳實 四枚

薤白 半斤

桂枝 一兩

厚朴 四兩

栝樓實 一枚

右五味以水五升。先煮枳實厚朴取二升。去滓內諸

藥煮數沸分溫三服

人參湯方

人參 一兩 甘草 二兩 乾薑 一兩 白朮 各三兩

右四味以水八升。煮取三升。溫服一升日三服

胸痺。胸中氣塞短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳生薑

湯亦主之。

此亦氣閉氣逆之證。視前條為稍緩矣。三方皆下氣

散結之劑而有甘淡苦辛之異亦在酌其強弱而用之。

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓 三兩

杏仁 五十

个

甘草 一兩

分

右三味以水一斗。煮取五升。溫服一升。日三服。不差更服。

橘枳生薑湯方

橘皮 一斤

枳實 三兩

分

生薑 半斤

分

右三味以水五升。煮取二升。分溫再服。

胸痺緩急者。薤白附子散主之。

薤白

附子

散

主之

陽氣者精則養神柔則養筋。陽痺不用則筋失養而
或緩或急。所謂大筋輭短小筋弛長者是也。故以薏
苡仁舒筋脉附子通陽痺。

薏苡附子散方

薏苡仁

十五兩

大附子

十枚炮

右二味杵為散服方寸匕日三服

心中痞。諸逆心懸痛。桂枝生薑枳實湯主之。

諸逆該痰飲客氣而言。心懸痛謂如懸物動搖而痛。

逆氣使然也。桂枝枳實生薑辛以散逆苦以泄痞。溫

以祛寒也。

桂枝生薑枳實湯方

桂枝

生薑

枳實

枳實

五兩

右三味以水六升煮取三升分温三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

心背徹痛陰寒之氣遍滿陽位故前後牽引作痛沈

氏云邪感心包氣應外俞則心痛徹背邪襲背俞氣

從內走則背痛徹心俞臟相通內外之氣相引則心

痛徹背背痛徹心即經所謂寒氣客於背俞之脉其

俞注於心故相引而痛是也烏附椒薑同力協濟以

湯氣而下陰也右脂者所以安心氣也

赤石脂丸方

烏頭一分

蜀椒

乾薑各一兩

附子半兩

赤石脂一兩

右五味末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服不

知稍加服

附方

痛丸治九種心疼

附子三兩

生狼牙

巴豆去皮熬研如膏 乾薑

吳茱萸

人參各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸

日三服弱者三九兼治卒中惡腹脹口不能言又治
連年積冷流注心胸痛并冷衝逆氣落焉墜車血疾
等皆主之忌口如常法

按九痛者一蟲二注三風四悸五食六飲七冷八熱
九去來痛是也而竝以一藥治之者豈痛雖有九其
因於積冷結氣所致者多耶。