

證治準繩

伍

證治準繩第五冊目錄

諸風門

癘風

破傷風

瘳

瘵

顫振

攣

眩暈

神志門

癲狂癇總論

癲

狂

癇

煩躁總論

虛煩

躁

譫妄

尸症

循衣摸牀

喜笑不休

怒

善太息

悲

驚悸恐總論

驚

悸

恐

健忘

雜門

汗總論

自汗 頭汗

手足汗 無汗

盜汗

卧總論

不得卧

多卧

怠惰嗜卧

身重

不能食 饑不能食
惡食

瘡

消癰 口燥咽乾

黃疸 食勞瘡黃
日黃

嘈雜

欠嚏

證治準繩第五冊

金壇王肯堂輯

癰風

素問脉要精微論曰脉風成爲癰風論曰風寒客於脉而不去名曰癰風癰風者榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰又謂風氣與太陽俱入行諸脉俞散諸分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉臃腫而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也長刺節論曰大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉爲故汗出百日王註謂泄衛氣之拂熱刺骨髓汗出百日王註以泄榮氣之拂熱二百日鬚眉生而止靈樞曰癰風者數刺其腫上已刺以銳針針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食母食他食今觀經之論治分榮衛者如此若古方雖多但混瀉其風熱於榮衛又無先後之分至東垣丹溪始分之活法機要云先樺皮散從少至多服五七日灸承漿穴七

壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室
三年病愈此先治其衛後治其榮也試効方治段庫使用補氣瀉榮
湯此治榮多於治衛也丹溪云須分在上在下在上者以醉僂散取
臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虻蟲於穀道中
出所出雖有上下道路之異然皆不外於陽明一經而已看其疔瘡
上先見在上體多者病在上也下先見在下體多者病在下也上下
同得者病在上復在下也陽明主胃與大腸無物不受此風之入人
也氣受之在上多血受之在下多血氣俱受者上下皆多自非醫者
神手病者鐵心罕有免者夫氣爲陽爲衛血爲陰爲榮身半已上陽
先受之身半已下陰先受之是故再造散治其病在陰者用皂角刺
出風毒於榮血中肝主血惡血留止其屬肝也蟲亦生於厥陰風木
所化必用是治其藏氣殺蟲爲主以大黃引入腸胃榮血之分利出
瘀惡蟲物醉僂散治其病在陽者用鼠粘子出風毒徧身惡瘡胡麻

逐風補肺潤皮膚藜蘆王惡血身體風痒通鼻氣防風治諸風托裏
根治瘀血消熱附腫枸杞消風熱散瘡毒蔓荊子主賊風苦參治熱
毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫八味藥治功固至矣然必銀粉爲使
銀粉乃是下膈通大腸之要劑所以用其驅諸藥入陽明經開其風
熱怫鬱痞隔逐出惡風臭穢之毒殺所生之蟲循經上行至牙齒輒
薄之分而出其臭毒之涎水服此藥若有傷於齒則以黃連末揩之
或先固濟以解銀粉之毒銀粉在醉僂散有奪旗斬將之功遂成此
方之妙用非他方可企及故丹溪取二方分用之如破敵之先鋒至
於餘和未除者但調和榮衛藥中少加驅逐劑耳

薛新甫曰大抵此證多由勞傷氣血腠理不密或醉後房勞沐浴或
登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱相火血隨火化而致故淮陽關
廣間多患之眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝脚底先痛或
穿者毒在腎偏身如癱者毒在脾目先損者毒在心此五臟受病之

重者也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三曰血死爛潰四
曰筋死指脫五曰骨死鼻柱壞此五臟受傷之不可治也若聲啞目
盲尤爲難治治當辨本證兼證變證類證陰陽虛實而斟酌焉若妄
投燥熱之劑膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈枯相火愈旺
反成壞證矣

本證治法 癰瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼證無有弗
雜况積歲而發現於外須分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻
毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也 癰瘍當知
有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一蓋兼證當
審輕重變證當察先後類證當詳真偽而汗下砭刺攻補之法又當
量其人之虛實究其病之源委而施治焉蓋虛者形氣虛也實者病
氣實而形氣則虛也 癰瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針
蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗卽出血出血卽發汗二者一

律若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗取委中出血則効若惡毒
蘊結於臟非蕩滌其內則不能瘥若毒在外者非砭刺徧身患處及
兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非
外砭內泄其毒決不能退若上體患多宜用醉僂散取其內蓄惡血
於齒縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血下體患多宜用再
造散令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一二日更刺
之以血赤爲度如有寒熱頭疼等證當大補血氣 瘍瘍服輕粉之
劑若腹痛去後兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫痛穢水時
流作渴發熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜用小
柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便秘結此爲熱毒內淫宜
用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃湯若穢水雖盡口舌
不愈或發熱作渴而不飲冷此爲虛熱也宜用七味白朮散 瘍瘍
手足或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血當用加味逍遙

散加生地黃及換肌散兼服 癰瘍生蟲者五方風邪翕合相火制
金木盛所化內食五藏而證見於外也宜用升麻湯送瀉毒丸或棗
皮散以清肺肝之邪外灸承漿以疏陽明任脉則風熱息而蟲不生
矣肝經虛熱者佐以加味逍遙散六味地黃丸

兼證治法

頭目眩暈若右寸關脉浮而無力脾肺氣虛也用補中

益氣湯若左關尺脉數而無力肝腎氣虛也用六味地黃丸若右寸
尺脉浮大或微細陽氣虛也用八味地黃丸血虛者四物湯加參苓
白朮氣虛者四君子湯加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清肝散肝經
虛熱者六味地黃丸脾氣虛弱者補中益氣湯脾虛有痰者半夏白
朮天麻湯衄血過多者芎歸湯發熱惡寒者聖愈湯大凡發熱則真
氣傷矣不可用苦寒藥恐復傷脾胃也 一口喎目斜若手足牽搐或
瞤稜痒動屬肝經血虛風熱用加味逍遙散六味地黃丸以生肝血
滋腎水若寒熱往來或耳聾脇痛屬肝木熾盛先用小柴胡合四物

湯以清肝火生肝血若筋攣骨痛或不能動履用六味地黃丸補中
益氣湯以滋化源若因服燥藥而致者用四物湯加生甘草金銀花
以解熱毒益陰血凡此俱屬肝經血燥所致須用六味地黃丸補中
益氣湯爲主若因怒氣房勞而甚者用六味地黃丸十全大補湯爲
主若因勞傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯爲主 夏秋
濕熱行令若飲食不甘頭目眩暈遍身酸軟或兩腿麻木口渴自汗
氣促身熱小便黃數大便稀澹濕熱傷元氣也用清燥湯如在夏令
用清暑益氣湯若自汗盜汗氣高而喘身熱脉大元氣內傷也用補
中益氣湯若嘔吐少食肚腹痞悶大便不實脾胃受傷也用六君子
湯若胸腹不利飲食少思吐痰不止脾胃虛痞也用四君子湯若形
氣倦怠肢體麻木飲食少思熱傷元氣也用人參益氣湯 熱湯便
濁若夜安晝熱者熱在氣分也用清心蓮子飲晝安夜熱者熱在血
分也用四物二連湯俱佐以六味地黃丸若寒熱往來者肝經血虛

也用加味逍遙散六味地黃丸 小便不利若因服燥藥而致者用
四物湯加炒黑黃蘗知母生甘草以滋陰血若頻數而色黃者用四
物湯加參朮麥門五味子以生氣血若短而色黃者用補中益氣湯
加山藥麥門五味以滋化源 大便不通若血虛內熱而澀滯者用
四物湯加麥門五味子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者用四物
湯加連翹生甘草以生血清熱若服剋伐之藥而致者用四君子湯
加芎歸以助氣生血若作渴飲冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以
清胃火若作渴飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯以補氣生津若
內熱作渴面赤飲湯者用四物湯送潤腸丸以涼血潤燥若腸胃滿
脹燥在直腸而不通者用豬膽汁導之腸胃氣虛血涸而不通者用
十全大補湯若肝膽和盛脾土受傷而不能輸化者用小柴胡湯加
山梔郁李仁枳殼治之 怔忡無寐或兼嘔血便血若內熱晡熱作
渴飲湯肢體倦怠此脾血虛而火動也用四君子加芎歸若思慮傷

脾動火而致用歸脾湯加山梔若發熱晡熱用八珍湯加酸棗仁茯
神遠志若因心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所致但
調補胃氣則痰清而神自安不必專於清熱治痰〔發熱惡寒若肢
體倦怠煩燥作渴氣高而喘頭痛自汗者此內傷氣血也用補中益
氣湯加五味麥門倦怠食少大便不調小便頻數瀝瀝惡寒者此脾
肺氣虛也用升陽益胃湯煩燥作渴體倦少食或食而不化者此脾
氣虛熱也用六君子湯〔發熱在午前脈數而有力者氣分熱也用
清心蓮子飲脈數而無力者陽氣虛也用補中益氣湯午後脈數而
有力者血分熱也用四物湯加牡丹皮脈數而無力者陰血虛也用
四物湯加參朮熱從兩脇起者肝虛也用四物湯加參朮黃芪從臍
下起者腎虛也用四物湯加參朮黃蘗知母五味麥門肉桂或六味
丸其熱晝見夜伏夜見晝止或去來無定時或起作無定處或從脚
起者此無根虛火也須用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味

更以附子未唾津調擦湧泉穴若形體惡寒著熱飲食者陽氣虛寒也急用八味丸
〔口乾若惡冷飲食者胃氣虛而不能生津液也用

七味白朮散若喜冷飲食者胃火盛熾消燦津液也須用竹葉石膏

湯夜間發熱口渴者腎水弱而不能上潤也當用六味地黃丸若因

汗下之後而有前患胃氣虛也宜用八珍湯
〔作渴若煩燥飲冷者

屬上焦實熱用涼膈散兼大便秘結者屬下焦實熱用清涼飲若用

尅伐之藥而渴者氣血虛也急用八珍湯六味丸
耳聾耳鳴若左

寸關脉弦數者心肝二經虛熱也用四物湯加山梔柴胡生陰血右

寸關脉浮大者脾肺二經虛熱也用補中益氣湯加山梔桔梗培陽

氣若因怒便作用小柴胡湯加山梔葛歸清肝涼血若午前甚用小

柴胡湯加參芪歸朮補氣清肝午後甚用四物湯加酒炒黑黃檗知

母五味補陰降火如兩足心熱屬腎虛用六味丸以壯水之主兩足

冷屬陽虛用八味丸以益火之源
〔項強口噤腰背反張者氣血虛

而發瘧也仲景云足太陽病發汗太多則瘧風病下之則瘧復發汗則加拘急瘧家發汗則瘧益風能散氣故有汗而不惡寒曰柔瘧寒能澀血故無汗而惡寒曰剛瘧皆因內虛復汗亡津血筋無所養而然悉屬虛象非風證也當大補氣血爲主故產婦潰瘍勞傷氣血濕熱相火誤服尅伐之劑者多患之其義可見一婦女經閉若因鬱火傷脾以歸脾湯加山梔丹皮氣血俱虛以八珍湯加山梔丹皮若因服燥藥傷血以四物湯加生甘草若經候過期而來者氣血虛也八珍湯倍用參朮先期而來者血氣熱也四物湯倍加參朮牡丹皮將來而作痛者氣虛血滯也四物湯加茯苓白朮香附色紫而成塊者血熱也四物湯加山梔丹皮作痛而色淡者血氣虛也用八珍湯其血崩之證肝火不能藏血者用加味逍遙散脾虛不能統血者用補中益氣湯凡此皆六淫七情虧損元氣所致當審其因而調補胃氣爲善

變證治法

身起疙瘩搔破膿水淋漓若寒熱往來者肝經氣血虛

而有火也用八珍散加丹皮柴胡寒熱內熱者血氣弱而虛熱也用

八珍散倍用參朮若惡寒形寒者陽氣虛寒也用十全大補湯若肌

膚搔如帛隔者氣血不能外榮也用人參養榮湯若面部搔之麻痒

者氣血不能上榮也用補中益氣湯若痿軟筋攣者血氣不能滋養

也用補中益氣湯佐以六味地黃丸口舌生瘡或咽喉作痛若飲

食喜冷大便秘結者實熱也用四順清涼飲肌熱惡熱煩渴引飲者

血虛也用當歸補血湯飲食惡寒大便秘不實者虛熱也用十全大補

湯熱從下或從足起者腎虛熱也用加減八味丸若飲食難化四肢

逆冷者命門火衰也用八味地黃丸牙齒作痛或牙齒潰爛若喜

寒惡熱屬胃火加味清胃散為主惡寒喜熱屬胃虛補中益氣湯爲

主白汗屬氣虛用補中益氣湯送六味地黃丸盜汗屬血虛用當

歸六黃湯內含連黃送六味地黃丸若因勞心而致以歸脾湯倍用

茯神酸棗仁

唾痰或作喘若右寸脉浮緩者肺氣虛也用六君子

湯加桔梗右寸脉洪滑者肺經有熱也用瀉白散右寸關脉浮緩遲

弱者脾肺氣虛也用六君子湯加桔梗黃芪右寸關脉洪滑遲緩者

脾熱傳肺也用瀉白瀉黃二散右尺脉微弱者命門火衰而脾肺虛

也用人參理中丸如不應用人參地黃丸右寸脉洪數者心火剋肺

金也用人參平肺散如不應用六味地黃丸左寸關脉洪弦數者心

肝二經有熱也用柴胡清肝散如不應佐以牛黃清心丸清其風熱

仍用六味地黃丸以鎮陽光左尺脉數而無力者腎虛而水泛上也

用六味地黃丸加五味子以滋陰如脉微細或手足冷或兼喘促急

用八味地黃丸以補陽舌赤裂或生芒刺兼作渴引飲或小便頻

數不時發熱或熱無定處或足心熱起者乃腎水乾涸心火亢盛用

加減八味丸主之佐以補中益氣湯若誤用寒涼之劑必變虛寒而

歿口舌生瘡作渴不止不時發熱或晝熱夜止或夜熱晝靜小便

頻數其熱或從足心或從兩脇或從小腹中起外熱而無定處者此
足三陰虧損之證也用加減八味丸爲主佐以十全大補湯若誤用
寒涼治火之劑復傷脾胃胸腹虛痞飲食少思或大便不實小便不
利胸腹膨脹肢體患腫或手足俱冷者此足三陰虧損之虛寒證也
急用加減金匱腎氣丸亦有復生者（肚腹腫脹若朝寬暮急屬陰
虛暮寬朝急屬陽虛朝暮皆急陰陽俱虛也陽虛者朝用六君子湯
又用加減腎氣丸陰虛者朝用四物湯加參朮又用加減腎氣丸真
陽虛者朝用八味地黃丸又用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹
手足並冷飲食難化或大便泄瀉口吸氣冷者此真陽衰敗脾肺腎
虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不救（發熱惡
寒若寸脈微名陽氣不足陰氣上入陽中則惡寒也用補中益氣湯
尺部脈弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱也用六味地黃丸
若暑熱令而肢體倦怠此濕熱所乘屬形氣虛而病氣實也當專補