

疾欲咳嗽

消渴小便不利淋

病肺疰第廿三

<sup>卷六</sup>水氣脉之疰第廿四

金匱要略

卷五

是

金匱要畧淺註

目錄

第一卷

臟腑經絡先後病脉第一

瘧濕暍病脉證第二

第二卷

百合狐惑陰陽毒病脉證第三

瘧病脉證第四

全圖要畧注言  
目錄  
中風歷節病脉證第五

第三卷

血痺虛勞證治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣脉證第七

第四卷

奔豚氣病證治第八

胸痺心痛短氣脉證第九

腹滿寒疝宿食脉證第十

五臟風寒積聚脉證第十一

第五卷

痰飲欬嗽脉證第十二

消渴小便不利淋病脉證第十三

第六卷

水氣脉證第十四

第七卷

黃痺證治第十五



驚悸吐衄下血胸滿痰血脈證第十六

第八卷

嘔吐噦下利脈證第十七

瘡癰腸癰浸浮脈證第十八

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蚘蟲脈證第十九

第九卷

婦人妊娠脈證第二十

婦人產後脈證第二十一

婦人雜病脉證第二十二附婦人陰挺論

第十卷

雜病方第二十三

禽獸蟲魚禁忌第二十四

果實菜穀禁忌第二十五

金匱要畧淺註卷五

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園註

男尉古愚全校字

痲飲。欬嗽病脈證治第十二

問曰。夫飲有四。何謂也。師曰。有痲飲。有懸飲。有溢飲。有支飲。

此分別四飲之名目也。今人於四飲外。加留

飲伏飲而不知四飲證之病因多起於水留

而不行甚者伏而不出亦何必另立病名乎

問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦其精

為痰飲不復外津化水走腸間水順流則無聲漉漉

有聲謂之痰飲即稠痰稀飲飲後水流在腸下

不上不下而俱見也欬唾引痛謂之懸飲懸即懸掛飲水

懸結不散之義也流行歸於四肢當汗出而不汗出經表身體夜

重謂之溢飲溢即流溢欬逆倚息不得卧肺氣

重謂之溢飲之義也欬逆倚息不得卧肺氣



行其形如腫謂之支飲。如水之有派木之有枝

此分別四飲之病證也。

前言四飲或膈間或腸間或脇下或肢體或胸

中皆不能盡飲之為病也。凡五臟有偏虛之處

則飲乘之可以水飲在心心下悸動有堅築為

歷指其所在水飲在肺吐涎

水制而氣短氣惡水不欲飲水飲在肺吐涎

不伸則短氣惡水不欲飲水飲在肺吐涎

沫吐過多欲飲水飲在脾中氣少氣濕氣

則渴則欲飲水飲在脾中氣少氣濕氣

身重水飲在肝脇下支滿而肝脈上

法肺噓而牽引痛水飲在腎於臍下睡動甚

故肺噓而牽引痛水飲在腎於臍下睡動甚

故肺噓而牽引痛水飲在腎於臍下睡動甚

故肺噓而牽引痛水飲在腎於臍下睡動甚

則心下悸。

此承上四飲而推及五臟。而其義始備也。言臟而不及腑。以腑為陽。在腑則行矣。與水氣篇不同。

然以五臟言之則為在。

夫心下有留飲。

背為胸

以病因言之則為留。

其人背寒冷如掌大。

飲留之處

禹心下溢於胸。

其人背寒冷如掌大。

以飲留於肝。

欬嗽

也。

○留飲者脇下痛引欬益。

而應於肺也。

欬嗽

則輒也。以飲被氣擊。

○胸中有留飲。其人

者飲盛

不伸短氣飲結者津液不輸而口渴四肢歷節痛以痰飲橫

流於肢節也然不與脈沉者責其有留飲

此言飲之留而不去之為病也

魏念庭云背為太陽在易為艮止之象一身

皆動背獨常靜靜處陰邪常客之所以陰寒

自外入多中於背陰寒自内生亦多踞於背

也

飲留而不去謂之留飲隔上之伏飲病時痰滿喘

為 欬

病根已伏其中。一值外邪暴吐露。則邪之外

為

寒熱背痛腰疼。

激出內飲之痰滿。喘欬大作以致。

目泣自出。

其人振振身瞶。

諸劇之因以斷。

必有伏飲。

此言飲之伏而驟發也。俗謂哮喘即是此證。

當表裏並治。如小青龍湯及木防已湯去石

膏加苾硝茯苓為主治。余著有公餘醫錄及

醫學實在易。二書中論之頗詳。茲不再贅。

飲病當求其所因。不必盡由於飲。夫病人飲水。而即飲水可以例其餘也。謂

多。水停胸膈。必暴喘滿。此其易見而易也。推而言之。凡食少。則脾

能制飲多。則水邪又增。蓋水停心下。甚者助背則為

悸。微者防碍氣短氣。若脈雙手弦者。寒氣周也

皆因大下後傷中喜虛。若脈偏於一弦者。飲偏氣

注也。醫者求其病因。當於虛寒二字加意焉。可。

此言飲病之因。指其大畧。以為一隅之舉也。

上言脈弦。弦為陰象。陰則為寒。弦則為減。減則

為虛。不易之理也。然有不可以弦概之者。自當

別。肺飲則不弦。但苦喘短氣。支飲上附於肺。即同肺飲。



故亦喘而不能卧。加短氣。其脈亦平。而不也。余

其所以然之故。蓋以弦者借木之象也。肺屬金

而尅木。故肺之自病不弦。肺之初病亦不弦。病

勢之未甚則然也。

二者自當別論。

此言飲脈之不弦者大抵飲之未甚也。舉此

二者跌出下節溫藥之正治。此作撇筆看。不

然與後第十四條矛盾。

請言其病痰飲者。偏寒偏熱。當以溫藥和之。此

治法。要病痰飲者。皆未中緊。猶未言痰。不

語也。要病痰飲者。皆未中緊。猶未言痰。不

飲

陰邪胃於陽倍

胸脇支滿

陰氣上

目眩

此痰飲病

之的證也上第言以溫藥和之猶未言溫藥之

當用何方也溫能化氣甘能健脾燥能勝濕淡

能利苓桂術甘湯主之此痰飲病之力也

水以苓桂術甘湯主之

此痰飲病之力也

此為痰飲病而出其方也

苓桂術甘湯方

茯苓

桂枝

白朮

各三兩 甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便

則利

和以温藥不獨治疲飲然也即微飲亦然微者

不顯之謂也飲而曰微非氣非水如陰霾四布

阻塞升降之路夫短氣之由皆有微飲法當從

則為短氣謂蓋以膀胱為水府太

小便而去之陽之氣通於天以苓桂术甘湯

主之令膀胱氣化則天高日晶陰腎氣丸是從

求之臟二方亦主之氣順矣若

相為表裏故亦主之

此為短氣有微飲而出利小便二方也喻氏

謂微飲阻碍呼吸而短氣當辨之幾微若呼

之氣短是心肺之陽有碍宜苓桂术甘湯通

其陽陽氣通則膀胱之竅利矣若吸之氣短  
是肝腎之陰有碍宜腎氣丸通其陰陰通則  
小便之關開矣兩方並重與金匱原文意未  
甚深透於此說不可不姑存之為中人以下  
說法

苓桂朮甘湯方

腎氣丸方

見姑人  
雜病

病者脈伏

可知其有  
畱飲矣

其人欲自利利

後則所畱  
之飲從利