

外科全書百效
下冊

新編外科百効全書卷之三

豫章儒醫龔居仁撰

○胸腹部

乳癰



乳癰

乳癰之症有孕曰內次養子者曰外吹廼婦人飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房汁化為濁膿肝經氣滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍

大凡乳上纏寬硬腫作痛宜以葱餅熨之其法用個潤口瓶以炭火八瓶內上以熱灰填滿瓶口用葱葉及葱白搥損令遍覆瓶口用手帕裹瓶倒執將瓶口向腫處任意輕重熨之切莫亂施針刀以傷其房縫或初起隔蒜灸炙猶可

祖傳內吹初起單方鹿角磨酒多服外吹初起單方用百齒霜頭垢爲丸雄黃衣服七丸出汗就愈不出汗再服七丸神効

龔如傳秘方治乳癰用漏芦川山甲金銀花白芷稍連喬貝母未

京赤芍甘草節各等分白水煎數沸方入大黃煎一二沸取起頓服被蓋出汗次日膿血盡從大便出神効不愈再服腦繼內

龔應圖製治乳瘋乳癰神方外用鉄槌散敷內即服防丰連喬

姜蚕陳皮青皮貝母漏芦烏藥薄荷銀花羌活甘草煎湯口如

不消再用土烏藥絞水洗三次果勢甚即服防丰當歸白芷陳

皮青皮貝母姜製漏芦川山甲喇成乳香沒藥人參黃芪肉桂

一惟內吹者不可用桂恐桂動胎也如潰爛外用化毒丹攪後用

白硃砂散或生肌散攤之如有孔久不合口用青黛陳皮各等

分將帛條拌麻油蘸藥未透入如体薄人不出膿必用針刀仍

核久內脹依痛外腫堅硬手不可近謂之乳癰未潰者宜服瓜蒌

湯將遺兩乳間出黑頭瘡預下作黑眼者宜服內托升麻湯已

潰者宜服方括歌內十宣散及髮疽內補中益氣湯之類

○瓜蒌湯 瓜蒌 箇當歸 甘草 絡五乳香 沒藥各一各半

○內托升麻湯 升麻 葛根 連喬 黃芪 當歸 鼠粘子

肉桂 黃栢 甘草 水煎入酒開服

又有鬱怒傷肝脾結核如蟹碁子大不痛不痒五七年後外腫紫

黑內漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用痰核內十六味流

氣飲及單青皮湯兼服如虛者只用潰肝解鬱湯更加清心淨

養庶可苟延歲月以後必于乳下潰一穴出膿

○清肝解毒湯 當歸 川芎 白芍 熟黃 柴胡 白朮

人參 陳皮 炒梔 茯苓 牡丹皮 貝母 水煎服

婦人乳頭裂治宜秋後茄花陰乾清油調敷或秋後茄子裂開者

陰乾燒灰存性爲末水調敷

乳勞癰爛見心者用猫兒腹下毛乾鍋內煨存性爲末干摻或八

輕粉少許清油調搽

乳中瘰癧起痛用川黃連大黃各二兩水煎服

乳痒先以粉草磨水搽後以油醬搽効

乳後乳如石硬不散用陳皮一斤夫自鹽水大半下半斤生薑

共爲丸青黛爲衣每將菱霜花炆水送下三四十九或酒吞

乳中番花石榴發此症治者少不治者多亦宜生肌之藥內吃外

敷而不生肌必死


妄子乳疾治與婦人微異甚怒火房熬過度以致肝虛血燥腎虛

精法不得上行痰瘀凝滯亦能結核大槩男子兩乳腫首尾痰核內十六味流氣飲左乳者足于陰虛鬱怒所致用痰癰內八物湯加山枝牡丹皮或前清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒黑草九胆五分如飲食少進依嘔胸脇作痛眩昏頭痛溺澀者宜大頭腫內六君子湯加芩歸柴胡山梔

如潰爛作痛者宜用痰癰內八物湯加黃芪肉桂腎虛再加故芷如因勞怒則痛併發寒熱者宜用髮疽內補中益氣湯加炒黑山


梔子不可輕用清熱敗毒之劑

臟腑癰疽圖



○每穴內隱亡痛亡爲疽肉上微起者爲癰假如中府隱痛者肺癰也余各穴倣此宜流氣飲或托裏散加當歸山枝黃芩杏仁

井 疽



兩 脇 癰



肺痿肺癰

是症經年久咳熱極葉焦而爲痿猶草木亢甚則枝葉痿落也火燥甚則腐脹爲膿血成癰病因汗吐下後亡津或督虛火炎或厚味燻蒸而成其候惡風咳嗽鼻塞流涕頃強不能轉側皮膚不潤澤胸脇脹滿呼吸不利吐痰血腥穢若要辨真假將黃豆根研水服亡得者真服不得者不是肺癰也

肺痿脉数而寔咳多寒熱自汗宜知母茯苓湯去門冬

○知母茯苓湯 知母 茯苓 黃芩 五味 半夏 柴胡

白朮 人參 桔梗 薄荷 川芎 阿膠 甘草 欒花

如咯血將變癰者紫苑散金銀花

○紫苑散 紫苑 知母 貝母 人參 茯苓 桔梗 五味

阿膠 甘草 生薑煎服 火盛者人參平肺散為丸含化

○人參平肺散 桑皮倍下 人參 知母 地骨皮 五味子

青皮 棘破 茯苓 黃芩 麥門冬 各等分為末密調

喘急而浮鼻塞胸脹及喘不眠者宜用葶藶三兩為末大棗三十

以水三升煮取二升再去棗煎至七合頻服盡三日一劑

或單以葶藶隔紙炒為末水煎服是知肺痿有寒有熱而以清

祖傳腫癰之症始則易治膿成難愈脉微緊而數未成膿也脉緊

而數已成膿也男子以氣為主十救一二女子以血為主十全

百病全書卷之三
四
六七大凡初起口燥咽乾胸脇隱痛咳唾膿血氣息瞿眚治宜
桔梗三甘草一門冬法煎服或加味敗毒散調之

○加味敗毒散 薄荷 瓜蒌 白芷 烏梅 生黃 黃芩

歸尾 半下 桑白皮 茅根 灯心

如有膿腥氣上衝嘔而嗽及吐膿者俱宜消膿飲或用生地黃熟
地黃天門冬生薑密水煎上蒸熟細匕頰服若收口以槿木皮
白欬煎服

○消膿飲 貝母 知母 生薑 阿膠 桑皮 防干 天門

冬 桔梗 薄荷 蘇子 白欬 南星 半下 川芎

射干 杏仁 苈草 白芷 烏梅 姜煎服

如咽痛者韮桔梗湯便秘者前太乙膏為丸白湯下

又有胸脇間開一竅口中所咳膿血與竅相應而出者宜大補氣
血七多者梅豆湯冷熱不調者前雲母膏為丸并桔湯下

豆湯 黑豆 烏梅

如穀水不足虛火上炎咳吐膿血喘而短氣發熱依渴小便不調

治宜參芪補肺湯如皮虛少食加升麻桔梗去山茱如山藥熟地黃

○參芪補肺湯 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮 當歸

山藥 五味 甘草 絡 五 熟地黃 分 五 牡丹皮 姜煎

大槩面赤當補脾腎面白當補肺蓋補脾以生肺金補肝以生腎水也如陰火發熱面赤咳吐膿血痰如糯米粥脉浮大者火剋金也不治如脉浮短滑可治以其有本脉也

心癰

心癰之症生肉乳中間狀如豆大三四日起不早治入于腹十日

死又云外候可治內候傷膜難治

如疔此症小便澀者宜黃芩黃連耳草桔梗白芷天花粉瞿麥淮

通或清心散如大便秘者用前方括歌內固清心散或黃芩黃

連耳草 桔梗 白芷 生地 天花粉 大黃

●清心散 遠志 赤苓 赤芍 生地 麥冬 知母 母草

生薑 棗子 同煎服

如生于胸乳上些有几孔者亦名蜂窠癰發乃心火熱盛治宜急

以疏導心火之藥稍遲則熱極難治

如心頭有孔常出氣水謂之心漏治宜鹿昔去銚附子炮去鹽花

仁爲末連肉二兩搗爲丸空心酒下

予治一人病井疽已潰內服托裏清心之劑外用敷洗燻割生肌

歛口如法治之一月全愈

脇癰

脇癰之症蓋由脇肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥倘誤投熱劑則虛熱愈盛易傷骨膜慎之

初起宜乳瘋內瓜蒌湯或鱉疽內柴胡清肝湯治之唯潰後方

敢清熱托裏兼滋腎水

胃癰

胃癰之症多因飲食七情火鬱復被外感寒氣所隔使濁熱之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脉沉細惟寒氣所隔故人迎緊盛有此二脉者胃癰真也

外症寒熱如瘧胃濁則肺金失養故身皮錯縱或咳或嘔或噎膿血俱宜大射干湯主之

●大射干湯 射干 赤苓 赤芍 白朮 枝子 升麻 用

水煎人蜜生地黃汁間服

如痰壅者并桔湯如大便不利者前太乙膏為丸服

如小便不利者及腹滿不食宜三仁湯

○三仁湯 冬瓜仁 薏以仁 桃仁 牡丹皮 白水煎服

如膿出食少者宜補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可

專治其瘡

腸癰

腸癰之症濕熱鬱積成癰小腹疼痛小便澁似淋大便澁難也若

腹脹大轉側聞有水或達臍生瘡出膿大便屢下膿血者不治

此症脉遲緊若未有膿也用大黃湯下之或用射香乳香下香沉

香木香連喬大黃通草獨活扁竹甘草下之方不可不取以敗毒散加秦芫連喬

●大黃湯 大黃 芒硝 牡丹皮 瓜蒌 桃仁

若脉乳濡者 宜用當歸 川芎 白芍 玄胡索 地黃 桃

仁 紅花 木香

如脉洪數者已有膿也宜前胃癰內三仁湯或乳痲內瓜蒌湯

如脉數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急如腫按之却軟乃內

虛陰冷凝痰成癰宜牡蠣或十宣散之類

●牡丹散 人參 黃芪 天麻 白苓 白芷 川芎 木香

疳當歸 慧以仁 桃仁絡一官桂 甘草 五水煎服

如小腹疼痛小便不利此膿瀰滯也亦宜牡丹散治之

如冷熱相併或痛甚或大便從小便出者俱宜前雲母膏為丸牛

膠煎酒下利去瘀膿則愈

如下膿過多者宜肺癰內傍豆湯加甘草桔梗和之蠟凡丸妙

如虛兒傳治腸癰小腹痛二更難睡者用當歸而甜瓜子合蛇退

條水煎服四五貼○如腸中痛不可忍者用敗醬甜瓜子赤芍

根芒硝大黃水煎服六七貼○如腸癰成膿者用牛黃和血

蛭大黃牙硝牽牛匕旁子故芷共為末溫酒調服以利為度

若膿止後用髮痘內補中益氣湯或疔瘰內八物湯以固本元

愈後却官靜養稍動作燥暴及破驚恐必腸斷而死又云癰生

小腸分尤可治癰生大腸分近肚門者難治肚門破者即死

腹癰

腹癰之症生于肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹痛甚者其也乃膏粱七情火鬱以致皮虛氣滯而成小兒多因驚積腐損而成食積疳氣相類不可誤治

此症慢腫堅硬肉色不變未有膿也宜 人參 白朮 茯苓

川芎 白芷 當歸 枳壳 甘草 或前方括歌內托裏散

如炊腫痛甚者邪氣寔也先用腦疽內活命飲隔蒜炙以殺其毒後用托裏散以補其氣

如腫起而軟色不赤者膿成也宜方括歌內托裏消毒散若膿成而不外潰者氣血虛也針刺之

又云此症不問初起已潰未潰但宜此胃元氣而佐以行經活血若誤用剋伐及利下涼藥則腫不能潰不能斂決難治之若曾經誤下及服降火破氣消癰之藥大劑參芪姜附或疔癰內八物湯加桂芪急救之

臍癰

一人臍腫紅痛久服流氣飲針開口膿出四五箇月不止後用蒜
盛艾炙內服五香連喬湯全愈

○五香連喬湯

丁香

南木香

沉香

乳香

當歸

貝母

連喬

人參

各一

兩

羌活

五分

射香

四分

如臍上生瘡出水不干用枯凡白龍骨煨過為末攪上如神

小兒臍瘡以紅綿燒灰黃土糞燒灰干胭脂各等分溫則攪上干

則香油調搽

小兒臍水不干用鳳凰衣燒灰存性攪之

壯角癰用腦疽內干金托裏散神效

背

腰


部

脾肚發



此名脾肚發生在肩下脊上脾肚之間乃因飲食感毒或廣一尺深一寸雖潰在骨不穿膜不死急治脾胃中之毒內服方括內歆護心散外用敷藥恐毒奔心大要服藥截住如通脊背腫者不治

右脾蓮蓬發



○此名右脾蓮蓬發外如蓮蓬內有子孔失治恐其毒奔人心大要用方括內托裏散加黃芩連栢芽蓋散之不令攻心漸消可治通背腫亦危