

幼

幼

集

成

汪之四
卷二 冊八

鼎錄幼集成卷之四

〇〇 腫滿證治

腫滿證治

治脾以脾
胃為本

脾的病態
原因治

經曰：膚脹者，寒氣客於皮膚之間，腹大身盡腫，皮厚按之突而不起，腹色不變，此其候也。又曰：諸淫腫滿，皆屬於脾。又曰：水病下為跗腫，上為喘呼，不得卧者，標本俱病。夫腫滿之證，悉由脾胃之虛也。脾土喜燥而惡溼，因中風素弱，脾虛無火，故水溼得以乘之，而脾愈不運，則乳食凝而不化，停積於中，而腫滿作焉。治腫者，當以脾胃為本，而以浮腫為標，斯庶幾矣。若以消伐剋削為能事，未有不致危殆者也。治腫當分上下：經曰：面腫者，風足；腫者，溼凡腫，自上而起者，皆因於風，其治在肺，宜發散之。參蘇飲合五皮湯，腫自下而起者，因於腎虛水汎，或因於脾氣受溼，宜滲利之。故仲景云：治溼不利小便，非其治也。宜五苓散加防己、檳榔。身盡腫者，或胎稟不足，卒冒風寒，或因癰痢脾虛，皆能作腫。輕者，胃苓丸重者，加味胃苓丸。當與本條參攷。凡小兒之腫在表者，頭痛身熱，此風寒在表，宜微汗之。五苓散稍加麻黃、葛根、蘇葉、杏仁以發之。若身無熱，五苓散加肉桂、膀胱氣化，小便利而腫消矣。陽水腫，身熱，大便秘，小便赤澀，煩燥口渴，以五皮湯作煎，送沉瀝丹微下之。陰水腫，身不熱，口不渴，身冷發寒，二便自調，平胃散加白茯苓、草朮、香薷香。凡腫證，先起於腹，而散於四肢者，可治。先起四肢，而後歸於腹者，不可治。若小兒元氣本虛，復遇大病之後，而渾身浮腫，四肢冷，不渴，小便清長，大便滑泄，不思飲食，此陰寒之極，脾胃將絕，治腫之方俱不可用。惟以四君子湯加青化桂、炮薑、砂仁、白朮，以救其脾胃，斯可矣。味者但見其腫，不知元氣之竭絕，而猶消導利水，復以舟車、禹功、大戟、芫花、甘遂、劫奪之者，此殺人之一事，慎之戒之。〔入方〕參蘇飲。方見三卷咳嗽門。五苓散。方見二卷傷暑門。五皮湯。方見二卷傷溼門。胃苓丸。方見二卷傷溼門。以加味胃苓丸。即胃苓丸本方加後藥。頭面腫初起，畧加麻黃作喘，加桑白皮、杏仁。

水腫簡便方

小便黃赤加木通身腫加五加皮腹脹加砂仁白蔻丁香枳壳脚冷不溫加附子上桂防已 平胃散 方見三
卷瘧疾門 加味四君子湯 治脾敗胃傷陰寒作腫多服自消 官揀參錢漂白朮錢白雲苓錢上青

桂心黑炮薑錢西砂仁錢白芷錢錢公丁香錢炙甘草錢大棗錢水煎半飯溫服以愈為度

水腫簡便方 凡小兒患腫切忌鹽鹽助水邪服之愈甚必待腫消之後以鹽燉過少少用之 治水腫

從脚起入腹則難治用紅飯豆五升水煮極熟取湯四五升溫浸兩膝之下冷則重煖若已入腹以紅豆

煮湯日日服之亦消蓋紅豆之功專於行溼利小便故也 治脚腫掘杉木根切斷而內色紅者為油杉

方可熏若切開白色者不堪以紅根切碎煎濃湯將脚腫處先熏後洗一二次自消 又方 以紅糟一

大碗加入生薑葱三味同煎其湯先熏後洗 又治頭面手足俱腫用苦苧藤一兩隔紙炒熟碾細末以

大紅棗蒸過去核取肉和前末杵勻為丸如小豆大每服七粒白湯下日三服五七日則小便多腫自消

也忌鹹酸生冷之物傷寒傷溼腫以羌活切片萊服子二味等分同炒香取起揀去萊服不用只以羌活

為末每服一錢初日一服二日二服三日三服效 腫證氣喘男婦大小腫因積得既取積而腫再作小

便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者至此束手蓋中下二焦氣不升降為陰寒否隔水遂凝

而不通用熟附子三錢生薑三錢沉香三分同煎濃湯冷服大人附子一兩生薑六錢沉香磨濃汁以附

子生薑煎湯對服不拘服數以愈為度 身面浮腫坐卧不得取向東桑枝燒灰淋汁煮紅豆數升每飢

即食之不得別飲湯水 水腫本於脾虛不能制水水積妄行而為腫當以參朮補脾為主使脾氣實則

能健運而水自行切不可下

脹滿證治

經曰足太陰虛則鼓脹又曰胃中寒則脹滿又曰濁氣在上則生脹脹 夫脹滿者腹脹氣滿也因於脾

虛脹實

虛實

虛實

治方

解

解

解

解

解

解

肺氣虛不能健運所以作脹也有虛脹寒脹實脹熱脹大抵虛脹冷脹十之八九實脹熱脹十之二三蓋
 實熱之證人所易見或因傷食或因傷寒入裏所以易知而易治虛冷之證由中氣虛衰脾氣不化而脹
 所以難見而難醫若以虛冷之脹而誤以為實熱之脹治之其變不可勝言矣虛脹者或因吐瀉之後
 或因服藥攻下太過致成腹脹者宜溫中調氣厚樸溫中湯若虛而兼寒者加附桂實脹者腹中原有
 食積或飲食過飽固結於中外證則胃口胸前高脹身熱口渴倦臥不語腹痛微喘目閉不開儼然虛
 極之象小兒此證最多而難識昧者不為詳審見其四肢不舉口閉不開誤以為慢驚而用寧神導痰之
 藥子中十死無一活者不知大實有羸然即此是也急宜下之集成沆瀣丹集成三仙丹同服熱脹者或
 傷寒熱邪入裏大便閉結小便短赤渾身壯熱面赤燥煩集成沆瀣丹寒脹者由中氣素寒冷滯鬱結
 無身熱口渴面唇青手中厥冷氣喘腹脹先以壅氣丸消之後以異功散調其脾胃凡遍身瘡疥因淋
 洗塗搽逼毒歸內而腹脹者輕則荊防敗毒散升散之重則集成沆瀣丹微利之瘡出脹消者吉瘡不出
 者凶經謂臟寒生脹滿者蓋脾為陰中之至陰因脾溼有餘無陽不能施化如土之久於雨水則為泥
 矣豈能生育萬物必待和風暖日溼去陽生自然生長也凡此宜以辛熱之藥運用之可也經謂下之
 則脹已此以溼熱飲食有餘脾胃素實形體氣質壯實者言之也若脾虛內寒而氣不能運精微以成脹
 滿者只宜以甘溫補脾為主少佐辛熱以行壅滯之氣庶使脾土健旺脹滿運行斯可愈矣此經之所謂
 塞因塞用從治之法耳醫者不察乎此惟執下之脹已急於獲效病者喜行利藥以求通快不知暫快一
 時則真氣愈傷脹滿愈甚去死不遠矣諸家治脹治腫俱知行氣利水剋削並行輟用猛劑下之此速
 死之道不知脾氣虛極而腫而脹愈下愈虛惟徒目前之快而陰損真元禍不旋踵後賢幸加意焉入
 方 厚樸溫中湯 治胃寒心腹脹 紫厚樸一錢 真廣皮一錢 黑薑炭一錢 白雲苓一錢 草蔻仁一錢 南木香五分

炙甘草 伍虛寒者加熟附子 伍青化桂 伍生薑三片 塌氣丸 治寒氣鬱結 肚腹虛脹 胡椒仁兩

全蝎尾五錢 洗淨沙乾 右以胡椒畧去皮取淨一兩炒過和蝎尾碾末麪糊丸極小每服一二錢陳皮湯送

下 集成沉瀝丹 方見二卷胎疾門 集成三仙丹 方見二卷類指門 異功散 方見二卷傷食

門 防敗毒散 治瘡疥毒氣內陷肚腹作腫 荊芥穗 北防風 淨連翹 陳枳壳 綠升麻

南薄荷 川羌活 川獨活 粉乾葛 川木通 金銀花 淡黃芩 正川芎 黑梔仁 炙甘草 比

晦味 銘上 身腫加葱三莖下 身腫加燈草十莖 清水煎服

腹脹簡便方 治氣脹水脹用雄雞糞乾者一升炒焦黃色出火毒研細末以百沸湯三升淋汁每服一

盞調木香檳榔末各五分此中滿蠱毒脹有一無二之方也 治食脹氣脹用蘿蔔子一兩研細末水調

滷汁用砂仁一兩以蘿蔔子浸汁一宿炒乾又浸又炒共七次為末每服一錢米飲湯調下

〇〇黃痺證治

經曰身痛而色微黃齒垢黃耳目上黃黃痺也又溺黃赤安臥者曰黃痺已食如饑者胃痺夫黃痺之

證古人多言為溼熱及有五痺之分皆未足以盡之予謂黃之大要亦惟有二曰陽黃曰陰黃而寒熱虛

實總括二者之中無餘義矣 一陽黃證因溼多成熱熱則生黃此其所謂溼熱證也其證必身熱煩渴

或燥擾不寧或消穀善饑或小便熱痛或大便秘結其脈實而有力此證不拘外感風溼內傷飲食皆能

致之但察兒之元氣尚強脾胃無損而濕熱果盛者則宜清火邪利小便茵陳五苓散最穩胃苓湯加茵

陳亦佳若大便秘結熱甚者集成沉瀝丹 一陰黃證全非溼熱總由氣血之敗蓋氣不生血所以血敗

血不華色所以色敗凡病黃而絕無陽證陽脈者便是陰黃或因大病之後或脾胃久虧故脾土之色自

現於外其證喜靜惡動喜暗畏明神思困倦言語輕微畏寒少食四肢無力或大便秘實小便如膏此皆

腹脹而

黃痺

黃痺

胃痺

易量

利

治黃

按
方

治
方

陽虛之候與溼熱發黃者反如米炭使非速救元氣大補脾胃終無復元之理且此證最多而味者不察遂云黃蘗同是溼熱而用茵陳梔子曰清火利水則無有不隨藥而斃者即四君子湯煎溫胃飲是其宜也

凡小兒脾胃素弱常有積滯面色多帶黃白不可消積惟以集成肥兒丸多服使脾胃健食自消灌漑臟腑流行榮衛自然五色修明何黃之有小兒黃病味者一概呼為溼熱無非除濕利水清熱退黃除此

之外無別法矣豈知濕熱發黃者少脾虛發黃者多蓋脾土強者足以捍禦溼熱必不生黃惟其脾虛不運所以溼熱乘之治此者無非暫去濕熱茵陳五苓散亦佳黃稍退即速健脾不得屢用消耗而謂有是

病用是藥也若面目俱黃而帶虛浮唇白舌淡口不渴身不熱夜無煩熱小便不澀不可認為溼熱而分利之速救脾胃四君子湯六君子湯是其宜也凡服分利之藥黃久不退以致口淡心慌四肢軟弱憎寒

發熱小便帶濁皆為虛甚宜四君子煎送八味地黃丸不可再行分利以致脾敗腎絕而死矣一入方一茵陳五苓散方見二卷傷溼門四胃苓湯加茵陳方見二卷傷溼門此加茵陳一錢集成沆瀣丹

方見一卷胎疾門四君子湯方見三卷瘧疾門五君煎治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼溼者官揀參錢漂白木錢白雲苓錢薑炭錢炙甘草錢用水一鐘半煎服溫胃飲治中寒嘔吐吞酸泄瀉

揀參錢漂白木錢白雲苓錢薑炭錢炙甘草錢用水一鐘半煎服溫胃飲治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食官揀參錢漂白木錢白扁豆錢廣陳皮錢炮薑炭錢大當歸錢炙甘草錢用水一鐘煎七分

服集成肥兒丸治小兒脾胃虛弱飲食不消肌膚瘦削多服能令兒肥此丸久經效驗比諸家肥兒丸功獨甚蓮肉二兩四錢去心皮炒西砂仁六錢漂白木一兩官揀參一錢炮薑炭錢京查肉四錢杭白芍酒炒廣陳皮

酒洗法半夏四錢白雲苓一兩乳真雅連一錢炙甘草二錢共為細末煉蜜為丸如彈子大每日早午晚各服一丸米飲湯化下六君子湯方見二卷類搖門八味地黃丸方見

一卷保產門

黃瘰癧間
便方

腸痛

凡腹痛

者有上中下三焦之分

寒熱虛實

冷痛

熱痛

食積痛

蟲痛

當歸散

燒脾散

黃瘰癧間便方 小兒急黃以綠瓜連皮帶子火燒存性研末每服一錢米湯下連進數服愈 小兒黃如金色因積滯凝於脾家以糯稻草煎濃湯飲之數次效 治小兒黃瘰癧如金取山間薏苡仁根洗極淨煎湯服之自愈 治溼熱發黃用生薑半觔茵陳半觔同搗爛以布包之時時周身擦之其黃自退

腹痛證治

帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛 凡病心腹痛者有上中下三焦之別上焦者痛在膈上此即胃脘痛也中焦者在中脘脾胃間病也下焦痛者在臍下肝腎病也然有虛實之分不可不辨辨之法但察其可按者為虛拒按者為實久病者多虛暴病者多實得食稍減者為虛脹滿畏食者為實痛而輕緩莫得其處者為虛痛劇而堅定不移者為實虛實既確丹治有準則矣 夫腹痛之證因邪正交攻與臟氣相較而作也有冷有熱有蟲痛有食積辨證無訛而施治必效 挾冷痛者面色或青或白冷甚者面色開淡唇口爪甲皆青此脾氣虛寒之極輕者當歸散重則燒脾散有吐瀉者保童丸 挾熱痛者面赤壯熱四肢煩燥手足心熱宜四順清涼散加青皮枳殼大便秘者木香枳榔丸大便調者芍藥甘草湯 食積痛者口中氣溫面黃唇白目無精光或白睛多眠惡食大便酸臭宜三棱丸甚者消積丸下之後用六君子湯調之 蟲痛者而面白唇紅六脈洪大心腹疼痛口中涎沫及清水出腹內結聚成團摸之梗起一條小兒脾胃虛寒者極多此證宜烏梅丸 腹痛喜手按及熱熨者為虛為寒速宜溫補如手不可按者為實速宜下之 〔天方〕 當歸散 治腹痛有寒無熱 大當歸一錢 南木香一錢 青化桂一錢 大

揀參一錢 炙甘草一錢 生薑三錢 大棗三枚 水煎溫服 燒脾散 治傷生冷菓菜停積中焦心脾冷痛 黑炮薑一錢 紫厚樸一錢 草薢一錢 苡仁一錢 西砂仁一錢 六神麴一錢 老麥芽一錢 真廣皮一錢 高良薑一錢 炙甘草一錢 或丸或散或水

煎俱可 保童丸因傷風冷食積肚疼泄瀉嘔惡吐 官揀參_{切片} 漂白木_{壯紫厚樸} 正廣皮_{炒酒} 白雲

苓_{乳汁} 結猪苓_乾 宣澤瀉_炒 藿香葉_焙 公丁香_{搗法} 半夏_焙 青化桂_粗 白乾薑_炒 白寇仁_焙 杭青皮_炒

肉苳寇_煨 南木香_屑 炙甘草_{各等} 共焙燥為細末神麴糊為丸如彈子大每服一丸米飲化下 四順清

涼散 治扶熱腹痛面赤壯熱四肢煩燥手足心熱用 杭白芍_{錢一} 白當歸_{錢一} 錦莊黃_{錢一} 炙甘草_{錢一} 研清水

煎滾熱服 芍藥甘草散 此方無論寒熱虛實一切腹痛服之神效 白芍藥_{三錢} 粉甘草_{二錢}

右二味俱要整的用紙七重包之水淫慢火煨熟取起杵爛煎湯服寒_用略加肉桂數分更妙 三稜

丸 治食積胃脘痛心腹痛小腹痛癖痛蟲痛 京三稜_煨 蓬莪朮_煨 半夏_夏 麴_焙 小枳實_煨 正川連_燼 吳

茱萸泡正廣皮_炒 杭青皮_炒 南木香_屑 尖檳榔_炒 川厚樸_燼 川練肉_炒 小茴香_炒 共為細末神麴糊為丸

量兒大小加減米飲調服 木香檳榔丸 方見三卷食積門 烏梅丸 治胃冷蟲痛攻心嘔吐四肢

冷用 官揀參_{錢六} 川黃柏_{錢六} 北細辛_{錢六} 青化桂_{錢六} 川熟附_{錢六} 川黃連_{錢五} 正花椒_{錢四} 大當歸_{錢四} 黑薑炭_{錢四} 肥

烏枚_{三十個蒸去核} 共為細末酒蒸烏梅肉搗膏和藥少加煉蜜為丸如芡實大每服一丸水送每日二

三服以十分之一水煎服亦可 腹痛簡便方 治一切胃痛胸痛腹痛腰痛疼如錐刺不可忍者花椒不拘多少研為細末和少麴粉醋

和成餅貼於痛處上鋪艾絨用火灸之其疼立止 一切腹痛不問虛實寒熱皆效用小麥桿燒灰地上

出火毒將布包之滾水淋汁一服立止 一切疼痛或寒或熱或積食或積血證莫能辨藥不能施有起

死回生之妙用生薑一觔搗爛罌擠去汁入鍋內炒熱用布分作二色先以一色慰痛處冷即換熱者勿

令間斷如薑已乾畧加煎汁拌之又炒又熨痛止乃已 凡小兒肚痛摸其肚有一塊硬起者蟲痛也不

須服藥惟令大人以手擦揉其塊處久久搓之半日許其蟲將死皆從大便而出其病立止 小兒腹痛

蟲痛治 通因方 俗方 烏梅丸 三稜丸 實實丸 散實丸 多苦甘豆 順清涼散

胎寒腹痛

盤腸氣痛

出痛但痢

盤腸腹痛

瘕積

公集

(瘕積證治)

啼哭不止用南木香明乳香黑沒藥俱去油各五分水煎溫服。小兒胎寒腹痛啼哭吐乳大便青色身出冷汗用薑黃一錢南木香乳香沒藥俱去油各三錢共為細末密丸如芡實大每服一丸薑湯調下。

小兒盤腸氣痛月內之兒多有之其證腹內如蛙聲啼哭不止者是也。蓋寒熱不和臟氣不行用梔仁五錢附子三錢同炒極枯取起揀去附子不用單取梔仁加入白芷一錢為末每服五分小茴香湯下。

小兒腹痛啼哭不止用乳香一錢去油燈花七枚同為末每服二分乳汁調服。小兒腹痛一痛即死者名為蟲痛似痢用乾漆燒灰同蕪荑二味等分為末每服五分米飲湯調下。證重者每服一錢。小兒蟲痛口流涎沫使君子取肉微炒為末五更時米飲調下。小兒盤腸腹痛濃煎蔥湯澆洗兜腹仍以葱搗爛炒熱作餅貼臍上良久屎出痛止。

瘕積證治

五

經曰新積痛可移者易已積不痛難已也。又曰胃之大絡名曰虛裡貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脈宗氣也結而橫有積矣。凡飲食之積其漸積者不過以飲食偶傷必在腸胃之內故可行可逐治無難也。惟飲食無節以漸留滯者多成瘕積於左脇膈膜之間此陽明宗氣所出之道也。若饑飽無論飲食壅進以致陽明胃氣一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故餘滯未消併腸外汁沫博聚不散漸成癥結矣。然其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而藥餌難及。今西北小兒多有此疾而尤於食麪之鄉為最。正以麪性多滯而留積於皮裏膜外所以不易治也。惟當以漸消磨求法治之幸毋孟浪欲速妄行攻擊徒致胃氣受傷而積仍未去以速其危也。瘕者血膜化水則癥脇傍時時作痛時發潮熱或寒熱往來似瘧故瘕家多有此證。凡瘕疾發過之後必令其熱退極盡方可飲食。若熱未盡而飲食之則中腕多蓄黃水日久而成瘕積。小兒臟腑和平脾胃壯實則榮衛宣暢津液流通縱使多飲水漿不

二癰核同
何方

能為病惟脾胃不勝乳哺失調三焦不運水飲停滯冷氣搏之結聚而成癖也體素弱者消癖丸氣壯實者赭石揆癖丸大約有癖之兒虛者居多攻下之藥非可常用即不得已而用之待其略減用消癖丸緩緩消之至為良法

入方

消癖丸

治癖在脇下面黃肌瘦午後發熱似瘧用官揀參切片漂白木

正廣皮炒酒白雲苓蒸乳杭青皮炒醋川厚樸鹽小枳實炒酒法半夏炒焙西砂仁炒酒六神翅炒陳麥芽炒各上十

錢二九助驚錢三京三稜錢一蓬莪朮錢一南木香錢一青化桂錢二炮黑薑錢一正雅連錢二共為細末早米

粉糊為丸每服一二錢量兒大小加減米飲下以癖消藥止赭石揆癖丸治腹中癖塊或生寒熱或

時作痛小兒壯實飲食素強者方宜用之脾胃素虛者切不可服惟以前消癖丸攻補兼施久之自愈用

代赭石研末水飛過用杭青皮炒醋蓬莪朮炒南木香銼屑青化桂各三錢巴豆霜去油極淨川大黃錢二右為細

末醋煮麪糊為丸羅蔔子大每服五丸淡薑湯送下

癖積簡便方治癖積心腹內結如拳及臍腹痛不可忍用莊黃一兩酒蒸炮薑五錢熟附子三錢九助

驚甲八錢用好醋將驚甲煮一時久取起酥炙黃色為度共為細末用三年陳老米醋一升熬至半升和

前末為丸菜豆大每服十九空心米湯下取下積如魚腦敗血爛肉青泥即愈後用補脾調理按此方

藥廉功大比揆癖丸力勝十倍尤稱神妙小兒好食茶葉成癖用鮮櫃子一觔空心晒午黃昏每服十

四粒喫完即愈櫃子京果鋪有賣小兒食積結痞塊用大紅棗一觔皮硝一兩同煮以水乾為度晒乾

每日食此棗徐徐服之自消小兒積久而成驚腹內有形搖頭掉尾大者如杯小者如錢上侵入喉下

蝕人肛或附脇脊或隱腸腹用生硫黃研細末每日老酒調服一錢空心下久服自化硫黃須色如初出

驚者方可用帶青帶赤帶黑色者皆不堪用此物最平穩仕多服無礙

蟲痛證治

力力集
卷四
中四
治

苦練根
皮
每
信
母

諸汗證治

公

諸汗證治

經曰腸中有蟲瘕蛟蚘皆不可取以小鍼。又曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則涎出。夫蟲痛者蛇蟲也。蓋由小兒脾胃虛弱多食甘肥生冷留而為積積化為蟲動則腹痛發則腫聚一塊痛有來去乍作乍止嘔惡吐涎口出清水久而不治其蟲長至一尺則貫胃傷心殺人矣。外證面白唇紅六脈洪大是其候也。凡腹內有蟲必口饒好甜好喜食泥土茶葉火炭之類宜攻去之用檳榔丸。小兒蟲痛凡脾胃怯弱者多有此證其攻蟲取積之法却又未可常用及取蟲之後速宜調補脾胃或集成肥兒丸或烏梅丸或六君子湯多服之以杜蟲之復生。

〔入方〕 檳榔丸 治小兒一切蟲積能殺諸蟲。小檳榔一兩木香五錢五寶五錢貫仲五錢廣錫五錢陳漆五錢渣五錢正輕粉五錢白雷丸五錢巴豆霜五錢以漆渣五錢同眾藥研為細末醋煮麪糊為丸麻子大每服二十九五更時苦練根皮煎湯下。集成肥兒丸方見四卷黃輝門。烏梅丸方見四卷腹痛門。六君子湯方見二卷類摘門。

下蟲簡便方 凡小兒甘肥過度或糖食甜物太多乃致溼熱久停而成積積久生蟲時發腹痛以手摸之腹內有一塊或一條梗起外證面白唇紅六脈浮洪其痛時作時止痛止即能飲食者蟲瘕無疑。又有腹痛一痛即死者亦是蟲證欲去此蟲無如苦練根皮誠天下打蟲第一神方其法於月神句蟲頭向上之時行之先夜掘苦練根須取每年結子者方是母樹其根浮於土面者有毒不可用專取土中者淨洗泥土以刀刮其紅皮止取白皮四五錢兒大者六七錢切碎聽用次早以油煎雞蛋令兒喫之以引其蟲頭向上而求食另於別室以水一盞濃煎苦練皮湯一小杯不可使見聞其藥氣一聞其氣蟲即潛伏矣。俟藥熟以雞蛋與兒食即服藥半日不可飲食俟蟲下後方飲食之服藥後兒似困頓萬萬放心蟲下後精神如舊仍當急為健脾庶蟲不復生永無患矣。

諸汗證治

新汗團

多陽

病後自汗

黃耆固真湯

黃散

中汗自汗

多陽

以一方

團參湯

黃耆固真湯

黃散

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

汗証簡便

經曰陽之汗以天地之雨名之又曰陽加於陰謂之汗又曰心為汗夫心之所藏在內者為血在外者為汗蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心腎兩虛而得之者然陰虛陽必湊之故發熱而自汗陽虛陰必湊之故發厥而自汗是陰陽偏勝所致也小兒臟腑嬌嫩膚腠未密或重衣厚被致內臟生熱熱搏於心故心液不能自藏而額汗出也額為心之位宜收斂心氣團參湯大病後氣血兩虛津液自汗或潮熱或寒熱發過之後身涼自汗日久令人黃瘦失治則變蒸痘宜黃耆固真湯睡中汗出醒來則止此心虛盜汗宜和心氣養心血用團參湯睡中過身有汗覺來久不乾者此食積盜汗脾冷所致益黃散脾虛泄瀉自汗後而遍身冷有時遇瀉則無汗不瀉則有汗此為大虛之候急當補脾理中湯待瀉止黃耆固真湯凡自汗上至胸下至臍此胃虛也當補胃四君子湯加黃耆肺虛自汗面白唇白六脈無力蓋因久咳嗽脾虛故令自汗四君子湯加麥冬五味傷風自汗宜實表桂枝湯傷寒汗出自頭至頸面不止者欲發黃也茵陳湯如有實熱在內煩燥汗出不止者胃實也宜集成沆瀣丹微下之

諸汗服藥不止者用五倍子一個研細末醋和作一小餅貼肚臍以帶紫之效

氣固心血能止汗官揀參三錢當歸身二錢右二味分作二服用臍猪心一個切作二片用前藥二錢猪心一片水一鐘煎湯空心服之黃耆固真湯治氣虛自汗嫩黃耆錢官揀參錢白朮錢當歸錢身錢炙甘草錢天圓肉錢杞水煎服益黃散治食積盜汗正廣皮錢杭青皮錢柯子肉錢粉甘草錢公丁香錢共為末大兒二錢小者一錢如感冒吐瀉加薑棗同煎服之理中湯方見二卷乳子傷寒

門四君子湯方見三卷瘧疾門桂枝湯方見二卷小兒傷寒門茵陳蒿湯治頭汗至頸而還將欲發黃茵陳蒿五錢川黃柏錢黑梔仁錢燈心十莖水煎滾熱服

汗証簡便方凡男婦小兒及產母一切虛證偶然大汗諸藥莫能止者蓋由玄府大開一時難閉所以

力力集

汗証簡便

服藥不能止先將五倍子末醋調作小餅子納入臍中以布紮之然後以舊蒲扇燒灰多加糯米粉和勻以夏布袋裝之自頭至尾遍身輕撲之使其粉入毛竅玄府自閉虛汗即止神治也

疝氣證治

經云邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛又曰病在小腹痛不得大小便病名曰疝得之寒故疝氣者寒邪結聚而成也內則臍腹絞痛外則卵丸腫大專屬肝經與腎無涉蓋肝主怒小兒性急多哭而得之者此氣動於內謂之氣疝應行氣開鬱初宜柴苓湯升散之次宜加減二陳湯或木香內消丸如因久坐溼地得之者此冷氣入腹謂之寒疝宜溫中散寒加減當歸散柴芩內消丸有腫而不痛由中溼所致卵雖腫而無熱復不痛宜行溼消腫加減守病丸小兒素有疝氣或一年半年發者發則有形外連睪丸內貫小腹腫硬一條如小杵約長五六寸大小便不通當歸木香湯小兒外腎腫大不通連年

不消者不早治便為終身痼疾宜柴芩內消丸加牽牛子半生半炒取頭末用更灸臍傍章門穴大效取穴法以本兒手掌第五指本節橫終對臍中心其中指頭盡處是穴小兒溼地上坐或有蚯蚓吹其卵腫大而垂者以鹽湯浸洗之蓋鹽能殺蚯蚓毒也或以蒼朮煎湯加鹽少許洗之即效小兒陰囊生瘡潰爛者謂

之脫囊用紫蘇葉研末敷之以荷葉包之或用生荷葉火烘令軟包之雖囊丸露出亦可治也小兒外腎腫臭時復溼養柴胡龍胆湯瘡甚不可止者胡椒煎湯洗之

腎臟用入方柴苓湯治少陽膽經有邪而病疝用官揀參錢一北柴胡五錢枯黃芩錢一法半夏錢一漂白朮錢一白雲苓錢一結猪苓錢一宣澤瀉錢一青化桂

五炙甘草五錢生薑片大棗枚水煎熱服加味二陳湯治性急多哭卵腫痛連小腹謂之氣疝用正

廣皮錢法半夏錢一白雲苓錢一茵香錢一正川芎錢一青化桂五炙甘草五錢生薑片三水煎熱服木香內消丸

治證如前南木香屑京三稜煨結猪苓焙宣澤瀉炒川練肉炒正廣皮酒炒香附米酒炒已上青皮二錢

心氣痛
停方

共為細末酒煮米糊為丸每服一二錢空心鹽湯下 加味當歸散 治受寒溼之氣小腹絞痛外腎紅

腫並腹痛啼哭等證用 當歸身一錢五分吳茱萸一錢青化桂五錢正川芎五錢黑薑一錢南木香一錢小茴香一錢

甘草一錢水煎臨服加鹽一錢空心溫服 茱萸內消丸 治寒溼所襲留伏作痛癰疽偏墜用 吳茱萸一錢

乾一錢炒過一錢大茴香一錢鹽一錢青化桂一錢法一錢淨棗仁一錢核一錢元胡索一錢炒一錢杭青皮一錢炒一錢化橘紅一錢炒一錢各一錢光桃仁一錢五錢白蒺藜一錢炒一錢南木

香一錢各一錢錢共為細末酒煮麪糊為丸龍眼大每服一九淡鹽湯送下 加減守病丸 治卵腫不痛此溼

氣也又名木腎用 漂蒼木一錢鹽一錢製南星一錢炒一錢香白芷一錢各一錢兩山查肉一錢炒一錢正川芎一錢炒一錢廣橘核一錢炒一錢法半夏一錢焙一錢六神

麪一錢炒一錢吳茱萸一錢炒一錢已上一錢各一錢共為細末酒煮麪糊為丸龍眼核大每服一九小茴香煎湯化下 當歸木香湯

治小兒久疳不愈用 京橘核一錢全當歸一錢正川芎一錢川木通一錢小茴香一錢川練肉一錢杭青皮一錢結猪苓

錢宣澤瀉一錢南木香一錢黑梔仁一錢右用淨水濃煎空心溫服 龍膽湯 治小兒外腎臊臭時復溼養用

北柴胡一錢宣澤瀉一錢車前子一錢川木通一錢懷生地一錢當歸尾一錢龍膽草一錢水煎空心服以飲食壓之

疳氣簡便方 治小兒疳氣腫痛用荔枝核炒焦五錢大茴香酒炒二錢五分共為細末每服一錢溫酒

調下 又方 不論小兒及男婦一切疳氣以及諸般氣痛用荔枝核四十九箇炒焦留白陳皮九錢生

硫黃一錢共為末鹽水打麵糊為丸菜豆大遇痛時空心酒研送九丸良久再進一服不過三服全安

小兒腎腫硬痛椒欖核荔枝核山楂核三件等分俱燒過存性研末每服一錢空心小茴香湯送下 小

兒疳氣痛全蝎不拘多少炒焦為末每三分小茴香煎酒送下 小兒冷疳作痛陰囊浮腫用川練子去

核五錢吳茱萸二錢五分炒研為末酒打麪糊為丸小豈大每服十丸鹽湯化下 小兒疳久陰囊堅硬

如石名為木腎用瓜蔓連皮帶子二錢華撥二錢生薑二錢葱白二錢酒煎熱服被覆煖卧取汗出效

啼哭證治

力力集

卷四

啼哭證治

七

啼哭

肝

心

導赤散

心

導赤散

心

導赤散

心

導赤散

心

導赤散

心

導赤散

心

導赤散

心

小兒初生百日一周之內神安意靜不妄哭多哭者易養如日夜啼哭不止為母者心誠求之渴則飲之

饑則哺之痛則摩之養則扒之其哭止者中其意也如哭不止當以意度之蓋小兒初生性多執拗凡有

親狎之人玩弄之物一時不見其心不悅而哭謂之拘哭急與之勿使怒傷肝氣致病也假如又不止請

醫視之如大哭晝夜不止者肝熱也瀉青丸如日夜啼哭身熱煩燥者心熱也導赤散俱用燈心湯服

入方瀉青丸此肝經之主藥凡幼科中截風定搐之方多用金石腦麝無益有損惟此方清心平肝

疏風涼血凡小兒作熱不退將成風搐或已成風搐但服此丸其應如响方雖古方人不知用予昔遊潭

州遇師指授始能用之凡幼科中抱龍保命至寶新安金藥蘇合香丸一概不取惟此丸為幼科截風定

搐之第一神方也用 川羌活兩正川芎兩黑梔仁兩龍膽草兩全當歸兩北防風兩錦莊黃錢五右藥合

為一處以火烘燥研為細末煉蜜為丸青黛為衣如大豆大每服一二丸清茶化下 導赤散 治心經

有熱一切煩啼不安皆效 用 川木通錢五淮生地錢二枯黃芩錢生粉草錢鈺淡竹葉片十四燈心十根溫水煎服

夜啼證治

小兒夜啼有數證有臟寒有心熱有神不安有拘哭此中寒熱不同切宜詳辨 臟寒者陰盛於夜至夜

則陰極發燥寒甚腹痛以手按其腹則啼止起手又啼外證面青手冷口不吮乳夜啼不止加減當歸散

心熱煩啼者面紅舌赤或舌胎白濇無燈則啼稍息見燈則啼愈甚宜導赤散加麥冬燈心甚則加川

連龍胆草 神不安而啼者睡中驚悸抱母大哭面色紫黑蓋神虛驚悸宜安神丸定其心志有吐瀉後

及大病後啼亦由心血不足治同上 凡夜啼見燈即止者此為點燈習慣乃為拘哭實非病也夜間切

勿燃燈狂彼啼哭二三夜自定 入方 當歸散 方見四卷疳證門 導赤散 方見四卷啼哭門 十味安神丸 治神虛驚悸至夜則啼用 官揀參錢白茯苓錢大杭冬錢淮山藥錢正龍齒錢二鏡面

夜啼簡便方

砂飛寒水石飛粉甘草肥五分梅花片一分赤金箔一分共為細末煉蜜為丸艾實大每服一丸燈心湯下

夜啼簡便方 小兒心熱面赤夜多啼泣硃砂五分牛黃一分共為末每一二分犀角磨湯調下 又治

同前證夜啼青黛研篩過每服二分燈心十根煎湯調服 小兒一百二十日內夜啼用蟬脫四十九箇

去前半截用後半截焙乾燥研末每服四分鈎藤湯下 又方 用蟬脫十四箇去翅足焙乾入硃砂一

分共研末蜜調塗母乳頭上令兒吮之納兒口中亦可 小兒夜啼不論有餘不足皆有效用五倍子研

末口中津唾和作餅子納肚臍以帶紫之效 又方 以灶心土研末二錢硃砂飛過一錢麝香少許共

為末蜜丸萊豆大每服五丸水調下

二便證治

經曰北方黑氣入通於腎開竅於二陰 夫二陰者前陰竅出小便後陰竅出大便又云前陰主氣後陰

主血蓋膀胱之津液血所化也由氣而後能出太陰之傳送氣之運也由血而後能潤此便溺之流通見

氣血之依附而人之所以為生者以其有此出入關竅耳清陽出上竅謂呼吸也濁陰出下竅謂大小二

便也倘一息不運則機械窮而死矣故二便不通加以腹脹氣喘嘔惡煩燥者不可治也凡二便秘宜八

正散外用臍法蜜導法則前後俱通矣 〔入方〕 八正散 治熱聚下焦二便不通用 淮木通 白

滑石 黑梔仁 車前子 瞿麥穗 錦莊黃 白芒硝俱得加減之除大黃芒硝在外將六味水煎極

熱加入大黃再煎十數沸取起斟出澄清以芒硝冲服臍法 治中下二焦積熱大小便秘用 連鬚

蔥七莖不洗生姜三大塊淡豆豉三錢食鹽三錢同搗爛作一餅錠子烘熱掩肚臍以帛紮之良久氣通

二便自利 蜜導法 治二便不通以此通其大便則下焦氣行而小便自通矣用冬蜜八兩煉至滴水

成珠不散入皂角研細末二錢和勻稍冷捏如小指大一條外以蔥延塗上輕輕放入穀道中氣通則便

二便證治

利矣

二便不通簡便方

大小便不通經二三日危急者以皂角燒灰研末米湯調下一錢立通 又方以

蜂蜜一盞皮硝一錢白湯一盞空心調下另以皂角於桶內燒煙令兒坐桶上熏之即通 又方用草

烏一個削去皮略以麝香捺上抹以香油輕挿穀道內名霹靂箭至捷 二便不通百方不效肚脹痛咽

喉窒塞或痰壅氣喘水米不下死在須臾宜急救之用甘遂五分麪包煨熟取出為末入麝香三厘搗飯

為丸小兒服二分大人五分湯送下 又方以竹筒抹以葱涎插入穀道以芒硝五錢研和香油半盞

皂角末少許令人口含灌入穀道中少時即通

小便不利證治

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又曰膀胱不利為癰不約為遺溺又曰肝有熱則小便

先赤凡小便赤濇為熱小便白遺為寒熱者火有餘水不足治宜瀉心火滋腎水加味導赤散寒者火

不足水有餘治宜溫腎水益心火益智散 小便不通乃由臟氣虛受熱壅滯宣化不行非塞非痛但閉

而不通腹脹緊滿宜五苓散如車前燈心 大病之後氣虛津液不足而小便閉者不可利之利則中氣

日虛津液愈涸宜人參散 小兒患淋小便淋瀝作痛不必分五種然皆屬於火熱宜清利之海金沙散

小兒久病氣虛而淋病者不可利小便宜六味地黃丸滋其化源 小便自出而不禁者謂之遺尿睡中

自出者謂之尿牀此皆腎與膀胱虛寒也益智散加附桂龍骨 小兒初便黃赤落地良久凝如白膏者

謂之尿白傷脾所致久而成疳胃苓丸鹽湯下 小兒小便出時色白渾濁隨尿而來謂之白濁此心經

虛熱宜清心蓮子飲 〔方〕加味導赤散 治心熱肝熱小便赤溢用 淮木通 懷生地 炙甘草

枯黃苓 黑梔仁 宣澤瀉 北柴胡 以上各一錢淡竹葉七燈心十根水煎空心熱服 益智散 治水有