


乡镇执业医师(临床类)

考前冲刺必做

主编 王丹



人民军医出版社

乡镇执业助理医师（临床类）

XIANGZHEN ZHIYE ZHULI YISHI (LINCHUANGLEI)

考前冲刺必做

KAQIAN CHONGCI BIZUO

主 编 王 丹

副主编 蒋 京 江 璇 孙洪军 高雅芬

编 者 (以姓氏笔画为序)

丁 立	江 璇	李 明	李兆生	何子骏
何艳新	陆 慧	陆轶凡	陈 巧	陈思凡
范红雨	范俊平	胡向欣	柯明辉	柏宏军
段婉茹	侯亚男	骆 毅	耿东伟	高 昕
孙洪军	高雅芬	郭 勇	黄 帅	黄丽臻
曹 剑	龚雪霄	崔立华	梁志明	董 静
董茜茜	蒋 京	戴惠祥		



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的 7 月举行，医学综合笔试于 9 月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有 A1、A2、A3、A4、B1 五种题型。助理医师适当减少或不采用 A3 型题。医师资格考试总题量为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了潜心分析和研究，严格按照考试大纲的要求，出版了国家执业医师资格考试（含部队）推荐系列辅导用书，包含了《历年考点精编》《应试宝典》《同步精选题库》《模拟试卷（解析）》《考前冲刺必做》和《专家命题预测试卷》等系列，覆盖了除民族医、公共卫生以外的四大类八个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试（含部队）的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列，是在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述串讲考试命题点，重点、易考点一目了然。

《应试宝典》系列，编写紧扣考试大纲，在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点。内容的编写既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点。

《同步精选题库》系列遵循科学、客观、严谨的命题要求，依据大纲精神精心命题，在全面分析历年考点试题的基础上，按大纲顺序精选试题，题型全面，题量丰富，具有很高的考试指导价值，通过考题同步练习的方式掌握考试要求的易考知识点，准确把握考试的命题方向。考生可以通过同步练习，透彻理解考试重点，举一反三。

《模拟试卷（解析）》系列，每个考试专业有 3~5 套卷。这个系列的突出特点，是试题质量高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考

试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列，每个考试专业有 3~4 套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

《专家命题预测试卷》系列，包含临床和口腔两个考试大类四个考试专业。每个考试专业有 3 套卷。总结历年必考重点，由试题研究专家抽选高频考点组卷，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

本套考试用书对考试知识点的把握准确，试题与真实考试接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中不足请读者批评指正。

人民军医出版社

欢迎关注微信公众号 lc5ik4，获取更多增值服务



第一单元

A₁型题（1~85题）

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 在下列各项中，对患者不会造成伤害的是

A. 医务人员强迫患者接受检查和治疗

B. 医务人员的行为疏忽和粗枝大叶

C. 医务人员的知识和技能低下

D. 医务人员对患者呼叫或提问置之不理

E. 医务人员为治疗疾病适当地限制或约束患者的自由
2. 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

A. 医疗保密

B. 医疗公正

C. 医疗权利

D. 医疗荣誉

E. 医疗义务
3. 对医学伦理学不伤害原则的不准确理解是对病人

A. 避免责任伤害

B. 避免技术伤害

C. 避免躯体伤害

D. 避免心理伤害

E. 避免对病人朋友的伤害
4. 尊重病人自主性或决定，在病人坚持己见时，可能要求医生

A. 放弃自己的责任

B. 听命于患者

C. 无需具体分析

D. 必要时限制病人自主性

E. 不伤害患者
5. 医生必须保守病人的秘密，但应考虑除外

A. 病人的生理缺陷

B. 病人的过失行为

C. 病人的某些心理

D. 病人的某些怪癖

E. 病人的不良预后
6. 关于患者享有平等医疗权利的表述中，错误的是

A. 公民享有生命健康权

B. 对所有患者都应一视同仁

C. 患者的需求应得到完全满足

D. 患者享有的医疗保健权在实现时是受条件限制的

E. 应满足患者的合理需求
7. 不属于医疗资源管理和分配道德准则的是

A. 平等交往，患者利益中心

B. 医患利益兼顾，患者群体利益第一

C. 防治结合，预防为主

D. 经济效益与社会效益统一，社会效益第一

E. 投入与效益并重，提高效率优先
8. 管理本行政区域医师工作的机构是

A. 县级以上人民政府劳动人事部门

B. 县级以上人民政府工商行政部门

C. 县级以上人民政府卫生行政部门

D. 各级医师协会

E. 各级政府

9. 未经医师注册取得执业证书的
- A. 可在保健机构从事医师执业活动
 - B. 可在预防机构从事医师执业活动
 - C. 可在执业医师指导下从事医师执业活动
 - D. 不得在医疗机构，可在预防、保健机构，从事医师执业活动
 - E. 不得从事医师执业活动
10. 未经批准擅自开办医疗机构行医的，承担以下法律责任，除了
- A. 警告
 - B. 没收其违法所得及其药品药械，处 10 万元以下罚款
 - C. 对医师吊销执业证书
 - D. 给患者造成损害的，承担赔偿责任
 - E. 构成犯罪的，追究刑事责任
11. 医学心理学是哪一门科学的分支学科
- A. 医学
 - B. 社会学
 - C. 心理学
 - D. 生理学
 - E. 生理心理学
12. 医学心理学研究任务不包括
- A. 研究心理因素对人体健康的影响及其机制
 - B. 研究个性的形成和发展
 - C. 研究自我调节对防病、治病和康复的作用
 - D. 研究疾病过程中的心理反应
 - E. 研究心理因素在疾病发展过程中的作用
13. 比较完整的心理健康概念是指
- A. 十全十美的心理状态
 - B. 适应环境和适应自我
 - C. 没有疾病
 - D. 适应自我
 - E. 适应环境
14. 心身疾病是
- A. 心理社会因素在病因上起主导作用的躯体疾病
 - B. 由心理社会因素引起的精神疾病
 - C. 由心理社会因素引起的器官系统的功能性改变
 - D. 由心理社会因素引起的躯体症状
 - E. 由心理社会因素引起的生理反应
15. 病人的心理需要中最为突出的是
- A. 安全感的需要
 - B. 信息的需要
 - C. 早日康复的需要
 - D. 尊重的需要
 - E. 理解的需要
16. 关于心理应激，错误的说法是
- A. 可引起生理反应
 - B. 可引起心理和行为反应
 - C. 对身心健康产生不利影响
 - D. 经过认知评价
 - E. 可能提高工作效率
17. 下列哪项可导致吸气性呼吸困难
- A. 喉头水肿
 - B. 支气管哮喘
 - C. 慢性支气管炎
 - D. 阻塞性肺气肿
 - E. 左心功能不全
18. 下列哪项疾病是咯血最常见的原因
- A. 肺淤血
 - B. 房间隔缺损
 - C. 肺结核
 - D. 支气管腺瘤
 - E. 肺梗死
19. 触觉语颤增强主要见于
- A. 肺泡内含气量增多
 - B. 支气管阻塞
 - C. 胸腔积液或气胸
 - D. 肺泡内炎性浸润
 - E. 胸膜增厚粘连
20. 下列哪项不是引起干啰音的机制

- A. 呼吸道黏膜充血水肿
B. 支气管管腔内有分泌物
C. 管腔内有新生物
D. 肺泡壁粘合
E. 管壁被管外肿大淋巴结压迫
21. 胸膜摩擦音最常听到的部位是
A. 前下侧胸壁
B. 肩胛间区
C. 后下侧胸壁
D. 心窝部
E. 双肺底部
22. 支气管哮喘的临床特征主要是
A. 吸气性呼吸困难
B. 反复发作，阵发性，呼气性呼吸困难
C. 反复发作，混合性呼吸困难
D. 夜间阵发性呼吸困难
E. 肺部有较多喘鸣伴肺底湿啰音
23. 肺炎合并感染性休克，抗生素治疗哪项不正确
A. 早期大剂量、联合用药：青霉素+妥布霉素
B. 静脉点滴给药
C. 疗程要略长
D. 可用头孢曲松、头孢他啶
E. 确定病原菌后应调整用药
24. 下列疾病最易导致肺源性心脏病的是
A. 原发型肺结核
B. 血行播散型肺结核
C. 干酪性肺炎
D. 继发性肺结核
E. 重症肺结核
25. 肺结核咯血后低热持续不退，多提示
A. 精神紧张
B. 咯血吸收
C. 病变播散
D. 支气管感染
E. 肺结核并肺癌
26. 呼吸衰竭的动脉血气诊断指标是
A. $\text{PaO}_2 < 6.65 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 8.0 \text{ kPa}$
B. $\text{PaO}_2 < 7.32 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 7.32 \text{ kPa}$
C. $\text{PaO}_2 < 8.0 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.65 \text{ kPa}$
D. $\text{PaO}_2 < 9.3 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 5.32 \text{ kPa}$
E. $\text{PaO}_2 < 5.32 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 9.3 \text{ kPa}$
27. 相对数是表示
A. 计量资料相对大小的指标
B. 事物相对关系的指标
C. 两事物联系程度的指标
D. 动态分析指标
E. 事物的发展变化指标
28. 常用的调查方法有
A. 普查
B. 典型调查
C. 抽样调查
D. 登记调查
E. 询问调查
29. 以下第一级预防措施中哪项是不正确的
A. 免疫接种
B. 控制和消除环境致病危险因素
C. 加强体育锻炼，增强对疾病的抵抗力
D. 定期体格检查，对疾病早发现、早诊断、早治疗
E. 怀孕期和儿童期的卫生保健
30. 下列哪项是社区卫生服务的特性
A. 服务对象主要是老年人
B. 以临床治疗为主
C. 重视病胜于重视人
D. 服务方式是上门服务
E. 服务范围包括个人、家庭和社区
31. 传染源是指体内有病原体生长、繁殖并排出病原体的
A. 病人
B. 鼠类

- C. 家禽
D. 牲畜
E. 人或动物
32. 食物中毒的流行病学特点包括，除了
A. 原因分布特点
B. 季节性分布特点
C. 食品种类分布特点
D. 空间分布特点
E. 地区性分布特点
33. 在甲亢的各种病因中，哪种为最多见
A. 自主性高功能甲状腺结节
B. Graves 病
C. 甲状腺癌
D. 多结节性甲状腺肿伴甲亢
E. 碘甲亢
34. 甲亢时最具有诊断意义的体征是
A. 心率加快，第一心音亢进
B. 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音
C. 突眼
D. 脉压大
E. 心脏增大
35. 以下对糖尿病检验结果的解释正确的是
A. 尿糖阴性可以排除糖尿病
B. 尿糖阳性可以诊断为糖尿病
C. 尿酮阳性仅见于糖尿病
D. 空腹血糖正常可以排除糖尿病
E. 餐后 2 小时血糖正常可以是糖尿病
36. 糖尿病最常见的神经病变是
A. 周围神经病变
B. 神经根病变
C. 神经干病变
D. 脊髓病变
E. 颅神经病变
37. 胸外心脏按压抢救心脏骤停，下列哪种表现最常提示治疗有效
A. 上肢血压达 60mmHg (7.89kPa)
B. 心音清晰规则
C. 触及颈动脉搏动
D. 瞳孔变小
E. 神志恢复
38. 慢性心力衰竭的基本病因是
A. 严重的心律失常
B. 过重的体力劳动
C. 原发性心肌损害
D. 钠盐摄入过多
E. 感染
39. 急性心肌梗死合并心源性休克时，其特点为
A. 血压下降，中心静脉压下降
B. 血压下降，四肢冰冷
C. 血压下降，心率增快
D. 血压下降，肺毛细血管楔压上升
E. 心功能不全表现
40. 下列各种高血压，哪种最适合 β 受体阻滞药治疗
A. 伴心功能不全
B. 伴肾功能不全
C. 伴支气管哮喘
D. 伴心动过缓
E. 伴梗阻性心脏病
41. 胫骨骨折后因局部血液供应差，容易造成延迟愈合或骨不连接的部位是
A. 胫骨上段骨折
B. 胫骨平台骨折
C. 胫骨中段骨折
D. 胫骨中下 1/3 骨折
E. 踝上骨折
42. 急性骨髓炎，在骨膜下或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是
A. 多次抽脓并注入抗生素
B. 进行脓液细菌培养及药敏试验，据结果调整用药

- C. 联合使用大量抗生素
D. 钻孔引流或开窗减压
E. 局部固定防止病理性骨折
43. 肩关节周围炎
A. 多见于青少年
B. 发病急, 病程约数周
C. 晚上疼痛减轻
D. 可见典型疼痛弧
E. 肩关节外展受限
44. Colles 骨折骨折段的典型移位是
A. 远侧端向尺侧移位
B. 近侧端向背侧移位
C. 远侧端向背侧移位
D. 很少发生嵌插
E. 一般下尺桡关节不受累
45. 急性胃炎的主要临床表现是
A. 上腹痛
B. 明显反酸
C. 频繁呕吐、有宿食
D. 消瘦、贫血
E. 频繁腹泻
46. 诊断慢性胃炎最可靠的依据是
A. 慢性上腹部疼痛
B. 胃酸常降低
C. X 线食管钡剂造影检查
D. 胃脱落细胞检查
E. 胃镜检查及胃黏膜活检
47. 胃溃疡病的好发部位是
A. 胃窦大弯侧
B. 胃窦小弯侧
C. 胃体小弯侧
D. 小弯胃角附近
E. 胃底部
48. 肝硬化并发肝肾综合征是
A. 肝硬化失代偿期合并肾小管坏死
B. 肝硬化失代偿期发生氮质血症及少尿等
功能性损害
C. 肝硬化晚期合并急性肾炎
D. 肝硬化代偿期并慢性肾炎
E. 肝硬化失代偿期并慢性肾炎
49. 我国急性胰腺炎的常见病因
A. 胆道疾病
B. 胆胰或胃手术后
C. 腹部钝挫伤
D. 大量饮酒和暴饮暴食
E. 急性病毒感染
50. 腹部闭合性损伤中, 较多见的实质性脏器损伤为哪一项
A. 肝
B. 肾
C. 脾
D. 肾上腺
E. 胰
51. 肛瘘手术治疗中, 最重要的是
A. 麻醉充分
B. 肛管括约肌松弛
C. 找出外口
D. 明确瘘管和括约肌关系
E. 手术后呈“V”形创面
52. 贫血的定义是外周血液单位体积中
A. 红细胞数低于正常
B. 血细胞比容低于正常
C. 红细胞数及血红蛋白量低于正常
D. 红细胞数、血红蛋白量和血细胞比容低于正常
E. 循环血液量较正常者减少
53. 体内缺铁初期即潜伏前期的最早最可靠的诊断依据是
A. 典型小细胞低色素性贫血血象
B. 血清总铁结合力增高
C. 血清铁减低
D. 骨髓贮存铁减少或缺乏

- E. 血清转铁蛋白饱和度下降
54. 缺铁性贫血的补铁治疗中，下列属无机铁的是
- A. 琥珀酸亚铁
- B. 右旋糖酐铁
- C. 富马酸亚铁
- D. 硫酸亚铁
- E. 山梨醇铁
55. ITP 首选治疗是
- A. 脾切除
- B. 大剂量丙种球蛋白
- C. 糖皮质激素
- D. 输浓缩血小板悬液
- E. 长春新碱
56. 肉眼血尿是指 1 000ml 尿液中有多少毫升血液
- A. 1ml
- B. 2ml
- C. 3ml
- D. 4ml
- E. 5ml
57. 肾输尿管结石的主要症状是
- A. 血尿和脓尿
- B. 疼痛和血尿
- C. 尿频和血尿
- D. 无痛性血尿
- E. 排尿困难和血尿
58. 下列哪项是加速肾小球疾病肾功能损害最重要的原因
- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 血尿
- D. 贫血
- E. 高血脂
59. 急性乳房炎多见于
- A. 中年孕妇
- B. 妊娠期
- C. 青年妇女
- D. 初产哺乳妇女
- E. 多胎分娩妇女哺乳期
60. 乳癌最常见的部位是指乳房的
- A. 内上象限
- B. 外上象限
- C. 内下象限
- D. 外下象限
- E. 乳晕区
61. 引起痢常见的致病菌是
- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 类链球菌
- D. 产气荚膜杆菌
- E. 白色葡萄球菌
62. 有机磷杀虫药大都有的气味是
- A. 臭味
- B. 蒜味
- C. 氨味
- D. 辣味
- E. 刺激性气味
63. SLE 病人典型的面部表现为
- A. 痤疮
- B. 湿疹
- C. 蝶形红斑
- D. 色素沉着
- E. 紫癜
64. 精神分裂症的特征性症状是
- A. 失眠
- B. 注意力不集中
- C. 意识范围缩小
- D. 被洞悉感
- E. 遗忘
65. 脑出血最常见的原因是
- A. 脑动脉炎

- B. 高血压和脑动脉硬化
C. 血液病
D. 脑动脉瘤
E. 脑血管畸形
66. 蛛网膜下腔出血最可靠的诊断依据是
A. 头痛、呕吐
B. 脑膜刺激征
C. 腰穿时发现血性脑脊液
D. 一侧动眼神经麻痹
E. 偏瘫
67. 下列哪项不符合痫性发作
A. 痫性发作分部分性发作和全面性发作两个主要类型
B. 单纯部分性发作起始于脑局部，不伴意识障碍
C. 全面性发作起始于脑局部，伴意识障碍
D. 痫性发作起始的异常放电源于一侧脑部的，为部分性发作
E. 痫性发作起始的异常放电源于两侧脑部的，为全面性发作
68. 急性颅内压增高的典型表现是
A. 剧烈头痛，频繁呕吐
B. 呈现 Cushing 征
C. 意识障碍加深
D. 去大脑强直发作
E. 头颅 X 线平片示脑回压迹加深
69. 感染性疾病与传染性疾病的主要区别是
A. 是否有病原体
B. 是否有传染性
C. 是否有感染后免疫
D. 是否有发热
E. 是否有毒血症症状
70. 确定一种传染病的隔离期是根据
A. 该病传染性的大小
B. 病程的长短
C. 病情的严重程度
D. 潜伏期的长短
E. 恢复期情况
71. 关于骨盆最小平面，下述哪项是正确的
A. 近似网形，前为耻骨联合后缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
B. 呈纵椭圆形，前为耻骨联合后缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
C. 呈横椭圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
D. 呈纵椭圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
E. 近似圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
72. 目前多数同意的围生期概念是
A. 妊娠 20 周至产后 28 天
B. 妊娠 28 周至产后 28 天
C. 妊娠 28 周至产后 7 天
D. 妊娠 24 周至产后 14 天
E. 妊娠 24 周至产后 7 天
73. 主要的产力是
A. 腹肌收缩力
B. 肛提肌收缩力
C. 膈肌收缩力
D. 圆韧带收缩力
E. 子宫收缩力
74. 习惯性流产是
A. 一次人工流产，两次不全流产
B. 两次人工流产，一次难免流产
C. 一次人工流产，一次难免流产
D. 一次难免流产，一次完全流产
E. 连续自然流产三次或以上
75. 前置胎盘出血的特点是
A. 妊娠早期出血
B. 妊娠晚期出血
C. 妊娠晚期无痛性出血
D. 妊娠早期无痛性出血

- E. 妊娠晚期腹痛性出血
76. 妊娠合并心脏病，诊断心力衰竭的可靠根据之一是
- A. 心界增大
B. 心尖区闻及Ⅱ级收缩期杂音
C. 活动时心率超过 110 次/分
D. 咳泡沫痰、肺底有持续性湿啰音
E. 踝部出现凹陷性水肿
77. 避孕方法中，失败率较高的是
- A. 宫内节育器
B. 口服避孕药
C. 安全期避孕
D. 阴道隔膜
E. 避孕套
78. 宫颈原位癌是
- A. 病变只限于上皮内，无间质浸润
B. 病变局限于宫颈，无淋巴结转移
C. 临床分期Ⅰa
D. 病变不能延伸到宫颈管内
E. 几乎全部上皮极性紊乱，细胞显著异形性
79. 新生儿期指的是
- A. 从孕期 28 周至生后 28 天
B. 从孕期 28 周至生后 1 个月
C. 从出生到生后满 28 天
D. 从出生到生后满 30 天
E. 从出生到生后满 1 个月
80. 营养不良皮下脂肪层消耗的顺序是
- A. 躯干-臀部-四肢-腹部-面颊
B. 面颊-腹部-躯干-臀部-四肢
C. 腹部-躯干-臀部-四肢-面颊
D. 四肢-躯干-腹部-面颊
E. 躯干-臀部-腹部-面颊
81. 佝偻病发病机制中下述哪项不正确
- A. 甲状旁腺功能代偿性亢进
B. 骨钙释出
C. 肾小管对磷的重吸收增加
D. 局部骨样组织堆积
E. 碱性磷酸酶分泌增加
82. 治疗新生儿窒息最根本的是
- A. 尽量吸尽呼吸道黏液
B. 触觉刺激
C. 复苏器加压给氧
D. 胸外按压心脏
E. 喉镜下经口气管插管
83. 6 个月以后婴儿容易发生营养性缺铁性贫血的主要原因是
- A. 先天贮铁不足
B. 铁摄入量不足
C. 生长发育快
D. 铁吸收障碍
E. 铁的丢失过多
84. 引起急性上呼吸道感染的主要病原为
- A. 细菌
B. 病毒
C. 真菌
D. 原虫
E. 螺旋体
85. 胸部 X 线检查，肺门舞蹈征多见于哪种先天性心脏病
- A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 艾森曼格综合征

A₂型题（86～110题）

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

86. 张某于1998年8月从某医学院专科毕业，张某可以

- A. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业医师资格考试
- B. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业助理医师资格考试
- C. 在医疗、预防、保健机构中试用期满二年，参加执业助理医师资格考试
- D. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中工作满一年，参加执业医师资格考试
- E. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业医师资格考试

87. 某县从事母婴保健工作的医师胡某，违反《母婴保健法》的规定，出具有关虚假的医学证明文件而且情节严重，该县卫生局应依法给予胡某的处理是

- A. 通报批评
- B. 警告
- C. 取消执业资格
- D. 罚款
- E. 降职降薪

88. 男性，58岁，慢性咳嗽、咳痰10余年，测VC为预计值的85%，FEV₁/FVC为52%，此肺功能改变可能是

- A. 正常
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 混合性通气功能障碍
- E. V/Q比例失调

89. 男性，20岁，突然发冷、发热，呕吐，上腹痛，咳嗽、气短，四肢厥冷，口唇发绀，轻度黄疸，血压70/40mmHg，心率130次/分，律齐，诊断可能是

- A. 胃穿孔，休克
- B. 急性胆囊炎，休克
- C. 胸膜炎，休克
- D. 肺梗死，休克
- E. 肺炎，休克

90. 患者男，67岁。知识分子，医生以肺部肿物待查收入院。住院后，确诊为肺癌，但尚未告诉患者和家属。而患者告诉医生自己无儿无女，仅与66岁的老伴相依为命，如果是肺癌，不要将病情告诉他的老伴，以免她冠心病发作：如果手术，可以自己签字。医生此时怎样做在道德上最佳

- A. 对患者家属保密，而对患者不保密
- B. 对患者本人不保密，但如何告知家属由患者决定
- C. 对患者和家属都保密
- D. 对患者和家属都不保密
- E. 对患者家属不保密，对患者保密

91. 某人因为不喜欢新换的工作岗位，想开假条自己去做生意，于是反复去医院找大夫开诊断证明。促使小王反复求医的原因是

- A. 躯体化
- B. 原发获益
- C. 疑病症
- D. 不信任医生做出的诊断
- E. 强迫症

92. 男性，26岁，轻度黄疸，肝肋下1.5cm，Hb70g/L，Coombs 试验阳性。诊断应先考虑

- A. 早期肝硬化
- B. 黄疸性肝炎
- C. 缺铁性贫血
- D. 肝炎并贫血
- E. 自身免疫性溶血性贫血

93. 男性，52岁，突发脑出血，头痛，呕吐，昏迷，血压187/90mmHg（25/12kPa），应迅速给予

- A. 止血治疗
- B. 降血压治疗
- C. 降颅压治疗
- D. 维持生命体征
- E. 防治血管痉挛

94. 男性，23岁，3个月前起病，说话语无伦次，常自言自语，说自己是神仙、是伟人，对异性有非分之想，攻击亲人。查：意识清晰，兴奋躁动，思维破碎，内容离奇，难以理解，认为门外有人要杀他，有一台电脑在影响他的大脑，使大脑在不停地转，躯体及神经系统检查（-），该患者诊断是

- A. 躁狂症
- B. 抑郁症
- C. 精神分裂症
- D. 心因性精神障碍
- E. 神经症

95. 某市95%的8岁正常男孩体重在18.39~29.45千克，其标准差是

- A. 2.14千克
- B. 5.14千克
- C. 2.82千克
- D. 0.95千克
- E. 无法计算

96. 我国三级医疗预防保健网是一个机构健全、职责分明、协调配合、运转有效的卫生组织体系。在过去的几十年里，我国取得了举世

瞩目的卫生成就，其中，三级医疗预防保健网发挥了重要作用，其设立的三级机构是

- A. 县、乡、村
- B. 中央、省、市
- C. 市、县、乡
- D. 省、市、地区
- E. 地区、市、县

97. 患者，女，40岁。企图自杀，服用大量巴比妥，严重中毒，送来医院时，呼吸已经停止。马上对病人进行洗胃，无效。在没有其他对抗措施的条件下，采用了在当时还没有推广的人工肾透析治疗进行抢救，收到了很好的疗效。为了抢救病人，采用了治疗性实验。对此做法，下面说法错误的是

- A. 动机是好的，但得失结果一时难以以下结论
- B. 是符合医学道德的医学行为
- C. 即使抢救成功，也不合乎道德规范
- D. 即使不幸造成死亡或伤残，也不能逆推动机不好
- E. 本案例医师的选择是正确的

98. 某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤切除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检，确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见，同时切除了左侧乳房。医师的这种做法，违背了病人权利的哪一点

- A. 平等的医疗权
- B. 保密权
- C. 隐私权
- D. 知情同意权
- E. 获得信息权

99. 左心衰竭患者，血压80/60mmHg，呼吸浅表，神志不清，下列治疗中哪一项是错误的

- A. 氧气吸入
- B. 哌替啶肌内注射
- C. 多巴胺静脉滴注
- D. 可拉明静脉注射
- E. 西地兰静脉注射

100. 某女, 17 岁, Graves 病患者, 甲亢症状典型, B 超见甲状腺位于胸骨后, 治疗方案首选为

- A. 抗甲状腺药物长程治疗
- B. 复方碘液
- C. 普萘洛尔
- D. ^{131}I 治疗
- E. 抗甲亢药物准备后手术治疗

101. 女, 45 岁, 较肥胖, 尿检查发现尿糖(+), 空腹血糖 5.6mmol/L(103mg/dl), 口服葡萄糖耐量试验血糖分别为 5.0、7.0、6.9、4.7、3.3mmol/L(90、126、124、85、60mg/dl), 相应的尿糖为(-)、(+)、(+)、(-)、(-), 可诊断为

- A. 糖尿病
- B. 肾性糖尿
- C. 食后糖尿
- D. 应激性糖尿
- E. 皮质醇增多症伴糖尿

102. 男, 65 岁, 3 个月来持续上腹部隐痛, 多次查粪便潜血试验阳性, 食欲减退, 消瘦。查: 面色苍白, 上腹部压痛(+), 未触及包块, 无肌紧张, 首先应考虑做哪项检查最有意义

- A. B 型超声波检查
- B. 纤维胃镜
- C. 胃液分析
- D. 血清促胃液素测定
- E. 肝 CT

103. 男, 38 岁, 4 小时前曾大量饮酒, 出现上腹剧烈持续疼痛 1 小时, 弯腰时腹痛可减轻。查体: 体温 38.6℃, 上腹压痛轻微, 无腹肌紧张, 最可能的诊断为

- A. 急性胃炎
- B. 急性胃肠炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性胆囊炎

E. 急性肠梗阻

104. 初孕妇, 末次月经第一天为 4 月 21 日, 持续 6 天, 于 12 月 29 日就诊。腹部检查: 子宫底在剑突下 2 横指, 枕右前位胎心 140 次/分, 血压 120/77mmHg (16/10.3kPa), 尿蛋白(-), 本病例现在是

- A. 妊娠满 35 周, 子宫底高度符合正常情况
- B. 妊娠满 36 周, 子宫底高度低于正常
- C. 妊娠满 36 周, 子宫底高度符合正常情况
- D. 妊娠满 36 周, 子宫底高度高于正常
- E. 妊娠满 37 周, 子宫底高度高于正常情况

105. 一初产妇, 规律宫缩 8 小时, 阴道流液 5 小时, 胎心好, 你认为符合下列哪项诊断

- A. 潜伏期延长
- B. 加速期延缓
- C. 加速期停滞
- D. 正常产程
- E. 第二产程延长

106. 闭经 3 年, 阴道流血 3 个月, 阴道细胞学检查结果巴氏 II 级, 进一步处理

- A. 切除子宫
- B. 子宫次广泛切除
- C. 诊断性刮宫+宫颈活体组织检查
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈锥形切除术

107. 5 个月男孩, 发热、咳嗽、喘憋 3 天。查体: 体温 37.5℃, 呼吸 68 次/分, 呈呼气性呼吸困难, 呼气时有呻吟, 伴明显鼻翼扇动及三凹征, 满肺喘鸣音, 肺底部有细湿啰音。白细胞 $7.0 \times 10^9 / \text{L}$, 淋巴细胞占 78%。本病例诊断最大的可能是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 革兰阴性杆菌肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

108. 女孩，2 岁，经常患感冒和肺炎。体检：心前区隆起，无震颤，胸骨左缘第 2 肋间可闻及Ⅱ级喷射性杂音， $P_2 > A_2$ 伴有固定分裂，心电显示电轴右偏，V 呈 rsR 波型，RV114mm，PV22mm，PR 间期 0.16s，该患儿考虑何种先天性心脏病

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

109. 女，25 岁，突发水肿，尿少，血尿，即住院治疗，诊断为“水肿待查”。3 周后进入昏迷，尿蛋白(+++)，RBC10~15 个/HP，WBC1~3 个/HP，颗粒管型 0~3 个/HP，血压

180/110mmHg (24/15kPa)，BUN27mmol/L。肾活检大量新月体形成，诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 以急性肾炎综合征起病的慢性肾炎
- D. 高血压病
- E. 急性肾盂肾炎

110. 男，30 岁。尿闭 2 天，腹 X 线平片示双输尿管中段各有结石一块，约 1.5cm×1.0cm，可采用哪项有效的治疗

- A. 针灸
- B. 解痉挛药物
- C. 利尿药应用
- D. 排石药应用
- E. 膀胱镜下输尿管插管

B 型题（111~130 题）

答题说明

提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（111~112 题共用备选答案）

- A. 思维被夺取
- B. 思维被洞悉
- C. 思维贫乏
- D. 思维散漫
- E. 思维迟缓

111. 患者认真讲了一番话，但周围的医生们都不理解他要说什么问题，该症状为

112. 患者对医生的问题只能在表面上产生反应，缺乏进一步的联想，该症状为

（113~115 题共用备选答案）

- A. 面部皮肤对称性红斑
- B. 手关节天鹅颈样畸形
- C. 口腔、阴部溃疡

- D. 眼睑向阳性皮疹
- E. 面容刻板、张口困难

113. SLE 可出现

114. 类风湿关节炎可出现

115. 系统性硬化症可出现

（116~118 题共用备选答案）

- A. 左肩放射性痛
- B. 尿淀粉酶升高
- C. 碱性磷酸酶升高
- D. 腹膜后积气
- E. 腹部外伤后直肠指检带血

116. 十二指肠降段破裂

117. 直肠破裂

118. 脾破裂

(119~121 题共用备选答案)

- A. 假临产
- B. 临产
- C. 早产
- D. 子宫破裂
- E. 流产

119. 妊娠未满 28 周出现宫缩, 伴阴道少许流血

120. 宫缩规律, 宫口开大, 胎头下降, 胎膜破裂

121. 宫缩夜间强, 白天消失

(122~124 题共用备选答案)

- A. 疼痛和血尿
- B. 尿频和尿痛
- C. 排尿困难
- D. 无痛性血尿
- E. 脓尿和血尿

122. 泌尿系统结核病人往往就诊时的主诉是

123. 泌尿系统肿瘤病人最常见的初发症状是

124. 泌尿系结石病人主要的症状是

(125~127 题共用备选答案)

- A. “银叉”畸形
- B. “枪刺样”畸形
- C. McMurray 试验
- D. 抽屉试验阳性
- E. 方肩畸形

125. 伸直型桡骨下端骨折侧面呈

126. 肩关节脱位呈

127. 膝关节韧带损伤

(128~130 题共用备选答案)

- A. 切脾术
- B. 糖皮质激素
- C. 雄激素
- D. 右旋糖酐铁注射
- E. 输血

128. 用于胃切除后引起的缺铁性贫血

129. 用于遗传性球形细胞增多症

130. 用于治疗再生障碍性贫血

A₃/A₄ 型题 (131~150 题)

答题说明

提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(131~132 题共用题干)

女, 49 岁。右乳外上象限触及无痛质硬肿块 1.5cm×1.2cm, 表面不光滑, 活动度欠佳, 右腋未触及淋巴结, 既往无外伤史。

131. 如想明确诊断, 应选何种方法最佳

- A. B 超
- B. 红外光扫描
- C. CT
- D. 切除活检

E. 化疗

132. 如诊断为乳腺癌应为

- A. T₁N₀M₀
- B. T₂N₀M₀
- C. T₃N₀M₀
- D. T₁N₁M₀
- E. T₂N₁M₀

(133~136 题共用题干)

男, 60 岁, 慢支肺气肿 20 年, 冠心病