



偽

受

略

理

後

上

下

傷寒明理論目錄

第一卷

發熱

惡寒

惡風

寒熱

潮熱

自汗

盜汗

頭汗

手足汗

無汗

頭痛

項強

頭眩

胃脇滿

心下滿

腹滿

少腹滿

煩熱

第二卷

虛煩

躁煩

懊憹

古上胎

衄

噦

咳

喘

嘔吐

悸

渴

振

戰慄

四逆

厥

鄭聲

譫語

短氣

第三卷

搖頭

瘈瘲

不仁

直視

鬱冒

動氣

自利

筋惕肉瞤

熱入血室

發黃

發狂

霍亂

畜血

勞復

第四卷

諸湯方論

目錄終

傷寒明理論卷三

趙宋金嶽卿聊攝成無已撰

搖頭第三十七

傷寒岳頭何以明之頭者諸陽之會也諸陽之脉皆上於頭諸陰脉皆至頸胷中而還陽脉不治則頭爲之搖傷寒搖頭有三皆所主不同也有曰搖頭言者裏痛也以裏有痛者語言則劇欲言則頭爲之戰搖也有曰獨搖頭卒口噤背反張者瘕病也以風盛於上風主動搖故也裏痛非邪也痛使之然瘕病非逆者又豈之然至於陽反獨留形體如煙熏直視搖頭

者又謂之心絕蓋心藏神而爲陰之本陽根於陰陰
根於陽陰陽相根則榮衛上下相隨矣絕則神去而
陰竭陽無根者則不能自主持故頭爲之搖矣王冰
曰滋苗者以固其根伐下者必枯其上內絕其根外
作搖頭又何疑焉心絕者眞病也風痙裏痛者邪氣
也觀其頭搖又當明其臧否焉

瘈瘲第三十八

傷寒瘈瘲何以明之瘈者筋脉急也瘲者筋脉緩也
急者則引而縮緩者則縱而伸或縮或伸動而不止
者名曰瘈瘲俗謂之搐者是也黃帝內經曰病筋脉

相引而急名曰瘈瘲瘈謂若契合之契也行則緩卧則緊從則縱瘈疾之縱者謂若放縱之縱也以急爲瘈以緩爲瘲理之明矣瘈瘲者風疾也而癰癰則瘈瘲焉傷寒瘈瘲者邪熱氣極也熱盛則風搏併經絡風主動故四肢瘈瘲而不寧也故風溫被火者曰發微黃色劇者如驚癰時瘈瘲言其熱氣之劇盛也傷寒病至於發瘈瘲者疾勢已過矣多難可制內經曰太陽終者戴眼反折瘈瘲絕汗乃出大如貫珠著身不流是見其瘈瘲爲已過之疾也又有四肢熱習爲四肢動而不止似瘈瘲而無力不得伸縮者也此爲

如痰癰之證雖難已若能以祛風滌熱之劑折其
大熱則癰癰亦有生者若妄加灼火或飲以發表之
藥則死不旋踵經曰一逆尚引日再逆促命期

不仁第三十九

傷寒不仁何以明之仁柔也不仁謂不柔和也痒不
知也痛不知也寒不知也熱不知也任其屈伸灸刺
不知所以然者是謂不仁也由邪氣擁盛正氣爲邪
氣閉伏鬱而不發榮衛血氣虛少不能通行致斯然
也內經曰榮氣虛則不仁針經曰衛氣不行則爲不
仁經曰榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁卽

是言之知榮衛血氣虛少不能通行爲不仁者明矣
經曰諸乘寒者則爲厥鬱胃不仁言此厥者是正氣
爲寒氣所乘爲厥氣也非四肢逆冷之厥也何者蓋
以鬱胃爲昏胃不仁爲不知痛痒得不爲尸厥之厥
耶經曰少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入
胃膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰
相動令身不仁此爲尸厥其乘寒之厥鬱胃不仁卽
此尸厥可知矣昔越人入虢診太子爲尸厥以鬱胃
不仁爲可治刺之而得痊濟者寔神醫之診也嗚呼
設或脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體

不仁此又爲命絕雖越人其能起之歟

直視第四十

傷寒直視何以明之直視者視物而目精不轉動者是也若目精轉者非直視也水之精爲志火之精爲神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精神榮焉鍼經曰五藏六府之氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼之睛精爲瞳子筋之精爲黑睛血之精爲絡氣之精爲白睛肌肉之精爲約束裏擷筋骨血氣之精與脉并爲系上屬於腦五藏血氣調和精氣充榮則目和而明矣傷寒目直視者邪氣擁盛冒其正氣

使神智不慧藏精之氣不上榮於目則目爲之直視
傷寒至於直視爲邪氣已極證候已逆多難治經曰
衄家不可發汗汗出則額上陷脉急緊直視不能眴
不得眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已
弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖錯逆其未
甚也逮乎狂言反目直視又爲腎絕直視搖頭又爲
心絕皆藏氣脫絕也直視讖語喘滿者死下利者亦
死又劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直
視脉弦者生濇者死皆邪氣盛而正氣脫也其或有
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者是

非直視也此爲內實也可用大承氣湯大柴胡湯下之直視爲不治之疾目中不了了爲可治之候二者形證相近其爲工者宜熟視之

鬱冒第四十一

傷寒鬱冒何以明之鬱爲鬱結而氣不舒也冒爲昏冒而神不清也世謂之昏迷者是也鬱冒之來皆虛極而乘寒則有之矣經曰諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也是知因虛乘寒乃生鬱冒金匱要略曰新產

婦人有三病一者病瘕二者病鬱胃三者大便難亡
血復汗寒多故令鬱胃又曰產婦鬱胃其脉微弱嘔
不能食大便堅所以然者血虛而厥厥而必冒胃家
欲解必大汗出卽此觀之鬱胃爲虛寒可知矣又或
少陰病下利止而頭眩時時自冒者又爲死證蓋謂
其虛極而脫也觀其鬱胃幸無忽焉

動氣第四十二

傷寒動氣何以明之動氣者爲築築然動於腹中者
是矣藏氣不治隨藏所主發泄於臍之四傍動跳築
築然謂之動氣難經曰肝內證臍左有動氣按之牢

若痛心內證臍上有動氣按之牢若痛肺內證臍右有動氣按之牢若痛腎內證臍下有動氣按之牢若痛是藏氣不治腹中氣候發動也動氣應藏是皆真氣虛雖有表裏攻發之證卽不可汗下經曰動氣在左不可發汗汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤是發汗而動肝氣者也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱卧則欲蹠是下之而動肝氣者也動氣在上不可發汗汗則氣上衝正在心端是發汗而動心氣者也動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌是下之而

動心氣者也動氣在右不可發汗汗則衄而渴心苦
煩飲卽吐水是發汗而動肺氣者也動氣在右不可
下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸是下之而
動肺氣者也動氣在下不可發汗汗則無汗心中大
煩骨節苦痛目運惡寒食則反吐穀不得下是發汗
而動腎氣者也動氣在下不可下下之則腹脹滿卒
起頭眩食則下清穀心下痞是下之而動腎氣者也
且脾內證當臍有動氣經特曰臍之四傍動氣不可
汗下獨不言脾候當臍有動氣者以脾者中州爲胃
以行津液發汗吐下猶先動脾况脾家發動氣者詎

可動之也所以特不言之也傷寒所以看外證爲當者蓋不在脉之可見必待問之可得者發汗吐下務要審諦舉此動氣類可知矣

自利第四十三

傷寒自利何以明之自利者有不經攻下自然溏泄者謂之自利也傷寒自利多種須知冷熱虛實消息投湯無致失差雜病自利多責爲寒傷寒下利多由協熱其與雜病有以異也表邪傳裏裏虛協熱則利不應下而便攻之內虛協熱遂利是皆協熱已又合病家皆作自利太陽與陽明合病必自下利葛根湯

主之太陽與少陽合病必自下利黃芩湯主之陽明
與少陽合病必自下利大承氣湯主之三者皆合病
下利一者發表一者攻裏一者和解所以不同者蓋
六經以太陽陽明爲表少陽太陰爲在半表半裏少
陰厥陰爲在裏太陽陽明合病爲在表者也雖曰下
利必發散經中邪氣而後已故與葛根湯以汗之太
陽與少陽合病爲在半表半裏者也雖曰下利必和
解表裏之邪而後已故與黃芩湯以散之陽明少陰
合病爲少陽邪氣入府者也雖曰下利必逐去胃中
之實而後已故與承氣湯以下之是三者所以有異

也下利家何以明其寒熱耶且自利不渴屬太陰以其藏寒故也下利欲飲水者以有熱也故大便溏小便自可者此爲有熱自利小便色白者少陰病形悉具此爲有寒惡寒脈微自利清穀此爲有寒發熱後重泄色黃赤此爲有熱皆可理其寒熱也凡腹中痛轉氣下趣少腹者此欲自利也自利家身涼脈小爲順身熱脈大爲逆少陰病脈緊下利脈暴微手足反溫脈緊反去者此爲欲解下利脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死是知下利脈大爲逆而脈小爲順也自利宜若可溫理中白通諸四逆輩