

丹溪心法

寅

重訂丹溪先生心法卷三

新安吳勉學校

脱肛二十八

口脱肛屬氣熱

氣虛

血虛

血熱

氣虛者補

氣參芪芎歸升麻

血虛四物湯

血熱者涼血四

物湯加炒栢

氣熱者條芩六兩升麻一兩麩糊丸

外用五倍子為末托而上之一次未收至五七次待

收乃止

又東北方壁土泡湯先薰後洗

附錄肺與大腸為表裏故肺藏蘊熱則肛門閉結

肺藏虛寒則肛門脱出又有婦人產育用力小兒

以痢皆致此治之必須溫肺藏精陽胃以則自然  
收矣

方

香荆散 治肛門脫出大人小兒皆主之

香附子

荆芥等分

砂仁

右為末每服三錢水一碗煎熱淋洗 每服三錢

煎服亦可

又方

五倍子為末每用三錢煎洗

又方水賊不以多少燒灰為末搽肛門上按入即愈

嘔吐二十九

口凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦 胃中

有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生姜 有

久病嘔者胃虛不納穀也用人參生姜黃芪白朮香

附之類 嘔吐朱奉議以半夏橘皮生姜為主 劉

澗間謂嘔者火氣炎上此特一端耳 有痰膈中焦

食不得下者 有氣逆者 有寒氣鬱於胃口者

有食滯心肺之分而新食不得下而反出者 有胃

中有火與痰而嘔者 嘔吐藥忌瓜蒌杏仁桃仁蘿

蔔子山梔皆要作吐丸藥帶香藥行散不妨 注船

大吐渴飲水者即成童便飲之最妙

附方

理中加丁香湯

治中脘停寒喜辛物入口即吐

人參

白朮

甘草炙

乾姜

炮各一錢

丁香十粒

右咬咀生姜十片水煎服或加枳實半錢亦可不  
効或以二陳湯加丁香十粒并須冷服益令遇冷  
則相入庶不吐出又或活人生姜橘皮湯

活人生姜橘皮湯

橘皮四兩

生姜半兩

右吹咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

熱嘔 濟中強茹湯 小柴胡加竹茹湯見瘧症

右並用生姜多煎服

濟生竹茹湯

葛根三兩 半夏炮七次 甘草炙一兩

○右吹咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片

加味二陳湯 治停痰結氣而嘔

半夏 橘皮各五兩 白茯苓三兩 甘草炙一兩

砂仁一兩 丁香五錢 生姜一兩

右水煎服

吐虫而嘔方

黑鉛炒成灰檳榔末水飲調下

惡心三十

口惡心有痰 有熱 有虛 皆用生姜隨症佐藥

戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔  
雖曰惡心實非心經之病皆在胃中上宜用生姜  
蓋能開胃豁痰也

附錄惡心欲吐不吐心中兀兀如人畏舟船宜大  
半夏湯或小半夏挾苓湯或理中湯加半夏亦可  
又胃中有熱惡心者以二陳加生姜汁炒黃連黃

苓各一錢最妙

附方

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右以酒水二盞姜二錢半煎取汁食後服

小半夏茯苓湯

半夏

五兩

茯苓三兩

右以咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜

自然汁投藥中更煎一兩沸熱服無時或用生

姜半升同煎

理中湯 見中寒

欬逆三十一

○欬逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之

其詳在格致餘論 不足者人參白朮湯下大補丸

有餘并有痰者吐之人參蘆之類 痰礙氣而吃逆

用密水吐此乃燥痰不出 痰者陳皮半夏 氣虛

人參白朮 陰史黃連黃栢滑石 欬逆自痢者滑

石甘草炒黃栢白芍人參白朮陳皮加竹荊瀝服

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

附錄欬逆為病古謂之噦近謂之呃乃胃寒所生

寒氣自逆而呃上此証最危亦熱呃已見傷寒証其有他病發呃者宜用半夏一兩生姜半兩水煎熱服或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒吐利後胃虛寒咳逆者以羌活附子湯或丁香十粒柿蒂十箇切碎水煎服吐利後胃熱咳逆者以竹皮竹茹湯亦無別病偶然致呃此緣氣逆而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏又或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散熱服之逆氣用之最佳

附方

橘皮乾姜湯

治咳逆不止

橘皮

通草

乾姜

桂心

甘草

炙各二兩

人參

一兩

右用五錢水煎服

生姜半夏湯

通治咳逆欲飲

半夏

一兩

生姜

二兩

右以水煎温作三服

陰証咳逆

川烏

乾姜

炮

附子

炮

肉桂

芍藥

甘草

炙

半夏

之

吳茱萸

陳皮

大黃等分

右為末每服一錢生姜五片煎服

人參白米湯

人參

黃芩

柴胡

乾葛

梔子仁

甘草

炙各半兩

白朮

防風

半夏

泡七水

五味

右以咀每服四錢姜三片煎

羌活附子湯

治吃逆

木香

附子炮

羌活

茴香

炒各半兩

乾姜一兩

右為末每服二錢水一盞半鹽二檢煎二十沸和

担熱服一服止三因加

### 橘皮竹茹湯

橘皮一升 竹茹一升 甘草兩二 人參半兩

桑子三十 生姜半兩

右以水十盞煎至三盞作三服

### 小半夏茯苓湯

二陳湯加黃芩煎

### 木香調氣散

白寇仁 丁香 檀香 木香各二兩

藿香

甘草炙 砂仁

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

大補丸

見補損

理中湯

見中寒

翻胃三十二

口翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有痰兼

病 必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生姜汁 氣虛入

四君子湯右手脉無力 血虛入四物湯加童便左

手脉無力 切不可用香燥之藥若服之必灰宜藷

滋味 治反胃用黃連三錢生姜汁浸炒山查肉二

錢保和丸二錢同為末糊丸如麻子大臙脂為衣人

參湯入竹瀝再煎一沸下六十九。有瘦三陳湯為  
主寸關脉沉或伏而大。有氣結宜開滯導氣之藥  
寸關脉沉而瀋。有內虛陰火上炎而反胃者作陰  
火治之。年少者四物湯清胃腕血燥不潤便故澁  
格致餘論甚詳。年老雖不治亦用參朮關防氣虛  
胃虛。氣虛者四君子湯加蘆根童便或參朮白朮  
散或韭汁牛羊乳或入駝駝尿。又有積血停於內  
而致當消息逐之。大不瀝者難治。常令食兔肉則便  
利。翻胃即膈噎。膈噎又翻胃之漸。發揮備言  
年高者不治。糞如羊屎者斷不可治。大腸無血故

也

戴云翻胃血虛者脈必數而無力氣虛者脈必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必灰有熱者脈數而有力有痰者脈滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四君子湯為主熱以解毒為主痰以二陳為主

又方

用馬剝兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢右和勻溫酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

萊菔

黃連

貝母

瓜蒌

牛轉草

治翻胃

菹菜汁二四

牛乳一盞

右用生姜汁半兩和勻溫服効

治翻清積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脚丸小丸子時時服

附方

燒針九

此藥清鎮爵主吐逆

黃丹

不以冬少