



增補百病辨證錄總目

卷之一

傷寒門 四十三則

中寒門 七則

卷之二

中風門 二十五則

痺證門 十一則

脇痛門 五則

頭痛門 六則

腰痛門 六則

腹痛門 六則

卷之三

咽喉門 七則

牙齒門 七則

鼻淵門 三則

目痛門 十二則

血症門 二十一則

遍身骨痛門 四則

卷之四

五勞門 六則

咳嗽門 八則

怔忡門 三則

驚悸門 二則

不寐門 五則

健忘門 四則

狂病門 六則

呆病門 三則

喘門 四則

虛煩門 二則

癲癩門 六則

呃逆門 五則

耳痛門 七則

口舌門 二則

心痛門 六則

卷之五

關格門 五則

臟脹門 七則

中滿門 四則

厥症門 七則

翻胃門 五則

春溫門 三十三則

卷之六

火熱症門 十六則

暑症門 十一則

燥症門 十五則

痿症門 八則

卷之七

消渴門 五則

瘰癧門 十一則

汗症門 五則

五痺門 十則

大瀉門 九則

痢疾門 十三則

癰疽門 八則

卷之八

瘡疾門 十則

虛損門 十二則

癆瘵門 十七則

夢遺門 七則

陰陽脫門 五則

淋證門 七則

卷之九

大便閉結門 九則

小便不通門 六則

內傷門 二十三則

疝氣門 附奔豚八則

陰痿門 五則

瘵症門 二十一則

卷之十

鶴膝門 二則

癰疽門 二則

遺尿門 三則

脫肛門 二則

強陽不倒門 二則

發斑門 二則

火丹門 二則

離魂門 三則

疰夏門 二則

腳氣門 一則

中邪門 六則

中妖門 六則

中毒門 十二則

腸鳴門 三則

自笑門 附自哭三則

惱怒門 二則

瘡啞門 三則

瘟疫門 一則

種嗣門 九則

婦人科

卷之十一

帶門 五則

血枯門 二則

血崩門 七則

調經門 十四則

受娠門 十則

妊娠惡阻門 二則

卷之十二

安胎門 十則

小產門 五則

鬼胎門 一則

難產門 六則

血暈門 三則

胞衣不下門 二則

產後諸病門 十一則

下乳門 二則

卷之十三 外科

背癰門 七則

肺癰門 四則

肝癰門 二則

大腸癰門 三則

小腸癰門 三則

無名腫毒門 二則

對口疽門 一則

腦疽門 一則

囊癰門 二則

臂癰門 一則

乳癰門 四則

肚癰門 一則

多骨癰門 一則

惡疽門 一則

疔瘡門 一則

楊梅瘡門 五則

腰疽門 一則

掌疽門 一則

脚疽門 二則

鬢疽門 一則

唇疔門 一則

癰疽門 二則

痔漏門 四則

頑瘡門 二則

接骨門 二則

金瘡門 一則

物傷門 三則

癰門 一則

刑杖門 一則

卷之十四 幼科

驚疳吐瀉門 七則

便虫門 二則

痘瘡門 十五則

疹症門 三則

喫泥門 一則

胎毒門 一則

辨證錄外科卷之十三

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號

泰訂

背癰門 七則

人有背心間先發紅瘰後漸漸紅腫此發背之兆也最為可畏古人云外大如豆內大如拳外大如拳內大如盤言其外小而內是大也然而癰疽等毒必須辨其陰陽有先陰而變陽者有先陽而變陰者有前後俱陽者有前後俱陰者陽症雖重而寔輕陰症雖輕而寔重先陰而變陽者生先陽而變陰者死病症既殊將何以辨之陽症之形必高突而腫起陰症之形必低平而陷下陽症之色純紅陰症之色帶黑陽症之初起必痛陰症之初起必癢陽症之潰爛必多其膿陰症之潰爛必多其血陽症之收口身必清爽陰症之收口身必沉重至于變陰變陽亦以此消息斷斷不差也倘見紅腫而高突乃陽症之癰也乘其肉腫初發毒猶未化急以散毒之藥治之可隨手愈也發背而至橫決者皆因循失治以致破敗而不可救陽變陰者多矣救癰如救火宜一時撲滅切勿見為陽症無妨而輕緩治之也方用急消湯忍冬藤二兩茜草三錢紫花地丁一兩甘菊花三錢貝母二錢黃柏一錢天花粉三錢桔梗三錢生甘草三錢水煎服一劑輕二劑又輕三劑全消不必四劑也此方消陽毒之初起極神既無迅烈之虞大有和解之妙世人不知治法謂陽毒易於祛除孟浪用狼虎之藥雖毒幸消散而真氣耗損於無形往往變成別病乃醫者成之也

人有背心發癢癢甚已而背如山重悠悠發紅暈如盤之大此陰癰初起之形象也最為可畏尤非前症陽癰可比乃一生罪孽鬼祟纏身必然譎語胡言如見此等症候本不可救然而人心善惡成于一念之遷悔求生無術亦見醫道無奇蓋陽症有可救之術陰症豈無可生之理總在救之得法耳大約陰癰之症雖成于鬼祟之纏身然必正氣大虛邪得而入之也設正氣不虛邪將安入故救陰癰之症必須大用補氣補血之藥而佐之散鬱散毒之品則正旺而邪自散矣方用變陽湯人參二兩黃芪二兩金銀花八兩煎湯代水附子一錢荊芥炒黑三錢柴胡二錢白芍一兩天花粉五錢生甘草五錢井花水煎汁二碗服渣再煎服後陰必變陽而作痛再一劑而痛亦消再服一劑而全愈竟消滅無形也然人不致皮破血出斷不肯信雖然先用此等之藥以治發背毋論病人不肯服即醫生亦不肯用或醫生知用此治療而病人之家亦不肯信往往決裂潰爛瘡口至如碗大而不可收始悔參芪之遲用矣予既論此症又多戒辭勸人早服此方萬不可觀望狐疑喪人性命蓋陽毒可用攻毒之劑而陰毒須用補正之味用人參黃芪以補氣氣旺則幽陰之毒不敢入心肺之間而金銀花性補善解陰毒得參芪而其功益大然非得附子則不能直入陰毒之中而又出于陰毒之外毒深者害深又益之生甘草以解其餘毒然毒結于背者氣血之壅也壅極者鬱之極也故加柴胡荊芥白芍天花粉之類消痰通滯開鬱引經自然氣宣而血活痰散而毒消矣

人有背癰潰爛洞見肺腑瘡口黑陷身不能卧口渴思飲人以為陽症之敗壞也誰知是陰虛而不

能變陽乎夫背癰雖有陰陽之分及至潰濃之後宜補內不宜消外則陰陽之症一也潰爛而至肺腑皆見此乃失補之故使毒過于沿燒將好肉盡化為瘻肉耳肉瘻自必成腐肉而腐自必洞見底裏見此等症候亦九死一生之兆也倘胃氣健而能食者猶可救倘見食則患者斷無生意雖然能用參芪歸熟亦有可生不可棄之竟不救也方用轉敗湯救之人參二兩生黃芪一兩熟地二兩肉桂二錢白朮四兩當歸一兩金銀花四兩麥冬二兩山茱萸一兩遠志三錢北五味子一錢茯苓三錢水煎服一劑而胃氣大開者即可以轉敗為功也倘飲之而稍能健飯亦在可救惟恐飲之者無應驗者是胃氣已絕也不必再治之矣或飲之而飽悶少頃而少安者亦有生機此方補其氣血而更補其肺腎之陰蓋陰生則陽長陰陽生長則有根易于接續而後以金銀花解其餘毒則毒散而血生血生而肉長肉長而皮合必至之勢也倘日以解毒為事絕不去補氣血之陰陽則陰毒不能變陽有死而已可勝悲悼哉

人有背癰能愈而瘡口不收百藥敷之絕無一驗人以為餘毒之未盡也孰知是陰虛而不能濟陽夫癰疽初起則毒盛變膿則毒衰濃盡則毒化矣瘡口不收乃陰氣之虛而非毒氣之旺世人不治法尚以敗毒之藥攻之是已虛而益虛也欲其肌肉之長何可得乎然亦有用補法而仍未效者但用陽分之品以補其陽而不用陰分之藥以補其陰也獨陰不長而獨陽亦不生癰疽至膿血已盡則陰必大虛止補其陽則陽旺陰虛陰不能交於陽矣陽有濟陰之心陰無濟陽之力所以愈補陽而陰愈虛而瘡口愈難合也治法必須大補其陰使陰精盛滿自能灌注于瘡口之

中不用生肌外敷之藥而瘡口之肉內生矣方用生膚散麥冬一兩熟地二兩山茱萸一兩人參五錢肉桂一錢當歸一兩忍冬藤一兩白朮五分水煎服二劑而肉自長又三劑外口自平又二劑全愈此方補陰之藥多於補陽使陰勝陽也然補陽仍是補陰之助以其能入陰之中交於陽之內也忍冬藤非特鮮餘剩之毒取其能領諸藥至于瘡口之間也

人有背瘡長肉瘡口已平忽然開裂流血人以為瘡口之肉未堅也誰知是色慾惱怒之不謹耳太凡瘡癰之症最忌色慾次忌惱怒犯惱怒新肉有開裂之虞色慾新肉有流血之害犯惱怒者不過疾病犯色慾者多致死其瘡口開裂之處必然色變紫黑而流水之處必然肉變敗壞矣此時必須急補氣血萬不可仍治其毒蓋前毒未盡斷難收口復至腐爛新肉不堅而自湧決裂也況發背新愈之後其精神氣血盡為空虛若交合泄精遂至變害非常急補氣血又安求再活乎即補氣血以此小之濟欲收危亂之功大廈傾頽豈一木能支哉故又須大劑救之而後可方用寒變回生湯人參四兩黃芪三兩當歸二兩北五味子二錢麥冬二兩肉桂三錢白朮二兩山茱萸五錢忍冬藤二兩茯苓一兩水煎服一劑而肉不腐二劑而肉自生三劑而皮仍合四劑瘡口平復切戒再犯再犯無不死者即再服此方無益也可不慎乎此救瘡瘍壞症仙丹不止療發背愈後犯色之敗腐也人疑泄精以致決裂宜用熟地以大補之何故反置而不用以熟地補陰最緩而症犯甚急所以舍熟地之不可用此方服數劑之後各宜減半惟多加熟地留為善後之計耳人有夏月生背癰瘡口不起脈大而無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大

便不寔喘促嘔吐人以為火毒太盛也誰知是元氣大虛補不足以濟之夫癰分陰陽瘡口不起乃陰症而非陽症也脈大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水不足以濟火故徒渴徒汗也既陰症似陽用參芪陽藥以助陽正氣足以祛陰而返陽矣何以愈補而反逆冷嘔吐此陰寒之氣正甚而微陽之品力不能勝耳非加附子辛熱之品又何能斬關入陣以祛蕩其陰邪哉方用助陽消毒湯人參半斤黃芪一兩當歸四兩白朮四兩陳皮一兩附子五錢水煎膏作二次服諸症退連服數劑瘡起而潰乃減半又用數劑而愈此非治癰之法也然治癰之法而輕治此等之症鮮不立亡可見治癰不可執也大約陽癰可以消毒化痰之藥治之陰癰之病萬不可用消毒化痰之味此是治癰之變法醫者不可不知

人有背生癰疽潰膿之後或發熱或惡寒或作痛或膿多或流清水自汗盜汗膿成而不潰口爛而不收人以為毒氣之未盡也誰知五臟虧損血氣大虛之故凡人氣血壯盛陰陽和平何能生毒惟其臟腑內損而後毒氣得以內藏久之外泄及至癰疽發出其毒自不留內然臟腑原虛又加流膿流血則已虛益虛觀其外瘡口未斂似乎有餘審其內氣血未生寔為不足法當全補不宜偏補夫一臟致有偏勝之虞也方用十全大補湯最妙以其合氣血而兩補之耳然而用之往往不效者非方之不佳乃用方之不得其法耳夫背癰何等之症豈用尋常細小之劑所能補之必須多加分兩大劑煎飲庶幾有濟予因酌定一方以請正于同人也用人參一兩黃芪二兩白芍五錢肉桂二錢川芎三錢熟地二兩當歸一兩白朮五錢茯苓五錢生甘草三錢水煎服一劑

有一劑之效世疑此方絕不敗毒如何化毒而生肉不知癰疽未潰之前以化毒為先已潰之後補正為急縱有餘毒未盡不必敗毒蓋敗毒之藥非寒涼之品即消耗之味也消耗則損人真氣寒涼則傷人胃氣真氣損則邪氣反盛胃氣傷則穀氣全無又何能生長肌肉哉惟十全大補湯專補真氣以益胃氣故能全效耳且此方不特治背癰之已潰即瘡瘍已潰者皆宜用之

肺癰門 四則

人有胸膈間作痛咳嗽時更加痛極手按痛處尤增氣急人以為肺經生癰也誰知是肺熱生癰耳夫肺為嬌臟藥食之所不到者也故治肺其難肺熱害肺既可成癰將何法療之療之法似宜救火以瀉肺肺藥不可入而肺為脾之子脾經未嘗不受藥也補其脾經之土則土能生金也平其肝經之木則金不能尅木矣清其心經之火則火不能刑金也三經皆有益於肺無損於金則肺氣得養而後以消毒之品直解其肝中之邪何難于不收乎方用全肺湯玄參三兩生甘草五錢金銀花五兩天花粉三錢茯苓三錢白芍三錢麥冬二兩水煎服一劑而痛減二劑而內消矣大凡癰疽之症必須內消不可令其出毒內消之法總不外脾肝心三經治之而無別消之道或曰肺之子腎也獨不可治腎以消乎然肺癰之成雖成于火燦肺金之液寔因肝氣之自虛也補腎雖使肺氣不來生腎惟是肺氣相通補腎之水恐肺氣下降而火毒反不肯遽散不若止治三經使肝氣得養自化其毒不遺于腎之為妙也

人有胸膈作痛咳嗽不止吐痰更覺疼甚手按痛處不可忍咽喉之間先聞腥臭之氣隨吐膿血此

肺癰不獨已成而且已破矣夫肺癰未破者易于消已破者難于治為膿血未能遽淨耳然得法亦不難也蓋肺之所以生癰者因肺火不散也然肺火來因肺氣虛也肺虛而火留於肺火盛而後結為癰不補虛而散火未成形者何以消已成形者何以散既潰爛者又何以愈哉是虛不可不補而補虛者補何臟乎必須補肝氣之虛而肺不能直補其氣補胃氣之虛則肺氣自旺也今癰已破矣多吐膿血則肺氣尤虛雖毒尚存不可純瀉其毒于補氣之中而行其攻散之方而行其攻散之法則毒易化而正氣無傷方用完肺飲人參一兩玄參二兩蒲公英五錢金銀花二兩天花粉三錢生甘草三錢桔梗三錢黃芩一錢水煎服一劑膿必多二劑膿漸少三劑疼輕四劑而又輕五劑痛止膿血亦止六劑竟奏全功此方補胃中之氣即瀉胃中之火胃氣旺肺氣不能衰胃火衰肺火不能旺所以能敗毒而又能生肉耳其諸藥亦能入肺不單走於胃然而入胃者十之八入肺者十之二仍是治胃益肺之藥也或問肺癰已破病已入裏似不宜升提肺氣南昌喻嘉言謂宜引之入腸而先生仍用桔梗以開提肺氣恐不可為訓嗟乎予所用之藥無非治胃之藥約入于胃有不引入腸者乎然肺氣困頓清肅之令不行用桔梗以清肺上氣通而下氣更速然則上之開提正下之迅透也

人有久嗽之後肺受損傷皮膚黃瘦咽嗑雖啞自汗盜汗卧眠不得口吐稠痰腥臭難聞而毛悴色憔悴之時必忍氣須臾輕輕吐痰始覺膈上不痛否則必大痛不已氣息奄奄全無振興之狀人以為肺中生癰也誰知是肺痿而生瘡耳此在本條不救之病然治之得法調理又善亦有生機

者夫肺癰與肺痿不同肺癰生于火毒治之宜速肺痿成于勞傷治之宜緩火毒宜補中用瀉勞傷宜補中帶清瀉與清不同而補則同也惟是瀉中用補可用大劑清中用補可用小劑勿忘勿助若有若無庶能奏功也方用養肺去痿湯金銀花三錢生甘草五錢生地二錢麥冬三錢紫苑五錢百部五分百合二錢款冬花三分天門冬一錢貝母三分白微三分水煎服服十劑膈上痛少輕者便有生機再服十劑更輕再服十劑而漸愈前後共服六十劑而始全愈也是方不寒不熱養肺氣于垂絕之時保肺葉于將痿之頃實有奇功倘捷效於一旦必至輕喪于須臾寧忍耐以全生切勿欲速而送死

世有膏粱子弟多食厚味燻熬烹炙煎炒之物時時吞嚼或美醞香醪乘興酣飲遂至咽乾舌燥吐痰唾血喘急膈痛不得安卧人以為肺經火熾也誰知是肺癰已成耳夫肺為五臟之蓋喜清氣之薰蒸最惡燥氣之炎逼今所飲所食無非辛熱之物則五臟之中全是一團火氣火性炎上而肺金在上安得不受害乎肺既受害不能下生腎水腎水無源則腎益加燥勢必取資于肺金而肺金又病能不已虛而益虛已燥而更燥也況各經紛然來逼火烈金刑肺間生癰必然之勢也治之法化毒之中益之養肺之法降火之內濟之補腎之方庶幾已成者可痊未成者可散也方用枝桑清肺丹桑葉五錢紫苑二錢犀角屑五分生甘草二錢款冬花一錢百合三錢杏仁七粒阿膠三錢貝母三錢金銀花一兩熟地一兩人參三錢水煎將犀角磨末冲服數劑可奏功也此方肺腎同治金不降火蓋五臟之火因飲食而旺乃虛火而非寔火也故補其水而金氣堅補其水

而虛火息。況補中帶散則補非呆補而火毒又容易辭也。

肝癰門 二則

人有素多惱怒容易動氣。一旦兩脇脹滿發寒發熱。既而脇痛之極。手按痛處不可忍。人以為肝火之盛也。誰知是肝葉生瘡耳。世人但知五臟中惟肺生癰。不知肝亦能生癰也。且靈素諸書亦未有及得毋創論以驚世乎。余寔聞異人有謂脇痛手不可按者。肝葉生癰也。靈素二經不談者。肝經生癰。世不常有。古人未有此症。所以畧而不言。蓋古今之氣運不同。而癰毒之生長不一。肝一惱怒。則肝葉張開。肝氣即逆。大怒之後。肝葉空脹。未易平復。且怒必動火。怒愈多而火愈盛。火盛必燥。乾肝血燥。乾則肝氣大燥。無血養肝。更易發怒。怒氣頻傷。欲不鬱結而成癰。烏可得乎。然癰生于內。何從而見。然內不可見。而外即可辨也。凡生癰者。脇在左而不在右。左脇之皮必現紅紫色。而舌必現青色。以此辨症。斷斷無差。治之法必平肝為主。而佐之瀉火去毒之藥。萬不可因循時日。令其潰爛而不可救也。方用化肝消毒湯。白芍三兩。當歸三兩。炒梔子五錢。生甘草三錢。金銀花五兩。水煎汁一碗。飲之一劑。而痛輕。二劑而痛又輕。三劑而痛如失。減半再服數劑。而全愈。此方用當歸白芍。直入肝中以滋肝血。則肝血驟生。易解肝血之燥。又得甘草以緩其急。梔子清火。金銀花解毒。安得不取效之捷哉。蓋是火毒既盛。肝血大虧。用此方而不如此大劑煎飲。亦自徒然。倘執以肝火之旺。而非是肝癰之成。單用歸芍以治脇痛。斷不能取效也。

人有左脇間疼痛非常。手按之更甚。人以為脇痛。而不知非脇痛也。此乃肝經之癰耳。夫肝經生癰。

多得之惱怒予前條已暢論之矣然而肝癰不止惱怒能生而憂鬱亦未嘗不生癰也惟因惱怒而得之者其痛驟因憂鬱而得之者其痛緩當初痛之時用逍遙散大劑煎飲痛立止又何至成癰也因失于速治而肝中鬱氣若不能宣而血因之結矣血結不通遂化膿而成癰其勢似乎稍緩然肝性最急癰成而毒發其驟也世有脇痛數日而死者正因生癰毒敗而死非脇痛而即能死人可不急救治之乎方用宣鬱化毒湯柴胡二錢白芍一兩香附二錢薄荷二錢當歸一兩陳皮一錢枳殼一錢天花粉三錢生甘草三錢金銀花一兩水煎服一劑而痛輕二劑而痛減三劑而痛又減四劑全愈重則不出六劑愈後用四物湯大劑調治不再發也夫肝癰世不常見既有前條不必又論及此然肝癰不可見而脇痛世人之所常病吾特發明憂鬱之能成又若此則人知急治何至成癰哉

大腸癰門 三則

人有腹中痛甚手不可按而右足屈而不伸人以爲腹中火盛而存食也誰知是大腸生癰耳大凡腹痛而足不能伸者俱是腸內生癰耳惟大腸生癰亦寔有其故無不成于火火盛而不散則鬱結而成癰矣然而火之有餘寔本于水之不足水衰則火旺火旺而無制乃養成其毒而不可解然則治之法又何必治火哉壯水以治火則毒氣自消方用清腸飲金銀花三兩當歸二兩地榆一兩麥冬一兩玄參一兩生甘草三錢薏仁五錢黃芩二錢水煎服一劑而痛少止二劑而足可伸再二劑而毒盡自消矣此方純陰之物而又是活血解毒之品雖瀉火實滋陰也所以相濟而

相成取效故神耳倘不益陰以潤腸而惟攻毒以降火則大腸先損又何勝火毒之凌燠哉毋怪愈治而愈不能效也

人有大腸生癰右足不能伸腹中痛甚便出膿血肛門如刀割此腸癰已經潰爛也能食者生不能食者死雖然不能食之中亦有非因火毒之熾而然者又不可因其不能食而棄之也大凡生此各種癰瘡俱以有胃氣為佳無胃氣毋論陰毒陽毒多不可救故治陰疽之病斷以扶胃氣為第一法而少加之敗膿祛毒之藥則正氣無傷而火毒又散今大腸癰破而致飲食不思則胃氣已盡絕大危之症也不急補胃惟治癰必死之道也方用開胃救亡湯人參一兩金銀花二兩山藥一兩生甘草三錢薏仁一兩玄參一兩白朮一兩山羊血研末一錢水煎調服一劑胃開二劑膿少三劑痛止四劑全愈此方全去救胃而敗膿祛毒已在其中妙在金銀花雖治毒而仍滋陰之藥為瘡家奪命之物軍乃至仁至勇之師又得參朮以補助其力即散毒尤神山羊血止血消渴且善通氣引諸藥入癰中解散之乃鄉導之智者也合而治之則調合有人撫綏有人攻剿有人安得不奏功如神乎自然胃氣大開化精微而輔輸于大腸也倘胃氣未傷服之尤奏功如響萬勿疑畏不用此方枉人性命耳

轉

人有大腸生癰小腹痛甚淋漓不已精神衰少飲食無味面色痿黃四肢無力自汗盜汗夜不能卧人以為火盛生癰也誰知水衰不能潤腸耳夫大腸之不能傳導者全藉腎水之灌注今因醉飽房勞過傷精力大泄其精遂至火動而水涸又加生冷並進以致氣血乖違濕動痰生腸胃痞塞

運化不通氣血凝滯而成癰也然則生癰之先本是腎水不足癰潰之後又復流其水是因虛而益虛矣若作久毒治之鮮不變為死症必須大補其腎水而並補其脾胃之氣則脾胃化精生水更易枯涸之腸一旦得滂沱之潤自然淹足不必治癰而癰已化氣血足而肌肉生也方用六味地黃湯加味治之熟地二兩山藥八錢牡丹皮六錢山茱萸八錢茯苓三錢澤瀉一錢人參一兩黃芪五錢麥冬一兩水煎連服數劑腹痛止而精神健前症頓愈此方六味以補腎水加人參麥冬黃芪以補脾胃之土土旺而肺氣自旺肺與大腸為表裏且又為腎之母自然子母相表裏相顧故奏功如神也

小腸癰門 三則

人有腹痛口渴左足屈而不伸伸則痛甚手按其痛處更不可忍人以為腸中生癰也然而腸中生癰不同有大小腸之分屈古足者大腸生癰屈左足者小腸生癰也今屈而不伸者即在左足是癰生于小腸而非生于大腸矣惟是大腸之癰易治小腸之癰難醫以大腸可瀉而小腸難瀉也雖然得其法又何不可瀉哉蓋大腸可瀉其火從糟粕而出小腸可瀉其火從溲溺而泄也方用泄毒至神湯金銀花三兩茯苓一兩薏仁一兩生甘草三錢車前子三錢劉寄奴三錢澤瀉三錢肉桂一分水煎服一劑而水如注二劑而痛頓減三劑而症如失不必四劑也此方俱利水之藥止一味金銀花消毒之味何以建功之神如此蓋小腸之毒必須內消而內消之藥舍金銀花寔無他藥可代以他藥消毒皆能損傷正氣而小腸斷不可損傷故必須以金銀花為君但金銀花不能