

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴義桐甫著

脾胃論治

男 芝本校

脾胃皆屬土

脾為己土胃為戊土

而臟腑分焉

脾為臟胃為腑凡臟主守腑主通臟陰而腑陽也

經言胃為水穀之海飲

入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱脾主為胃行其

津液者也故胃主納脾主運胃喜涼脾喜燥昔人每多混治惟葉氏醫案謂脾宜升則

健胃宜降則和太陰濕土得陽始運陽明陽土得陰始安以脾喜剛燥胃喜柔潤也仲

景急下存津其治在胃東垣大升陽氣其治在脾又言五臟以守為補六腑以通為補

卓然有見岫雲華氏稱其議論超出千古其敘葉案曰脾胃論莫詳於東垣其

補中益氣調中

益氣升陽益胃諸湯

以勞倦內傷為主故用

人參以補中黃耆以補中

蒼朮以溫燥

升麻以溫燥

升下陷之清陽

陳皮未香

理中宮之氣滯以太陰惡溼而病人胃陽衰者居多用之得宜效如桴鼓若脾陽不虧

胃有燥火則當用香巖養胃陰之法凡病後熱傷脾胃津液以致虛痞不食舌絳噤乾

煩渴不寐便不通爽此九竅不和皆胃病豈可以升柴治乎故先生必用降胃之法所

謂胃宜降則和者非辛開苦降亦非苦寒下奪以損胃氣不過甘平或甘涼濡潤以養

胃陰則津液來復使之通降而已此即宗內經六腑者傳化物而不藏以通為用之理

也故治胃陰虛不饑不納用清補

如粳米沙參玉竹杏仁白芍石斛茯苓神梗米麻仁扁豆

治胃陽虛食穀不化用

通補如人參益智陳皮厚朴烏藥茯苓治脾陰虛胸膈便難用甘潤如甘草大麥仁白
紅棗生木地栗粉半夏治脾陽虛吞酸噎腐用香燥如砂仁丁香炒木神麴穀芽乾薑治脾胃陽虛運納
白蜜治脾陽虛吞酸噎腐用香燥俱少食已欲瀉用升降法如補中益氣湯加茯苓治溼傷脾胃用平胃散或清治中氣
虛用補中益氣湯治饑傷痛而納食稍安病在當甘緩以養脾胃營中湯建治食傷傷食
腹飽當分消胃土雞內金炒查肉神曲薑病後調理脾元或六君子湯其分治合治
於病情尤為允愜者矣

白朮炒用則守生用則和甘草炒用則補生用則瀉火右方分列脾胃大抵脾臟以守
為補胃腑以通為補脾宜升運胃宜通降也其方治與飲食症參觀則備矣

附方

補中益氣湯見一卷中風

調中益氣湯即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮

升陽益胃湯六君子加者芍羌獨防柴連澤瀉薑棗

四君湯參苓朮草加陳皮名異功散加半夏名六君湯

益黃散陳皮一兩青皮訶子肉炙草各五錢丁香二錢

平胃散見一卷溼

清暑益氣湯見一卷暑

補中調中升陽補脾脾陽利溼暑法

鐵傷病後脾胃大濕和胃

當歸建中湯芍 桂 饅 草 薑 棗 當歸

參苓白朮散 參 苓 木 草 山藥 扁豆 蓮子 桔梗 砂仁 薏仁

蟠桃果 同藥搗成餅 蓮子 核桃 熟地 棗肉 用猪腰子摻入茴香末蒸熟去膜

安胃飲 加黃芩 石斛 生地 澤瀉 木通 陳皮 查肉 麥芽 若熱甚去後三味

半夏枳朮丸 半夏 枳 朮

養胃湯 人參 蒼香 厚朴 蒼朮 各一錢 茯苓 錢二分 陳皮 錢五分 草

脾胃

張 髻年寒熱肢冷食少便瀉尚作瘧治遂補怡色慘脉沉須防慢驚急理脾陽先用

理中湯少加附子手足乃溫專用異功散加蓮棗理脾熱減瀉止

於 脇痛吞酸已止肝火悉平但中脘氣窒口燥不知饑右脉欠和胃陰未復用沙參

麥冬花粉當歸白芍栝蒌小麥蘆汁三服得平

姜 左脉浮而鉤右弦緩腕中久痛納食稍緩乃饑傷脾絡所致經言脾欲緩急食甘

以緩之勿用平肝克伐生氣潞參當歸鬚白芍飴糖紅棗甘草牡蠣粉糯稻根鬚降

香末數劑而安

飲食症論治

飲以養陽食以養陰飲食人所以衛生而脾胃實生之本也胃旺則多食不滯過時不

饑脾運則分輸五臟榮潤四肢若生冷戕胃饑飽戕脾中氣先餒不宜專事消導宜補中益

氣湯加茯苓砂仁夫中氣即脾胃冲和之元氣也然胃氣以下行為順脾氣以健運為能胃強

脾弱則消穀而便溏脾強胃弱則知饑而納少故胃陽虛飽食輒噉者宜溫通如橘紅

智枳壳半夏類若守補則壅忌地黃脾陽虛多食不化者宜香燥如砂仁丁香厚朴

草蔻蘇子殺茅若守補則壅忌地黃脾陽虛多食不化者宜香燥如砂仁丁香厚朴

雞內金若膩補則滯忌肉等脾胃陰虛不饑不食口淡無味者宜清潤以養之扁豆

石斛玉竹當歸白芍若消導則耗氣劫液忌枳朴積滯傷飲惡飲傷食惡食嘔而腹滿

麻仁梗米大麥仁若消導則耗氣劫液忌枳朴積滯傷飲惡飲傷食惡食嘔而腹滿

為胃寒生疾陳和胃二食填太陰腹悶絞痛為木鬱食厥急吐之用陰陽水燒鹽湯探

食留滯脘痞腹脹者為腑氣不宜消導之天和飲冷吐利脾元受困者溫其寒或溫中湯

飲去食下氣逆噦呃噎膈者開其鬱神香散加橘食後動怒腸滿而痛者平肝氣枳

香附青皮山飲酒傷中發熱嘔瀉者利其溼葛花解肝胃不和脉弦脘痺者泄木安土

枳子生白芍金橘益智良薑紅棗小麥脾腎兩衰虛寒滑脫者溫中補陽四維散但腎陽衰者二神凡嗜

熱酒者脘必瘀血宜鬱金木香喜冷食者症多中寒宜八味胃虛則嘔悸動風宜白

則口甜畏食佩蘭葉胃上逆則導其濁滯豆豉枳實竹茹甚則小承氣湯若飲食

清陽舉元溼傷脾胃腹腫便難宜兼升降則運化宣通厚朴積砂仁若飲食

不甘口苦不寐膽熱乘脾者宜導痰洩熱則土鬱舒丹皮山耗桑葉生棗仁食已吐酸

肝逆犯胃者宜降火洩濁則木鬱達成己丸加茯苓山其飲食減少有脾胃虛熱安
飲有中氣虛寒養中有中寒虛痞治中有思慮傷脾歸脾有脾溼水瀉加味平胃散有
胃氣痛逆調胃平不能食而瘦多脾虛宜山藥茯苓白朮炙甘草當歸白芍人參善食而
瘦多胃火去木通加生地白芍一切食滯成積消食凡旦晝陽盛穀氣易消食可飽暮
則陰盛穀氣難化食宜少夏暑秋涼晚餐尤宜簡泊則脾不因胃不滯矣

附方

補中益氣湯見一卷中風

和胃二陳煎夏陳苓草炮薑砂仁棗

大和中飲查朴枳夏陳乾薑澤瀉木香麥芽砂仁

理中湯見一卷中風

溫胃湯白蔻人參澤瀉益智砂仁厚朴甘草乾薑薑黃黃

神香散丁香蔻仁

葛花解醒湯見一卷溼

四維散人參四兩附子炮薑各二錢烏梅五分炙草一錢水拌蒸烘

二神湯乾再研每服二錢薑汁加吳茱萸五味名四神湯

八味理中丸理中加茯苓麥芽神麴砂仁

中溫陽腎陽補傷酒鬱開寒去中溫導消痰消中補

大胃氣胃瀉溼溼去傷思痞虛寒虛熱虛痞腸酸吐熱胆陽升滯導脾補熱痞滿痞

枳實消痞丸枳實 黃連各五錢 厚朴四錢 苓 朮 薑 草 夏 麥芽

生薑瀉心湯各二錢 連 參 草 夏 乾薑 生薑 大棗

異功散見一卷中風

小尿氣湯見一卷溫

舉元煎參 者各三錢 朮 草各一錢 升麻五分 薑 棗 水煎

溫膽湯見一卷溫 加人參 遠志 棗仁 熟地 名十味溫膽湯

戊己丸黃連 吳萸 白芍

黃連瀉心湯黃連酒炒水煎服

安胃飲見本卷脾胃

養中煎參 苓 薑 草 山藥 扁豆

治中湯參 朮 薑 草 青 陳 半 加生薑

歸脾湯見二卷勞瘵

平胃散見一卷溼 加扁豆 朮通 名加味平胃散

胃苓湯見一卷中風

調胃平氣湯見一卷中風

瀉黃散見一卷火

清胃 太清飲 知母 石斛 木通各一錢半 石膏三錢 麥冬二錢
 食積 消食丸 查肉 神麴 麥芽 蘿蔔子 青皮 陳皮 香附各二兩 阿魏一兩
 補元 參朮膏 人參 白朮

嘔吐論治

嘔吐症胃氣失降使然也。而多由肝逆衝胃致之。靈樞謂足厥陰所生病者胸滿嘔逆。是也。夫胃司納食。主乎通降。其上逆而嘔吐者。乃肝邪犯胃。或胃虛肝乘。故治嘔吐必泄肝安胃。用藥主苦降辛通。佐以酸泄。其肝陽上亢。食入嘔吐者。用苦辛降逆。如黃連 吳茱萸 半夏 厚朴 或苦酸泄熱 如烏梅 白芍 木瓜 枳 其胃陽衰 風木乘克 食入不變者 用 溫胃平肝 如人參 乾薑 丁香 香 半夏 其脾陽衰 不能運化 腹脹痛嘔者 用辛溫行滯 如砂 朴 薑汁之屬 或吳茱萸湯 其胃陽衰 不能運化 腹脹痛嘔者 用辛溫行滯 如砂 厚朴 神效 其胃虛客氣上逆 噫噎欲嘔者 用鹹以軟痞 重以鎮逆 如覆代 濁陰犯胃 吐黑綠苦水者 用辛熱開濁 理中湯 加川椒 牛其肢冷脉微時吐清水者 用辛熱扶陽 湯 附子理中 其肝火鬱熱 吞酸吐酸者 用辛鹹苦降 左金丸 或鹽炒 其胸痞痰阻 食已漾漾欲吐者 用辛泄 湯 生薑瀉心 湯 或二陳 其肝厥上逆 脘痛嘔涎者 用辛通佐以酸泄 如川椒 乾薑 桂枝 其因驚怒動肝 致脇痛乾嘔而液虛者 用辛通潤補 湯 大半夏 神麥冬 青皮 其支飲湯水下咽嘔吐者 用辛泄 小半 其肝陰胃津兩虛 肝風擾胃嘔吐者 用柔劑滋液熄風養胃 如人參 白芍 麥冬 阿膠 小其肝風犯胃嘔吐眩暈者 用苦酸

嘔吐
 其肝風犯胃嘔吐眩暈者用苦酸

以和陽如黃連白芍烏梅壯蠟之屬其嘔傷胃津熱邪乘胃食入即吐者用辛涼化痰溫胆湯如其氣衝如蘇子杏仁枇杷葉前胡山梔括蕤仁降香末其氣衝心痛飢不欲食吐蚘者用苦辛酸以伏蟲理中安蚘厥者如蘇子杏仁枇杷葉前胡山梔括蕤仁降香末臟寒蚘上入膈口乾心煩手足冷脈沉遲宜寒熱互用酸苦雜投烏梅臟厥者陽氣垂絕痛嘔不納躁擾不安安胃丸或牛夏瀉心湯其久嘔致傷肝腎并衝脈上逆者用溫通柔潤如茯苓茶當歸杞子其厥陰濁邪上攻痛從少腹逆衝為嘔者用辛溫泄濁如吳茱萸小茴其沙苑子鹿角霜其厥陰每食必吐者煮羊血皆立止

集諸名家嘔吐噦治法

有聲有物為嘔有物無聲為吐有聲無物為噦昔人以嘔屬陽明吐屬太陽噦屬少陽噦即東垣以三者俱屬脾胃虛潔古從三焦分別三因上焦在胃口主納中焦在中脘主腐熟水穀下焦在臍下主出而不納上焦吐者因於氣食已即吐渴欲飲水治當降氣和中中焦吐者因於積或先痛後吐或先吐後痛治當去積和氣下焦吐者因於寒朝食暮吐暮食朝吐溺清便閉治當通其閉溫其寒後人又分隨食隨吐為嘔小食入乃吐為暴吐生薑橘皮湯食已後吐為嘔吐橘皮半夏湯食久乃吐為反胃理中湯食食再而吐者為翻胃紫沉旦食暮吐暮食朝吐下焦病半夏生薑此從食下久暫分上中下脘而治者也古法嘔吐氣壅穀不得下小胃虛穀氣不行嘔而液傷大胸滿

嘔吐脉候

陽緊陰數為吐。陽浮而數亦為吐。脈緊而滑者吐逆。緊而濇者難治。寸口脈數者吐。脈弱而嘔。小便復利。身有微熱。見厥者死。嘔吐大痛。色如青菜汁者死。中焦噦逆。其聲短。是水穀之病。為胃火。易治。下焦噦逆。其聲長。是虛邪之病。為陰火。難治。低聲頻密相

連為實。易治。半响噦一聲為虛。難治。暴病發噦必痰食血。或怒氣所干。易治。久病發噦者多難治。

附方

左金丸 見一卷大

戊己湯 見本卷飲食

吳茱萸湯 吳茱 人參 薑 棗

香砂六君湯 六君子加 木香 砂仁

旋覆代赭湯 人參 甘草 旋覆花 代赭石 半夏 薑 棗

二陳湯 見一卷中風

理中湯 見一卷溼

真武湯 見二卷喘

生薑瀉心湯 見本卷飲食

大半夏湯 半夏 人參 白蜜

小半夏湯 半夏 薑

溫膽湯 見一卷溫

理中安虬湯 參三錢 術 苓 薑各一錢半 川椒炒十四粒 烏梅三個 不用甘草忌甜

肝平 肝平 胃寒 行滯 逆鎮 除痰 扶陽 祛寒 消痞 液虛 水行 化痰 伏蛇

氣漏鬱脾胃溫寒逐逆散厥吐飲泄開通積去胃反吐暴吐嘔吐暴嘔止吐伏厥

烏梅丸烏梅連 細辛 附子 桂枝 人參 黃蘗 當歸 川椒 乾薑 黃

安胃丸烏梅青皮 川椒 川附 桂枝 乾薑 黃蘗 黃連 川棟子 廣皮

半夏瀉心湯見一卷溫

生薑橘皮湯橘皮 薑

橘皮半夏湯橘皮 半夏 薑

枳桔湯枳 桔 陳 朴 木香

金花丸生南星 生半夏各一兩 天麻五錢 雄黃二錢 白麴三兩 滴水

紫沉丸否 醋糊丸 陳 夏 砂仁 烏梅 丁香 檳榔 沉香 木香 巴霜

半夏生薑天黃湯夏 薑 大黃

猪苓散猪苓 赤苓 白朮

橘皮湯橘皮 生薑

橘皮竹茹湯橘皮 竹茹 加薑汁 人參 甘草 大棗

半夏乾薑湯半夏 乾薑 漿水煎

紅豆丸丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十一粒 薑汁糊丸 以大棗一枚去

歸脾湯核填入一卷勞瘵

麥冬湯麥冬 參 朮 陳 苓 竹茹 甘草 蘆根 玉竹 陳米 薑

走嘔鎮墜鎮逆

人參湯

人參

黃芩

知母

玉竹

蘆根

竹茹

白米

梔子

陳皮

石

靈砂丹

見二卷喘

養正丹

硝石 硫黃各一兩研末入磁器內微火炒再研次用水飛

一名五靈脂 青皮 陳皮各二兩

醋糊丸豆大每服三十丸

元精石一

飲下 又名黑錫丹

比和丹

四君湯加

陳皮

砂仁

藿香

神曲

陳米

伏龍肝

薑

棗

藿香安胃散

橘皮

人參

丁香

藿香各二錢五分

竹葉石膏湯

見一卷傷風

二朮二陳湯

見二卷痰飲

溫胃飲

見一卷中風

嘔吐

叔

深秋吸受穢邪嘔吐不已先服藿香正氣散入口即吐身熱足厥面黑眶陷或進

導痰溫胃飲嘔惡不納診之脈虛少神予謂此中宮虛極也速用潞參山藥茯苓炙

草白朮橘白蘇子蓮子紅棗煨薑梗米煎稍稍與服竟不吐思食粥矣後加減數味

調理而康

李軀由腰痛續得寒熱嘔吐汗出畏冷寸關脈伏兩尺動數思高年水穀不入嘔多胃氣先傷况寸關脈不見陽氣已虛足必時厥宜其汗出而畏冷也自述脛寒至膝乃

用煨薑汁熱服嘔定即與粥湯右脈畧起因與吳茱萸湯脈症悉平

族某胸痛食減吐酸由肝逆濁泛用吳茱萸厚樸枳殼青皮半夏茯苓為末空心日再服金橘皮泡湯下效

夏氏兩寸洪大兩關弦滑嘔逆耳鳴口乾頭暈白帶連綿症屬肝胃不和吳茱萸黃連生

白芍山梔半夏

青蓋炒

茯苓蘇子枳殼薑霜三服症平

李脈洪大搏指口乾煩欬食後吐水頭目震眩而心悸此勞力傷陽陽化內風上冒

清道風翻則水湧胃虛則木乘故嘔眩不已其水停膈間心必悸津不上朝口必乾

氣不下降便乃秘治先和陽降逆山梔甘菊

炒

冬桑葉茯苓蘇子杏仁

俱炒

牡蠣服

海浮石淡竹茹前胡三服症平脈較斂其神倦者火風逆勢已折也減甘菊桑葉加

白芍茯神枯薑半夏潞參和肝胃以清滌痰火遂愈

族女情志怫悒頭眩頰赤夏初食入即吐脈虛小經期錯亂由肝膽火風侮胃不及傳

變傾翻甚速且胃虛作呃木氣乘土久則衝脈失涵絡傷內溢以衝為血海隸在陽

明也先在苦以降逆山梔羚羊角竹茹旋覆花半夏鞠柿蒂三四服眩吐止去羚羊

角半夏麴加阿膠

化

丹皮白芍茯苓甘草調養肝胃而經期順

噎膈反胃論治

陽結陰澀上下格拒而噎膈反胃之症成人身上下七門

自飛門至魄門

咽為吸門

即會厭氣喉上揀飲

食胃上口為青門。胃下口為幽門。幽門上衝吸門。其吸氣不得下歸肝腎。為陰火格拒。故噎膈不通。甚則反胃。分言之。則噎者咽下梗塞。水飲可行。食物難入。由痰氣之阻於上也。膈者胃脘窄隘。食下拒痛。由血液之槁於中也。反胃者食入反出。完穀不化。由胃陽之衰於下也。而昔人通謂之膈。黃帝鍼經云。胃病者。膈咽不通。飲食不下。丹溪云。血出槁在幽門中。焦膈也。朝食暮吐。暮食朝吐。槁在關門下。焦膈也。經云。三陽結謂之膈。以手太陽小腸主液。足太陽膀胱主津。胃大小腸此經內經王註。金鑑指二腑熱結。則津液枯燥。前後秘瀆。下關既局勢必上湧。故食噎不下。即下而仍出。是火上行而不下降矣。王太僕亦云。食不得入。是有火也。食入反出。是無火也。噎膈初起。多因憂悲。怏怏以致陽結於上。陰澇於下。醫鑑心脾之勞。思食氣也。飲食猝阻。不能下。五膈憂悲。寒食氣也。治宜調心脾以舒結氣。湯去木養心。湯去桂填精血以滋枯燥。九反胃初起。多因土弱火衰。以致朝食暮吐。暮食再加歸芍香附。再吐治宜扶胃土以通陽。異功散加益智。仁梗米益命火以蒸化。丸味其立法。要使辛滑通痞。薑汁竹瀝貝母杏仁而脫痺。以開甘酸。化陰。人參天冬麥冬。煎汁而液枯以潤。或健脾胃理痰。二陳湯加竹茹。不偏任溫燥。以劫液。或滋陰養血。生地阿膠牛乳梨汁。不偏用清潤。以助痰氣。滯成噎者。宣理氣。隧九香蟲丁香。皮殼鬱金檀香。血瘀成膈者。兼通經絡。桃仁紅花。延胡當歸。雞血藤。膏土材治血。積壳廣皮。廣木香。血瘀成膈者。兼通經絡。五靈脂歸尾。桃仁鬱金。雲峻人參。散用冰。腐亦同此法也。因胃陽虛而濁瘀反胃者。用通補胃腑。辛熱洩濁法。陳皮半夏砂仁。黃連杏仁。橘

蘇子半夏因肝鬱氣逆用兩通厥陰陽明法當歸白芍香附半夏因酒熱鬱傷脾胃用輕

劑清降枇杷葉杏仁鬱金及苦辛開肺法桔梗貝母薤白其由憂思傷脾氣鬱生涎

飲可下食難入香砂寬中丸由七情鬱結胸脘拒痛脈必沉濇七氣湯加鬱金由痰飲

阻滯嘔吐翻胃去青皮檳榔由七情鬱結枳殼竹瀝由痰血積滯傳化不變反上行

者脈必孔濇滋血潤腸至脾氣敗血液耗胃脘枯槁溺少便秘補氣健脾丸參入滋血

若口吐白沫黃如羊屎不可治矣勉用薑汁杏酪白蜜醫學心悟云開關散最效又如

五汁飲以清燥利膈丸以通壅汞硫散以止吐總忌香燥破氣辛熱耗液惟一種胃陽

衰不能運化者暫用辛溫開結繼仍以益陰養胃為宜梗米人參山藥膈症生蟲用河

黃有梅核膈吐不出燕不下咽喉妨礙由氣鬱痰結滌痰由死血昆布當歸桃有翻胃

食入即翻出或痰或熱壅阻膈間非如反胃之早食晚吐晚食早吐也陳湯二

再論噎由氣結膈由痰與氣逆或血瘀一種氣噎臨食輟箸噎阻沫升氣平食入病在

上焦肺胃間治以輕揚利膈苦降則過病所一種痛膈食下格拒嘔涎饑痛而饑欲中

焚病在中焦治以辛香通降不效必兼理血絡一種胃槁脘係窄隘即勺飲亦妨礙由

衰年血液漸枯胃管局閉飲入則涎升淚出二便俱少開合都廢治以辛滑潤養大忌

香燥耗液剛熱劫陰此脫血失榮下咽易梗一切礙滯閉氣食品咸宜禁忌嘗見食冷

山芋而成噎者食雞子而哽咽成膈者若再憂思鬱結於中而莫解情志之病尤難

霍然徐靈胎謂噎膈症十死八九反胃症十愈八九再論反胃由食久不化腐濁上攻徹底翻瀾二腸失司傳送病在幽門以下古法多謂胃中無陽精微不能蒸化然經云諸嘔吐逆皆屬於熱且胃津先奪熱燥難投必細參脈症或苦降辛通宣行壅滯曾記一壯年反胃吐食服入味湯暫止復吐食羊血得愈又沉姓年高嗜飲兼情悒不遂吐沫拒食半載未愈一老醫投藥四劑病勢減半再用十劑料浸酒服而全愈方用大生地五錢海浮石兩烏藥錢牛膝靈慈石雲苓歸身各三錢玩此方兼溫清鎮泄升降氣血性味不偏傳者目睹治驗因附記備參

病愈後禁忌

凡噎膈反胃得藥而愈者不可便與粥飯惟以真人參五錢陳皮二錢老黃米兩作湯細啜旬日後方可食粥倉廩未固便進米穀常致不救又一年之內切忌房慾犯之必舊症復發而死

噎膈反胃脈候

緊而滑者吐逆小弱而濡者反胃噎膈反胃脈浮緩者生沈濡者死沈濡而小為血不足大而弱為氣不足

附方

調脾歸脾湯見二卷勞瘵