

胡
甘
人參
茯苓
白朮
黃芩
當歸

芍藥
葛根
右咬咀水一鍾薑三片煎服

薛方

柴胡清肝散見肝熱

六味地黃丸見腎

導赤散見心部

秘旨安神丸見心部

瀉白散見肺部

秘旨保脾湯見脾部

二黃犀角散見溫壯

四物湯見失血

當歸補血湯見虛熱

六神散見夜啼

曾氏方

百解散 主和解有病虛慢陰證不宜

乾葛二兩半

升麻

赤芍藥各二兩

黃芩一兩

麻黃製七兩半

薄桂去籠皮二兩半

甘草一兩半

右碎每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服有風熱

盛加薄荷同煎

富歸散 順調氣血和解表裡爽利心腹疎理百病及治溫熱停積

自痢煩躁不寧

當歸 去蘆酒洗

赤芍藥 各二兩

甘草 半生半炙一兩

大黃 半生半泡一兩二分

川芎

麻黃 製各半兩

右碎每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

三解散 一名寧心湯

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水齬嗜

煩悶丹毒口瘡痰嗽諸聖

人參

防風 各去蘆

天麻

茯神 去皮木根

鬱金 如無山梔仁代

白附子

大黃 各二兩

赤芍藥

黃芩

殭蚕 各五兩

全蝎 十五尾去火毒

枳殼 二兩如

粉草 六兩

右碎焙為末每服半錢至一錢用溫薄荷湯無時調下或燈心湯

大柴胡湯

解利風熱痰嗽腹脹及裡證未解

柴胡 去土

黃芩 芍藥 各一兩半

黃

半夏

如前製各七兩半

枳實

如前製
七升

甘草

一兩小方
故加用

右碎每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

小柴胡湯

半表半
裏熱

晝熱全嬰方小兒每早食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或為疳熱不知此血熱證也宜龍膽丸與黃膏之類時時與服即瘥按全嬰方所云血熱者已午發熱遇夜則涼與東垣所謂夜則發熱晝則明了不同然東垣所云血熱者指陰虛而生內熱也夜則發熱晝則明了取其晝陽夜陰也鄭氏所云血熱者指小兒時盛實而言也蓋謂已午者心火用事之時也心主血血氣行于已午則陽氣盛陽氣與正氣相搏故至期而發熱非其時者非血熱也薛一小兒寅卯時發熱或兼搐有痰服抱龍瀉青二丸而愈後復患服前藥兼咳嗽氣喘不時發搐面赤色或青黃或浮腫或流涎予謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐肝木乘脾也面青黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛

也用益智丸以養心血補中益氣湯以補脾氣而愈一小兒巳午時發熱驚悸發時形氣息倦面黃懶食流涎飲湯予謂心氣不足所致不信反服涼心之藥更加吐瀉睡而露睛手足並冷幾至慢脾風先用六君薑桂湯佐以地黃丸而愈一小兒申酉時發熱面赤腹中作痛或用峻利之劑下之致發搐吐痰作渴腹痛按之即止此脾胃傷而變證也用七味白朮散補中益氣湯頓安

龍膽丸 治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證疳熱皆可治

宣黃連

大毛

赤芍藥

各半

草龍胆

去

青皮

去穢各二各半

檳榔

大者

麝香

少許

服

右爲末猪胆汁少入麪糊爲丸蘿蔔子大每三二十九米飲空心

六合湯

治小兒血熱每日巳午間發熱遇夜則涼

當歸

大黃

川芎

熟地黃

石為末三錢一錢水半盞煎至三八分服

猪膽丸 治小兒每日早飯後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連

半斤

宜黃連

赤芍藥

各半

右為末猪膽汁和成劑入在猪膽中懸用漿水煮熟取出飯為丸

如豆大三歲三十丸六歲六十丸服無時

夜熱海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也脈經云小腸有

宿食症晝發熱明日復止此宿食夜熱也 錢治一小兒亥子時

發熱形氣倦怠面黃嫌食流涎飲湯用益黃散而愈後復發服前藥

及清熱之劑病發不時嗜臥露睛作渴少食大便頻黃此脾虛而肝

木勝之兼元氣下陷也用補中益氣湯佐以地黃丸而愈又治一小

兒夜間發熱腹脹此脾虛肝盛朝用五味異功散夕用四味肥兒丸

熱止乃朝用六味地黃丸夕用異功散而痊 錢朱監簿子五歲夜

發熱陸即如故與醫有作傷寒治者有作熱治者以涼藥解之不愈

其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢
曰不可下之乃取白水散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱生曰
飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也但不可下耳朱
生曰先泊何病錢曰熱治痰退熱清神皆此藥也至晚服盡錢視曰
更可服三升又煎白水散三升服盡得稍愈第三日又服白水散三
升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安湯風痰熱晚熱早涼喫
水無時此候乃痰作潮而生風熱即宜金星丸下之或氣弱者不可
下宜奪命散以探下涎次服惺惺散加南星白附子

四順飲

益黃散

補中益氣湯

地黃丸

異功散

四味肥兒丸

白朮散

金星丸 治風熱結聚喉內痰鳴喘粗咳嗽面紅頰腫咽膈壅塞發

地狂躁多渴

金末 雄黃 另研各 賦粉 巴豆 七枚

右為末米醋糊丸麻子大薄荷臘余

奪命散

見傷

惺惺散

見傷

四物二連湯

治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則發熱脇肋并一

身盡熱日晡肌熱

當歸

生地黃

白芍藥

川芎

黃連

胡黃連

各等分

右水煎服

積熱久熱也疳熱亦久但兼面黃喫炭土鼻下爛也 三因小兒積

熱者表裡俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便秘黃先以四順清

涼飲子利動藏府則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用

惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也

世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天

傷者甚多此表裡俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證

也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內身體便涼熱重者

用銀白散

會積熱服胞浮腫面黃足冷發熱從頭至肚愈甚或聞

飲食之氣惡心及腸疼嘔吐治法詳載傷積論中 按曾氏所謂積

熱乃指腹中有癖而熱與久積之積不同不妨並存之

清涼飲子

裏熱

惺惺散

痘疹

紅綿散

白僵蚕

天麻

生用

南星

切薄片油浸黃二升

蘇木節

另研一升

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分溫服凡小

兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心躁渴

者人滑石末半錢同煎服之

六神散

人參 白茯苓 乾山藥 白朮 白扁豆 甘草

各等分

右為末每服一錢水一小盞入一枚薑二片同煎至五分服此

藥用處甚多治口冷加附子治風口天麻治痢加鶯粟

銀白散

乾山藥

白朮

白茯苓

各半

人參

白匾豆

知母

甘草

升麻

各等分

右為末

每服一大錢水一小盞漿一

枚生薑二片同煎溫服不拘時候

桃枝九疎取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜

大黃

黃蘗

各半

輕粉

桐砂

各半

右細水熬糊丸粟米大煎桃枝湯下一晬兒五七九五六歲二三

十丸末晬兒二三丸臨臥服

梔子散

治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梔子仁

七

豆豉

十

右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不吐立效

梔子湯 治小兒積熱心臟小便赤腫口內生瘡

梔子仁

木通

當歸尾

白芷

各二

防風

甘草

各一

右為細末麥門冬煎湯送下

三黃丸

性熱

曾玉露飲

治煩赤咽乾心煩躁睡不穩身熱頭痛兼中暑發渴昏

悶小便不通務氣入腎夢中齒牙加金珠散荊荷湯空心調服

寒水石

中有細紋手可碎者

石膏

潔白堅硬而有墻壁者各一月

甘草

三冬晒乾天陰火焙

右除前二味外甘草剉曬或焙同為細末每服半錢至一錢溫湯

無時調服或麥門冬熟水

益元散

解暑毒利小便理煩渴除驚悸

滑石

粉草細切

右二味或曬或焙研為細末每服一

錢至二錢溫湯水無時調服涼水亦可

萬安飲

推陳出新除邪輔正和益脾胃宣通氣血調順飲食疎解

風寒寧心化痰去煩理熱不拘證在表裡並宜可投常服百病不

生真元益固補養諸虛亦有奇驗此是宜明論當歸飲相類不遠

治注夏多其藥品之外惟加枳殼半夏

人參去蘆

當歸洗酒

大黃生用

芫胡去蘆

枳殼去穢炒

半夏製

芍藥洗酒

黃芩

防風去蘆

甘草一味各一兩

滑石末

六兩

右剉除滑石末臨入和勻每服二錢水一盞薑二片煎七分無時

溫服或加葱一枚同煎

調胃散 桃枝丸取積熱後服之

人參三錢

白朮二錢

甘草炙

白茯苓

瞿粟子

各一

白附子半

藿香

丁香各半

右爲末紫蘇湯下半錢或一錢

寒熱寒熱者證如瘧狀陰陽相勝也先寒而後熱陽不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱隔日陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒也其有頭疼汗出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而飲湯者有筋骨

疼痛者或瀉或秘或內寒而外熱或內熱而外寒又有寒而腹中痛鳴
是有食積也治法因於食積者當用白餅子下之次行補助以錢氏
白朮散寒多熱少者小柴胡湯加桂熱多寒少者白虎湯加桂寒熱
相半者並用小柴胡湯主之 薛經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽
盛則外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣並於陰
則發寒陽氣並於陽則發熱寸口脉微爲陽不足陰氣上入陽中則
惡寒尺脈弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱
陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱
下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調故邪氣
更作而寒熱往來或乍寒乍熱也少陽膽者肝之府界乎太陽陽明
之間半表半裡之分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以
小柴胡湯加減調之若祇見寒熱起居如常久而不愈及大病後元
氣未復悉屬陽虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補之甚者十全大補

湯有食積為病亦令寒熱用保和丸消之若兼嘔吐泄瀉用六君子湯厥冷飲熱人參理中丸作渴不止七味白朮散食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮所不勝也用異功散加柴胡山梔其瘧證寒熱詳見瘧門

白餅子

白朮散

小柴胡湯

白虎湯

八珍湯

十全大補湯

保和丸

六君子湯

人參理中丸

異功散

變蒸熱變者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺

性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精

神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生

至三十二日一變生癸屬足少陰腎藏精與志六十四日二變一蒸

生壬屬足太陽膀胱其發耳與鼈冷至九十六日三變生丁屬少

生壬屬足太陽膀胱其發耳與鼈冷至九十六日三變生丁屬少

陰心經心藏神其性爲喜一百二十八日四变二蒸生丙屬手太陽
小腸其發汗出而微瀉一百六十日五变生乙屬足厥陰肝肝藏魂
喜哭一百九十二日六变三蒸生甲屬足少陽膽其發目不閉而赤
二百二十四日七变生辛屬手太陰肺肺藏魄生穀二百五十六日
八变四蒸生庚屬手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗二百八十八
日九变生己屬足太陰脾脾藏意穀至三百二十日十变五蒸生戊
屬足陽明胃其發不食嗔而吐乳又手厥陰心包絡手少陽三焦
此二經俱無形狀故不变而不蒸也前十变五蒸乃天地之數以生
成之然後始生而能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長粹
骨於十变後六十四日爲一大蒸計三百八十四日長其經脈手足
手受血故能持握足受血故能行立經云变且蒸謂蒸畢而足一歲
之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治又六
十四日爲一大蒸計四百四十八日又六十四日三大蒸計五百一

十二日共五百七十六日變蒸既畢兒乃成人也變者變生五臟也
蒸者蒸養六腑也所以成人變者上蒸蒸者體熱每經一變一蒸情
能既異輕則發熱微汗其狀似蘄重則壯熱脈亂而數或吐或汗或
煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸
之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷體冷上脘發泡狀如泡珠若寒邪
搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之數日夜不絕變者易也蒸於
肝則目眩微赤蒸於肺則囁嗽毛聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各
有證應其治法和平之劑微表之熱實者微利之或不治亦自愈

湯千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九
十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十
二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸
二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸
畢後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復

大蒸凡小兒自生三十二日一變再變爲一蒸凡十變而五小蒸又
三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是
榮其血脈改其五臟故一變竟輒覺情態有異其變蒸之候變者上
氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體熱而微癢耳冷尻冷上唇頭白
泡起如魚目珠子微汗出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食
食輒吐呢目白睛微赤黑睛微白又云目白者重赤黑者微變蒸畢
自精明矣此其證也單變小微兼蒸必劇凡蒸平者五日而衰遠者
十日而衰先期五日後則五日爲十日之中熱乃除耳或違日數不
歇切不可妄治及炙刺

海藏云言變蒸通一十八次蓋前三百二十
日爲十小蒸後二百五十六日爲十大蒸也

呢乎典切不
嘔而吐也

無若身熱耳熱尻亦熱此乃微病可作別治

薛變

蒸治法平和者微表之實熱者微利之古方紫霜丹黑散子柴胡湯
皆可有寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之前證益小
兒所不免者雖勿藥亦可也前藥雖非惟臟腑不勝亦且屢傷氣

血余膏 小兒至一歲發熱有痰投抱龍丸一粒卒至不救慎之

慎之其有不熱不驚略無證候而暗變者蓋受胎氣壯實故也

紫陽照散 治小兒變蒸壯熱亦治傷寒發熱

麻黃 二升 大黃 一名同刺 杏仁 二升 右件同一處搗和並略燒存性再以杏仁研膏和之密器盛每服

一豆許乳汁調和灌之

紫霜丸 癖積

柴胡湯 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 甘草 微炙 麥門冬 去心各 龍胆草 酒炒 防風 各一

柴胡 五 右每服一錢水煎

當歸散 治變蒸有寒無熱

當歸 仁 木香 官桂 揀者 甘草 炙 人參 各一

右每服一錢薑枣水煎