

傷寒撮要

傷寒提要卷一

目錄

發頤

自汗

盜汗

頭汗

手足腋下汗

畜血

衄血

吐血

便血

兼便膿

熱入血室

手足厥逆

藏厥

動氣

藏結

下利

協熱下利

小便不利

小便自利

小便數

渴證

嘔證

吐證

呃逆噦噫

喘急短氣

頭眩

咳嗽

煩躁懊懷

傷寒撮要卷三

蒲城王夢祖竹坪編輯並註

桂林張琮石鄰重鐫

發頤

謹按

醫宗金鑑傷寒頤毒皆因汗下失宜熱毒挾少陽相火上攻而成也。若其人陽氣素盛則高腫焮紅疼痛易於成膿為順宜連翹敗毒散散之。或其人陽氣素虛或服冷藥過多遏鬱熱毒伏藏在裏內攻神昏外毒漫腫肉色不變不疼不硬則難治也。毒

伏未發之前。往往似三陰亡陽之證。脉隱不見。柔汗淋漓。肢冷。若冰。但身輕目睛了了。煩渴不大。便指甲紅紫。為異。此毒發始。臨治不可忽也。

陳素中辨證曰。傷寒汗出不徹。熱遺少陽。結於耳後或耳下。其形鞭腫者。曰發頤。速宜消散。緩則成膿。為害頤。屬陽明經部分。發於頤藥中。必加白芷。葱白。以通陽明之經。慎不可外敷寒涼藥。

連翹敗毒散

即局方涼膈散。

方見兩感門

亦名清涼散。治實熱諸

證

自汗

李士材曰自汗惡風寒者桂枝湯

方見六經證治門

惡寒自汗表虛

也小建中湯

方見頭痛門

或黃耆建中湯

方見背惡寒門

自汗不惡風寒

表證罷裏證實也承氣湯

方見六經證治門

汗多小便利必津液竭

大便雖鞭不可攻宜蜜導

用蜜於銅器中微火熬稍凝攪之勿令焦皂角末少許和入乘熱捻作棗

子樣冷納谷道中欲大便急去之

自汗而渴小便難五苓散

方見發熱門

汗多

不止曰亡陽桂枝附子湯

方見身痛門白芷各一兩

牡蠣粉米粉各二兩細

未紗囊周
身撲之

謹按

醫宗金鑑自汗在太陽謂之風邪桂枝證也在陽明謂之熱越

白虎湯

方見兩
感門

證也若大熱蒸蒸汗出過多則宜調胃承氣湯

方見六經

證治門

急下其熱而救其津液也設更兼發熱下利不休內

外兩脫必凶

陳素中辨證曰自汗者不因發散而自然汗出也自汗出小便

難脈沉者桂枝附子湯加茯苓自利厥逆大汗出者四逆湯

方見六經
證脉門

溫熱病誤服表藥。大汗出。煩渴不止。脉洪大者。白

虎湯主之。若發熱而下利。自汗不止者死。若大汗出。其熱反盛。

狂言不食者死。汗出髮潤。喘而不休者死。汗出如珠者死。

盜汗

張仲景論曰。微盜汗出。反惡寒者。表未解也。宜小柴胡湯。方見表裏

辨門。陽明證。脉浮者。必盜汗出也。陽明證。身熱。目疼。鼻乾。不眠。脉洪而長。若浮則盜汗出也。

當歸六黃湯。方見剛瘕。柔瘕門。主之。

李士材曰。盜汗者。邪在半表半裏。膽有熱也。

張景岳曰古法云自汗屬陽虛腠理不固衛氣之所司也人以
衛氣固其表衛氣不固則表虛自汗而津液為之發泄也治宜
實表補陽盜汗屬陰虛陰虛者陽必腠之陽蒸陰分則血熱血
熱則液泄而為盜汗也治宜清火補陰此其大法也然自汗亦
有陰虛盜汗亦多陽虛如遇煩勞大熱之類最多自汗或以飲
食之火起於胃或以勞倦之火起於脾或以酒色之火起於腎
皆能令人自汗若此者謂非陽盛陰虛而何又若人之寤寐總
由衛氣之出入衛氣者陽氣也人於寐時則衛氣入於陰分此

時非陽虛於表而何可知自汗盜汗之證各有陰陽之異不得
謂自汗必屬陽虛盜汗必屬陰虛也然陰陽之異何以辨之但
察其有火無火則或陰或陽自可見矣蓋火盛而汗出者以火
燄陰陰虛可知也無火而汗出者以表氣不固陽虛可知也
又曰汗發於陰而出於陽其根本則由陰中之榮氣其啟閉則
由陽中之衛氣凡欲疏汗而不知榮衛之盛衰禁汗而不知橐
籥之牝牡其猶盪舟於陸而駕車於海耳

頭汗

謹按

醫宗金鑑頭汗出劑頸而還則為熱不得外越上蒸於首也或因黃鬱未發或因溼家誤下或因水結胸蒸或因火却熱逼或因陽明蓄血或因熱入血室皆令成之分門施治可也

李士材曰陽氣上騰頭汗出譫語宜承氣湯

方見六經證治門

心下

滿頭汗出水結胸也小半夏茯苓湯

方見結胸門

頭汗出劑頸而

還小便不利而渴身必發黃也茵陳五苓散

陳素中辨證曰陽明病下血譫語此為熱入血室但頭汗出者

小柴胡湯

方見表裏辨門

加牡丹皮

傷寒五六日已發汗而復下之

胸脇滿微結

小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩及

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭

脈細結邪在表裏間俱與小柴胡湯中涇誤下頭汗出小便

利者死下後額上汗出而喘小便反秘者死關格不通不

得溺頭無汗者生有汗者死元氣下脫額上汗如珠者死

茵陳五苓散

金匱

治頭汗出發黃秋疫瀉及黃疸

茵陳

三錢

五苓散

二錢

每服二錢米湯調服

手足腋下汗

陳素中辨證曰傷寒潮熱手足心澀澀汗出陽明胃實也腋下

澀澀汗出兼少陽膽實也大便秘鞭者以大柴胡湯方見發熱門下

之大便不鞭者且與小柴胡湯方見表裏辨門和之病人手心汗出

大便燥而譫語者調胃承氣湯方見六經證治門下之士材亦用大承氣湯陽

明病發熱目痛鼻乾不眠中寒不能食小便不利水穀不分手足汗出者

此欲作痼瘕大便必初鞭後溏不可下宜厚樸生薑甘草半夏

人參湯方見腹滿門理中湯方見六經證治門加木香檳榔士材亦云宜理中湯

謹按

醫宗金鑑胃主四肢為津液之主。今熱聚於胃，蒸其津液，旁達於四肢，故手足澀澀然汗出也。小便利，胃中津液必乾，大便必鞭，本當攻也。若中寒，胃陽土虛，脾不約束津液，橫溢四肢，猶如陰盛，淫雨滂沱，故汗出而冷也。陽虛失運，中寒不化，故小便不利。雖便鞭而手足汗出，非熱越者，比慎不可攻。攻之必變生痼瘕，泄瀉澄清不止也。痼瘕冷積也。

畜血

張仲景論曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也。太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也。小便自利其人如狂者血證諦也。大抵熱畜血分留結下焦則生狂燥熱結膀胱其人如狂者畜血也。陽明證其人喜忘糞雖鞭而大便反快其色黑亦是畜血之證

張景岳曰凡診諸證但其少腹鞭滿而痛便當問其小便。若小水自利者知為畜血之證。蓋小水由於氣化病在血而不在氣。故小便利而無恙也。血瘀於下血去則愈。在仲景只以抵當湯

丸。方見身痛門主之。愚謂但以承氣之類加桃仁紅花以逐之。其或