

真言宗
治表
卷二

類證治裁卷之二

丹陽林珮琴義爾重著

虛損勞瘵論治

男 芝本校

經言精氣奪則虛。凡營虛衛虛。上損下損。不外精與氣而已。精氣內奪。則積虛成損。積損成勞。甚而為瘵。乃精與氣虛憊之極也。素問論五勞。謂久視傷血。久卧傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。金匱論五勞。謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。越人謂自上損下者。一損肺。嗽。勞。二損心。盜。汗。三損胃。減。食。四損肝。鬱。怒。五損腎。淋。過。胃。則不治。自下損上者。一損腎。遺。濁。二損肝。脇。痛。三損

脾。脹。瀉。四。損。心。驚悸不寐五。損。肺。欬過脾。則。不。治。誠。以。脾。胃。為。精。與。氣。生。

化。之。源。也。故。治。虛。勞。以。能。食。為。主。考。難。經。治。法。損。其。肺。者。益。其。氣。

保元湯。損。其。心。者。調。其。營。衛。八珍湯。損。其。脾。者。調。其。飲。食。適。其。寒。溫。四君

湯。損。其。肝。者。緩。其。中。牛膝丸。損。其。腎。者。益。其。精。金剛丸。此。固。治。損。之。

要。矣。尤。必。先。辨。其。陽。虛。陰。虛。經。曰。陽。虛。生。外。寒。陰。虛。生。內。熱。凡。怯。

寒。少。氣。自。汗。喘。乏。食。減。無。味。嘔。脹。飧。泄。皆。陽。虛。症。也。此。脾。肺。虧。損。

由。憂。思。鬱。結。營。衛。失。和。惟。四。君。保。元。建。中。養。營。歸。脾。諸。湯。宜。之。若。

怔。忡。盜。汗。欬。血。吐。衄。淋。遺。崩。漏。經。閉。骨。蒸。皆。陰。虛。症。也。此。心。肝。腎。

虧。損。由。君。相。火。炎。精。髓。枯。竭。惟。補。心。三。才。六。味。大。造。固。本。諸。湯。宜。

之。又。若。腎。中。真。陽。虛。者。右尺必弱宜。甘。溫。益。火。之。品。補。陽。以。配。陰。八味丸

或景岳右歸飲所謂益火之源以消陰翳也腎中真陰虛者左尺細數

宜純甘補水之品滋陰以配陽六味丸加杞子魚鰾或景岳左歸飲所謂壯

水之主以鎮陽光也陽虛不復久則吸短偏卧脉弱陽痿宜參朮歸耆杞

子山藥胡桃龍眼蓮棗沙苑子骨脂人乳鹿茸鹿膠羊肉羊腎海參陰虛不復久則咽瘡音啞色悴

肌羸宜麥味杏仁熟地首烏苳蓉燕窩烏雞而勞瘵成矣由是火

炎於上為嗽血宜五汁膏為潮熱宜清骨散火動於下為遺濁宜龍齒丸為泄瀉

宜三白廣生湯而治療難矣夫水為萬物之元孫真人所以云補脾不若

補腎土為萬物之母許學士所以云補腎不若補脾然喜燥者脾

喜涼者腎欲補腎易傷脾欲補脾易傷腎不知土為金母金為水

母勞瘵至陽虛泄瀉宜溫以補脾然補脾須不礙肺勞瘵至陰虛

嗽熱宜潤以滋腎。然滋腎須不妨脾。補脾佐以五味。杞子。不得偏

用辛溫以助火。桂附之屬。亦不得偏用苦寒以戕胃。知藥之屬。且虛勞以受

補為可治。不受補為不治。如用人參之甘溫。則大熱可除。乃陽生

陰長之理。所謂血脫者。益氣而葛可久治。勞十方用參者七也。故

日土旺而金生。勿拘拘於保肺。水壯而火熄。毋汲汲於清心。

夫五勞者。勞傷五臟。乃虛損之源。而六極七傷。又虛損之流。極勞

瘵之深根也。如皮毛枯槁。為肺勞。人參黃耆散。血脉不榮。為心勞。大五

食少肌消。為脾勞。橘皮煎。血虛筋緩。為肝勞。黑腹腫足弱。為腎勞。腎

丸。六極者。數轉筋。指甲痛。為筋極。滋補養營丸。牙疼踵痛。不耐久

立為骨極。茸珠丸。面色無華。頭髮墮落。為血極。補營湯。膚如蟲行。體肉

乾黑爲肉極參苓丸肌無膏澤目無精光羸瘦肌癢搔則爲瘡爲精

極巴戟丸胸脇逆滿吸短難言爲氣極益氣丸七傷者一陰寒二陰痿

三裏急四精漏五精少六精滑七溺數併宜鎖陽丹丸龍丹

凡虛損症多起於脾胃勞瘵症多起於腎經虛損潮熱多起於內

傷勞瘵陰虛火動多起於傷風似瘧虛損蒸蒸發熱按至皮膚間

甚熱不能食不覺瘦脉豁大重按無力勞瘵骨蒸按之皮膚不熱

按至筋骨乃熱能食而瘦脉弦數虛損轉潮熱泄瀉脉短數者不

治勞瘵轉陰虛火動喉痛脉細數者死虛症頰赤或唇紅陰虛逼

陽於上也音瘖腎氣竭也欬而喘急肺虛氣不歸腎也喉乾咽痛

真水涸虛火炎也不眠恍惚血不養心神不能藏也時多煩躁陽

中無陰。柔不濟剛也。飲食不甘。肌肉漸消。脾元敗也。盜汗不止。有火則陰不能攝。無火則陽不能固也。骨痛如折。腎主骨。真陰竭也。筋急痠痛。水虧木燥。肝失養也。足心如烙。虛火燦陰。湧泉涸也。

虛損勞瘵脉候

脉大爲勞。脉虛亦爲勞。大而無力爲陽虛。數而無力爲陰虛。沈遲小爲脫氣。大而芤爲脫血。細微而小爲氣血俱虛。寸弱而軟爲上虛。尺弱而濇爲下虛。兩關沈細爲胃虛。弦爲中虛。凡細數弱濇弦皆勞傷脉。但漸緩則有生意。若弦甚者病必進。數甚者病必危。

附方

益氣

保元湯

見一卷火

熱潮 血欬陰補陰補陽補陽補精益精益肝緩

牛膝丸

牛膝 草薺 兔絲餅

杜仲

防風

菴蓐

桂心

蒺藜

金剛丸

草薺 杜仲

菴蓐

兔絲餅

猪腰子酒煮爲丸

煨腎丸

牛膝 草薺 胡蘆巴 兔絲餅

杜仲

防風

菴蓐

桂心

故紙

右歸飲

人參 白朮 炮薑 附子

山藥 肉桂

熟地

杜仲

萸肉

炙草

右歸丸

前飲去朮草 杞子

加鹿膠

兔絲餅

蜜丸

左歸飲

熟地 山藥 杞子

炙草

茯苓

山萸

左歸丸

前飲去茯苓炙草 龜膠 蜜丸

加牛膝

兔絲餅

鹿膠

五汁膏

天冬 麥冬 茯苓 犀角

生地

薄荷

貝母

丹皮

阿膠

蔗汁

蘿蔔汁

羚羊角

人乳汁

梨汁

藕汁

蜜熬

清骨散

秦艽

鱉甲

知母

青蒿

地骨皮

銀柴胡

遺瀉瀉肺勞

心勞脾勞

肝勞腎勞筋極

龍齒丸 人參 茯神 遠志 龍齒 菖蒲 知母 黃檗

三白廣生湯 苓朮 陳草 芍貝 地骨皮 棗仁

人參黃耆湯 山藥 丹皮 芡實 蓮子 烏梅 生地 柴胡 紫苑

黃耆 赤芍 甘草各五分 地骨皮各七分 桑皮 半夏 知母

大五補丸 麥冬 天冬 人參 熟地 益智子 枸杞子

橘皮前 橘皮五兩 甘草三兩三錢 當歸 草薢 菰蓉

鹿茸 杜仲 厚樸 肉桂 巴戟 石解 附子 牛膝

沙鍋內入橘皮煎 再入諸藥末為丸 酒下

黑丸 當歸 鹿茸各一兩 烏梅肉為丸 酒下

腎氣丸 八味丸 見一卷中風此再加 牛膝 車前

滋補養營丸 遠志 白芍 黃耆 白朮各兩半 熟地 人參 五味 芎歸 山藥各一二兩 陳皮

筋極骨極

八錢 茯苓七錢 生地五錢

山萸四錢 蜜丸 大木瓜 水酒煮爛研膏裏轉筋處冷即易之

茸珠丸 鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 當歸各兩半 附子 陽

起石各二錢 酒糊丸

補營湯 參 苓 陳 草 歸 芍 二地 梔子 麥冬

參苓丸 參 苓 烏梅 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮 蜜丸

巴戟丸 五味 巴戟 茯苓 兔絲 覆盆 益智 牡蠣

益氣丸 人參 麥冬 陳皮 桔梗 炙草 五味 蜜丸

鎖陽丹 桑螵蛸三兩 龍骨 茯苓各一兩 糊丸

傷七 九龍丹 金櫻子 杞子 蓮鬚 熟地 芡實 茯苓

血補肉滋補肺通厚滋

滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋
滋補肺通厚滋

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人
益厚人

虛損

楊弱冠成損。嗽血喘促。身熱汗泄。食減便澹。脉弱數。此上損及中。補土生金。自不易定法。四君湯加熟地。砂仁末炒山藥、茯神、五味、白芍、蓮子、小麥煎湯數服。血止喘熱亦定。然一陽初生。必交節。不至加重。乃得轉危爲安。

胡氏女寒熱欬嗽。經斷。食少肌削。口乾無寐。脉虛數。損象已具。經云。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。在女子爲不月。二陽足陽明胃也。胃虛則受穀少而血無由生。故症見心脾。心主血。脾統血。情志不遂。日爲憂思煩擾。以耗竭之。故月水枯也。宜滋化源。倣立齋先生法。朝用歸脾湯加柏子仁。夕用都氣丸加杞子、白芍。

棗仁貝母兩月。諸症悉退。後經自通而病霍然。

狄氏月閉勞熱。醫用通經之品。喘嗽氣促。怔忡自汗。又用寒涼退熱。食減肌削。乍寒乍熱。診其脉弱數而促。此下損及中也。急用潞參、茯神、黃耆、炙草、白芍、當歸、五味、棗仁、銀柴胡、四劑。諸症漸減。加山藥、熟地炭、蓮棗補心脾。兼調肺腎。熱嗽悉除。能進食矣。逾月後忽腰腹痛。下胎形三寸許。兒頭已半損爛。予深自咎。臨診未審其母舌青黑與否。然計其經閉後已六閱月。乃知胞宮血涸。胎形不長。乾熱累月。必反枯癯。深隱通經破血藥數十劑。不能令墮。俟氣血通調。瘀腐之隔膜者。乃去而不復留也。況血枯經閉。漫與三稜、莪朮、牛膝、桃仁。不速之斃乎。誌此爲榨乾汁。

者鑑。

李 肩挑傷力。欬嗽胸痛。其損在肺。用黃耆、潞參、茯神、百合、貝母、杏仁、當歸、白芍、甘草、紅棗二服。卽應。此從安肺湯加減。經所謂損其肺者。益其氣也。

眊 肝腎陰虛。損久不復。冬至後痰。欬粉紅。嗽聲子夜特甚。想虛陽失藏。龍火不伏。交子時陽氣一動。炎灼上陵。浸至嬌臟受戕。身熱喘促。近又食減無味。午後頰紅。時覺慄慄憎寒。是陰傷及陽。非黃地酸膩可效。必用甘藥培元。佐以介屬潛陽。冀其封固蟄藏。至立春前後。地氣上騰。症不加重爲幸。潞參、山藥、百合、甘草、五味、白芍、牡蠣、淡菜、阿膠。數服漸平。

堂弟喘氣急。脉弦數。適逢秋令。予謂此火刑金象也。當滋化源。

以自知醫。雜用梨膏止嗽。予謂非法。八冬寒熱間作。厥氣衝逆。

灰痰帶紅。良由陽亢陰虧。龍雷並擾。冬藏不密。今近立春。地氣

上升。內氣應之。喘嗽勢必加重。擬方阿膠烱化山藥炒各二錢洋參熟

地炒茯神藕節各三錢川貝母炒研一錢甜杏仁炒研錢半棗仁炒研八分五味

五分數服頗效。又五更服燕窩湯。晚服秋石湯。降虛火而喘定。

堂弟肺主出氣。腎主納氣。今腎少攝納。時交驚蟄。陽氣大升。兩關

尺通滑。兼弦氣由衝脉逆衝而上。子夜陽動。喘嗽汗洩。必起坐

不能安卧。皆真元不納之咎。屢用參耆。保固肺脾。既屬不濟。卽

用知藥名爲滋腎。豈能驟安。倣葉氏鎮攝法。青鉛三錢牡蠣煅研錢半

茯神錢三五味八分

炮薑四分

遠志錢半

故紙鹽水炒

三服氣平嗽止

飲食大進弦脉頓減後用峻補膏方得痊

王 勞力傷精右尺偏旺是火水未濟之象日晡寒熱嗽血神疲

大宜小心調攝否則火燃金燥吐紅嗽喘行將日甚矣五味三分

熟地山藥茯苓杞子丹皮各二錢

潞參三錢

白芍川貝各一錢半

遠志八錢

分蓮子粒十數服諸症俱平

妹 積年羸怯經當斷不斷熱從腿膝上蒸今歲厥陰風木司天

又值溫候地氣濕蒸連朝寒熱煩渴寤不成寐悸欬善驚總由

陰虧心火燔灼兼乘木火司令氣洩不主內守陽維奇脉不振

綱維越人云陽維為病苦寒熱今籥衛欲空足寒骨熱所固然

已先培元氣退寒熱待津液上朝冀煩渴漸平用潞參茯神麥冬白芍丹皮龜板熟地柏子仁紅棗蔗汁三服寒熱大減煩渴漸止但覺寒起足脛原方去麥冬龜板加首烏杞子牛膝炭炒壯其奇脉二服不寒但熱原方又去首烏杞子柏子仁加蓮子龍眼肉數十服遂安

貢

弱冠未室勞力傷陽寒熱痰紅欬則氣促嘔沫頭眩食減色悴肌羸半載不復脉來虛數右部尤少神乃肺氣受傷脾元亦億理陽兼泄濁爲宜用六君湯加山藥蓮子南棗淡薑煎服四劑寒熱止濁逆平去半夏加貝母茯神五味嗽稀而食進數脉較減又加薏米芡實黃耆歸芍煎丸兼服而瘳後因自服地