

醫酉林指月 學古診則下卷

卷

學古診則第三帙之下

錢塘盧之頤子綸甫緝正

報息。濁色變者水竭上源之所致也。虛者正氣虛也。正爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。

寒則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。且飲以藥也。張景岳曰。盛則寫之。虛則補之。雖以鍼言。寒則留之氣至遲也。陷下則灸之。陽氣內衰脈不起也。不盛不衰以病有不因血氣之虛實而惟逆於經者。則當隨其經之所在而取之。或刺或灸。或飲以藥也。下文諸經之治義與此同。

二微大陽  
府病先爲是  
動後爲所生氣形  
之體狀

盛者寸口

爲陰以候藏。大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。大腸手陽明也。先爲是動。則病齒痛頸腫。致動府

氣之病徵。亦卽經氣之病徵也。頸與下齒皆手陽明支脈所經由處。是主津液。後爲所生病者。

所生之病皆主於大腸也。液涸注而目黃。津液兩泄。白爲勦而赤爲衄。勦音鼻塞也。衄音鼻出血也。津液兩閉。喉

乃痹。致病府形之所生。肩前膿痛。大指次指痛不用。致病經徑之所生。氣盛者有餘於中外。則當脈所過

者熱腫。虛則不足於中外。寒慄不復矣。寒慄不復爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則

鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。且飲以藥也。盛者。人迎爲陽以候府。大三倍於寸口。虛者。人

三微胃府  
病先爲是  
動後爲所生氣形  
之體狀

迎反小於寸口也。胃足陽明也。蓋陽明居中土也。藉兩陽合於前。明絲陽顯。故名陽明。是動則病洒洒振寒。失顯明之爲氣用矣。善呻數欠者。巨少互引之相牽。顏黑者。用晦忘明而色變。洒洒振與善呻數欠皆所謂失其顯明之用者也。黑色見於面也。併病至則惡人與火。聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨閉戶塞牖而處。冥行無見。失自明也。咸動府氣之病徵。甚則欲上高而歌。棄衣而走。責響腹脹。咸動經氣之病徵。責胃

實奔同。從脛竇逆下而上。是爲肝厥也。肝音幹足腫也。足陽明胃脈所經行之處。是主血。後爲所生病者。陽明多血故也。狂瘲溫淫汗出。動衄皆血中眚。咸屬府病之所生。溫淫汗出由溫氣。宋溫佚而汗出也。口渴斜唇豚瘡。豚音慄說文豚唇瘡也。宋自口

也。頭隆腫。喉痹閉。膝臍腫痛。循膺乳氣街股伏兔骻外廉足跗上皆痛。中指不用。咸病經徑之所生。咽喉

眵以下皆屬風淫爲病。若大腹水腫。此則水穀失宣。溢出肌膚腸胃之外而腫也。土病則不能制水。水遂肆其泛濫之勢矣。氣

氣不足於

盛有餘於中外。則身以前皆熱。陽明行身之前故也。其有餘於胃。胃中熱。則消穀善飢。渴色黃。氣不足於

中外。則身以前皆寒。慄。胃中寒。則不能食而脹滿。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則

鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者人迎爲陽以候府。大三倍於寸口。虛者人

迎反小於寸口也。脾足太陰也。是動則病。舌本強。因動經氣之病徵。亦太陰脾土之所屬。脾脈連舌。本散舌下。若食

則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。身體皆重。此屬藏氣之病徵。蓋土具體而無用。土體俱存而失其運行之用。故土鬱則奪之。景岳曰。奪直取之也。凡土鬱之病。溫滯之屬也。其藏應脾胃。其主在肌肉四支。其傷在胸腹。土畏壅滯。凡滯

在上者。奪其上吐之可也。滯在中者。奪其中運之可也。滯在下者。奪其下寫之可也。凡此皆謂之奪。非獨止於是以得後與氣。則快然如衰也。緣脾氣滯而病。若得後與氣。則脾氣通矣。故快然如衰也。是主脾。後爲所生病者。舌本痛。經連之

所致。體不能動搖。體具而形頑。食不下。上失納而中失腐。土實則火虛而煩心。火失空發而心下急痛也。土實土爲邪氣所壅。而失其運動之常也。火者土之母子。有疾致母亦不安。又脾脈之支者。從胃上膈而注於心中。是煩心心下急痛之證。亦經氣所致之病。瘡痕泄水閉。下失傳道轉

輸之決瀆矣。三焦無所仰。咸屬土用之罔。周黃疸者。土實則苦。疸黃外見。正所以徵土體之獨存也。脾有溫熱之實邪致口舌作苦。黃色發現於外。乃本藏自致。不能臥。強立股膝內腫厥。足大指不用。此則經徑之所之病不緣他藏來干故。曰所以徵土體之獨存也。不能臥。強立股膝內腫厥。足大指不用。此則經徑之所生。蓋牛土畜也。安則臥。病則立。正所以喻土病之專主在膝也。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者寸口爲陰。以候藏。大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。心手少陰也。先爲是動。則病嗌乾渴。渴不欲飲。心痛。是爲臂厥。病之由於手其兩臂多解散。無力懶於動作。卽所謂臂厥。少陰經氣者。益。蓋心不受邪。徵病惟經。雖心系痛。直屬經流之致。咽嗌之乾。亦非君火之事。是以渴不欲飲也。余所見靈樞經脈篇皆作嗌乾。心痛渴而欲飲。診則中所引。乃作渴不欲飲二字。之殊大有分別。夫卽使屢挫津液受燔。是以有嗌乾渴血思飲之證。晉公謂咽嗌之乾。乃屬經流所致。亦非君火之專。是以渴不欲飲也。亦是一說。愚意論肺肝脾腎四藏皆有藏氣之病。徵經氣之病徵。惟心家之病徵。則咸屬之。經氣而不分屬於藏氣者。蓋心爲君藏。不易受邪。若爲邪所犯必有死而無生故也。然而經氣致病者。亦總不離火德之盛衰。故患嗌乾而渴不欲飲者。其在他藏。則或有之。若果屬手少陰經氣所致者。恐未必然也。再三揆度。終當以而字爲正。是主心後爲所生病者。繫目系而目黃。橫出腋下而脇痛。下循膚內後廉。而膚臂內後廉痛厥。抵掌後銳骨之端。而掌中熱痛也。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者寸口爲陰。以候藏。大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。小腸手太陽也。先爲是動。則病嗌痛領腫者。循咽上煩也。不可以顧。肩似拔者。出肩解。繞肩胛交肩上也。膚似折者。出肘內側。

兩筋間上循膩後廉也。不可以顧肩似拔膩似耳聾者却入耳中也。目黃者至目鋒皆也。頰腫頸領肩膩肘臂外後廉痛咸屬經徑是動與所生而所主則成於液涸之所致也。蓋小腸者泌糟粕化津液以榮於身是卽府氣之是動亦屬府病之所生也。小腸受病不能別清濁化精液以致水滯而生諸證爲此諸病者盛則寫之虛則補之熱則鍼起疾折皆喻其強直作痛狀耳聾者却入耳中也。目黃者至目鋒皆也。頰腫頸領肩膩肘臂外後廉痛咸屬經徑是動與所生而所主則成於液涸之所致也。蓋小腸者泌糟粕化津液以榮於身是卽府氣之是動亦屬府病之所生也。精液以致水滯而生諸證爲此諸病者盛則寫之虛則補之熱則鍼起疾人迎反小於寸口也膀胱足太陽也先爲是動則病衝頭痛者上額交顱從顱入絡腦也倍於寸口虛者人迎反小於寸口也膀胱足太陽也先爲是動則病衝頭痛者上額交顱從顱入絡腦也目似脫者經脈起端於目內眥也項如拔者還出別下項也脊痛腰似折髀不可以曲者挾脊抵腰中過髀樞循髀外也膍如結端如裂者合膍中以下貫端內也是爲踝厥出外踝之後循京骨也以及所生病者頭顙項項背腰尻膍端脚皆痛小指不用者咸病經徑之所生亦病府氣之所致也若瘡瘍狂顛目黃淚出劔衄者蓋太陽主筋其上者挾腰脊絡肩項上頭爲目上網下結於頤故凡爲擊爲弛爲反張戴眼之類皆由足太陽之水故陽氣者精則養神柔則養筋筋脈橫解腸澼爲痔也開闢不得穴俞以閉發爲虧而主筋所生病者故陽氣者精則養神柔則養筋筋脈橫解腸澼爲痔也開闢不得穴俞以閉發爲風瘡也諸筋聚目失精失柔目黃淚出也陽重則劔衄淫井則狂顛諸陽之氣淫溢繇是推之經徑之所生府氣之所致何莫非筋主之爲眚陽失精柔之爲患乎爲此諸病者盛則寫之虛則補之熱則鍼起疾之寒則鍼且留之陷下則灸之不盛不虛以經取之且飲以藥也盛者人迎爲陽以候府大再倍於寸口

虛者人迎反小於寸口也。腎足少陰也。天眞之本三焦之原呼吸之門守邪之神五液之所出也。淚者肝之液涕者脾之液涕者心之液涕者腎之液涕者肺之液涕者膽之液者肺之液汗者心之液涎者脾之液唾者腎故爲是動若釜底之息薪致內動而病飢不腐不納飢不欲食三焦之原竭也。張景岳曰腎雖陰藏元陽所居水中有火爲脾胃液失澤而面如漆柴黑陰邪現於面故如漆腎藏精精水液泛而歟睡見血呼吸實而喝喝喘鳴子藏有損并延其母而五液不上注而目睭睭無所見張景岳曰目之明在瞳子瞳子者骨之精也腎氣內虛則目睭睭無所見睭睭如無所見故凡目多昏黑者必腎之真水已虧者也睭睭音荒動氣機微而心懸若飢狀心氣若空而無著之貌書傳所謂心搖搖如懸旌而無所終薄是也若飢實非至坐而欲起者謂其經斜走足心出於然谷循內踝入跟中以上端內故也。陰虛不能靜氣不足於中外則善恐心惕惕如人將捕之志不甯而怖恐致傷而氣下矣腎在志是爲恐是爲骨厥形藏致于神藏故也。厥逆在骨是主腎後爲所生腎主骨也病者五液竭其所自出爲口熱爲舌乾爲嗌乾及痛爲咽腫上氣水火不交而煩心心痛水液混濁而黃疸腸澼若脊股內後廉痛瘻厥足下熱而痛此亦經之貫脊上股出膍走足心經徑之所應現也至嗜臥者以衛周陰度從少陰入足心行腎藏始蓋樞持則開廢故但欲寐也。逆調論曰腎者水藏爲此諸病者生津液主臥與喘也強食謂可以多食也生肉當作性肉周步者若釜底之添薪三焦之原熾斜走足心涌泉充滿之使然耳。禮天官膳用六性禮記月令四時皆有

形之證。爲是動。屬藏府。主心。微形。有損也。

所當食之性。蓋六性。督人所蒙養其肉皆有補益人氣血之功。若其他山禽野獸珍異之味。往往無益而有損也。張景岳曰。生肉厚味也。緩帶披髮大杖重履而步節勞也。厚味所以補精安靜。所以養氣。諸經不言此法。而惟腎經言之。以真陰所在。精爲元氣之根也。愚按此卽今人養火法也。諸經皆宜依此行之。而特於腎經一條發其例耳。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者寸口爲陰以候藏。大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。心主手厥陰心包絡也。蓋心主無專藏。爰以心之包絡爲藏。亦無神舍。無情寓。承宣君火之令。是主脈。誠百脈之宗主。統御百體。以奉身。其爲用溥矣。心之神氣無一藏。無一府。無一體。一處不到。禪家所謂赤肉團上。有一無位真人。亦此之謂也。然雖曰心無專藏。爰以心之包絡爲藏。而包絡終不是心之神舍。心亦未嘗假寓於此。乃是承宣君火之令。主體中百脈。而代君行事焉耳。蓋恐人誤認。卽以包絡爲心君正位。故不憚再三煩言。以曉之也。與三焦稱府藏。故歷絡三焦。出屬心包也。亦得並藏府之經隧。起胸中。入掌中。終中指小指次指出其端。也是動則病。手心熱。臂肘掣急。腋脰者。抵腋。入肘。下臂行兩筋之間。入胸中。故也。甚則腦腋支滿者。起胸。循胸出脇。故也。若心中憺憺大動。此出屬心包。是動熾甚。若威棱之憺乎中國矣。是動熾甚。謂相火熾甚。爲變動也。憺憺。動貌音淡威棱。面赤目黃。喜笑不休者。正憺乎鄒國。本漢書李廣傳中語。借喻作擾動不甯之解。面赤目黃。喜笑不休者。正所謂攘君火之令。假君火之色。竊君火之志。盜君火之權。以作喜怒威福者也。心之華在面。心之使爲目。笑似君火之作威。而豈知實相火之作不靖乎。後爲所生病者。煩心心痛。掌中熱者。權奸在側。甯復莫安。掌握被侵。安能袖手。甚矣。君側之當早清也。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼。起疾之寒。則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者。寸口爲陰以候藏。大一倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。三焦手少

十微三魚府病先爲是動後爲所生氣形之證狀兼伏下章三篇之原

陽也有名無形。名曰三焦。本原於腎間之動氣。出胃上口。循太陰之分。常與營俱行。陰陽五十度者。上焦也。並胃中出上焦之後。此所受氣者。蒸津液化精微。上注於肺脈。獨得行於經隧者。中焦也。并居胃中濁。泌別汁。滲入膀胱者。下焦也。是則保維中。胃化成水穀。傳生人後天之根蒂者。三焦也。故得以無成有豈。塊然形質之比乎。與心主合配府藏。是以循屬三焦。散絡心包。兩者皆位育之本。既主受盛之爲府。亦得並列於經隧者也。先爲是動。則病耳聾者。以其脈繫耳後。直上耳上角其支者。復從耳後入耳中。出走耳前。支脈參互。入出疊應。故令渾渾焞焞之若土木偶也。焞音屯。又音吞。渾渾焞焞至嗌腫喉痹。是氣失開發。若所生病者。汗出。又屬熏充灌溉之有失迴宣矣。如銳皆痛。頰痛耳後。肩臑肘臂外皆痛。小指次指不用。此又經徑應顯之病形也。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者。人迎爲陽以候府。大一倍於寸口。虛者。人迎反小於寸口也。膽足少陽也。清淨之府。決斷出焉。靈樞本輸篇曰。膽者中精之府。解者曰。膽藏清淨之液。是他府所盛者皆濁。而膽獨清。故曰中精之府。越人三十五難曰。膽者清淨之府。解者曰。陽清陰濁。諸府既皆爲陽。則皆當爲清淨之處。而胃與大腸。小腸膀胱。皆受盛不淨。蓋以其體爲陽而用則陰也。故清淨之府。唯膽足以當之。素問靈蘭祕典論曰。膽者中正之官。決斷出焉。解者曰。膽稟剛果之氣。故爲中正之官。而決斷所出。膽附於肝。相爲表裏。肝氣雖強。非膽不足以十一經藏。皆取決於膽。素問六節藏斷肝膽相濟。勇敢乃成。故奇病論曰。肝者中之將也。取決於膽。是以十一經藏。皆取決於膽。象論曰。凡十一藏。取決於膽也。張景岳曰。五藏六府共爲十一稟賦。不同情志。亦易必資膽氣。乃得各成其用。故皆取決於膽也。又按五藏者。主藏精而不寫。故五藏皆內竇。六府者。主化物而不藏。故六府皆中虛。惟膽以中

十一微胞  
增病先爲  
過動徵爲  
所生氣形  
之體狀

少陽也。清淨之府決斷出焉。靈樞本輸篇曰膽者中精之府解者曰膽藏清淨之液是其他所盛者皆濁諸府既皆爲陽則皆當爲清淨之處而胃與大腸小腸膀胱皆受盛不淨蓋以其體爲陽而用則陰也故清淨之府唯膽足以當之素問靈蘭祕典論曰膽者中正之官決斷出焉解者曰膽稟剛果之氣故爲中正之官而決斷所出膽附於肝相爲表裏肝氣雖強非膽不是以十一經藏皆取決於膽素問六節藏斷肝膽相濟勇敢乃成故奇病論曰肝者中之將也取決於膽是以十一經藏皆取決於膽象論曰凡十一藏取決於膽也張景岳曰五藏六府共爲十一稟賦不同情志亦易必資膽氣乃得各成其用故皆取決於膽也又按五藏者主藏精而不寫故五藏皆內實六府者主化物而不藏故六府皆中虛惟膽以中

虛故屬於府。然藏而不寫，又類乎藏。故足少陽爲半表半裏之經，亦曰中正之官。又曰奇恆之府，所以能通達陰陽而十一藏皆取決乎此也。又李東垣曰：膽者少陽春升之氣，春氣升則萬化安，故膽氣春升則餘藏從之所以十一獨盛精汁三合味苦主骨。次第溼溢於形藏者也。骨所生病又骨爲幹，其質剛，膽氣亦剛，膽病則失其剛，故病及於骨。故是動則膽味外徵而口苦，決斷不出而善太息。張景岳謂膽味苦苦走骨，故膽主凡驚傷膽者，骨必軟，是其明證。泄故口苦爲鬱，則意不舒，故精失溼溢，而面有微塵，體無膏澤矣。足下反熱，是爲陽厥者，雖經徑之所當見，亦火化之所應致也。張景岳曰：水病至所生病者，馬刀俠癰。未雖在頸腋間，本則根之於藏，統名曰寒熱病。少陽樞苑之呈象乎？也。俠癰，俠頸之癰。自汗出振寒之爲瘡者，陰陽往復而寒熱更作，上下且移而虛實互顯，是亦中樞之鍵歟。馬刀癰癰者，即此也。振寒者風勝也，少陽居三陽之如脇痛不能轉側，其經過季脇也。頭痛領腫入耳中下，加煩車也。目銳皆中半表半裏所謂中樞之鍵也。如脇痛不能轉側，其經過季脇也。頭痛領腫入耳中下，加煩車也。目銳皆痛缺盆中痛，腋下腫至目銳皆合缺盆下兩腋也。胸脇肋髀膝外至脛絕骨，踝前及諸節皆痛，小指次指不用咸屬經流之境爾。爲此諸病者，盛則寫之，虛則補之。熱則鍼起瘻之，寒則鍼且留之，陷下則灸之。不盛不虛以經取之，且飲以藥也。盛者人迎爲陽以候府，大一倍於寸口，虛者人迎反小於寸口也。肝足厥陰也，兩陰交盡，故曰厥陰厥逆也。下而上若石發之爲蹶也。肝經所主之病，大抵多由肝氣上逆所致，即先生下文所云此病經徑之類疏偏從逆厥之象顯此論是矣。然以厥逆之厥混與厥陰之厥同詮似未的當。蓋厥陰猶云極陰耳。張景岳曰厥盡也。兩陰交盡陰之極也。至厥逆之厥以石發爲解，雖本許氏說文亦屬格外搜奇之語，故是動。

則病腰痛。不可以。可以。不可以。仰。間故爲腰痛。刺腰痛篇云。厥陰之脈令人腰痛。腰中如張弓弩。此卽不可以。可以。免。不可。可以。仰。之證也。丈夫則癲疝。婦人則少腹腫。若暴風從上下之爲癲氣。訛然上入而痛之爲疝也。熱寒鍾聚癰。隆脹脹之爲腫也。張景岳謂婦人少腹腫卽是疝。病蓋以與丈夫癲並列故也。其說甚是。晉公另作一解似屬旁義。甚則。噦乾固經循喉嚨入頸頸。然亦下而上抵。喫而後已。協乎風木中見火化之使然爾。若面塵脫色者。蓋肝藏血。主風主色。失其藏則色脫而不華。亦若風動塵揚則面垢也。是肝所生病者。胸滿嘔逆。飧泄。狐疝。遺溺。閉癃。下上則胸滿而實盈。上奔則惋噦而嘔逆。澼流則忘反而遺泄。搏之激之則過顙在山。而州都癃涸矣。一惟下而不上。似不可以類合。則夜劇淫亂之爲狐疝也。此病經徑之類疎偏從逆厥之象顯矣。故曰。是主肝。是主肝之經氣也。晉公以胸滿嘔逆。飧泄。遺溺。閉癃諸證皆由肝氣逆而上行。若狐疝之病則又因肝氣下而不上之所致。與上數者之病不爲一類。總而論之。均爲逆厥之顯象。無不由於肝氣之逆。不與經徑相干。然考之足厥陰經脈上者。挾胃貫膈下者。循股陰入毛中過陰器。抵小腹。故能爲此諸病。不可謂全無當於經徑之所由也。爲此諸病者。盛則寫之。虛則補之。熱則鍼起疾之。寒則鍼且留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。且飲以藥也。盛者。寸口爲陰。以候藏。大一倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。若五藏五陰六陽氣絕證狀。已見前章。所謂五藏之氣。已絕於內。用鍼者。反取腋與膺五藏之氣。已絕於外。用鍼者。反取四末之條。不復重緝。

右第二十三段詳言十二經脈之病形證狀

論語十二經井是病詳矣第十二經經於分肉行不見謂經者徑也直隱身而行也獨足太陰可見爲與胃相經過於手外踝之上因其骨露皮淺故不能隱下文云經脈者常不可見也其虛實以氣口知之正謂此耳此又一說學者當兩參之

然經脈十二者伏行分肉之間深而不見其常見者足太陰之脈過於外踝之上與胃脈相通無所隱故爾。晉公先生以足太陰脾脈與胃脈相通故獨常見而無所隱張景岳則云足太陰當作手太陰經脈深而直行故手足十二經脈皆伏行分肉之間不可得見分肉言肉中之分理也其可見者惟手太陰一經經過於手外踝之上因其骨露皮淺故不能隱下文云經脈者常不可見也其虛實以氣口知之正謂此耳此又一說學者當兩參之

經之絡惟獨手陽明大腸之絡名曰偏歷手少陽三焦之絡名曰外關雖在臂腕之間然皆起於手之五指手陽明則起食指手少陽則起無名指上則合於肘中。張景岳曰此舉手絡之最大者以明視絡之法

寸兩筋間斜行向內歷陽明太陰別走厥陰二絡之下行者陽明出合谷之次分絡於大食二指少陽出

陽池之次散絡於中小無名三指故曰起於五指間其上行者臂合於肘中內廉厥陰曲澤之次凡人手背之青筋者皆顯然可察俗人不知以爲青筋此本非筋非脈卽畜血之大絡也凡浮絡之在外者皆可知矣惟飲酒者衛氣先行皮膚遂充絡脈則絡脈先盛。至衛氣已平營氣乃滿而經脈大盛矣。者先充

浮絡而後充經脈以明經絡之可辨也蓋飲酒者酒隨衛氣先行皮膚其脈之卒然盛者皆邪氣居之留

而充絡脈絡脈既盛而後經脈乃盛平字與滿字一樣解去不必分釋其脈之卒然盛者皆邪氣居之留於本末不動則熱不堅則陷且空不與衆同者是以知其何脈之動也。張景岳曰上文言飲酒者能致經然動者皆邪氣居之留於經脈之本末而然耳邪氣卽借指酒氣而言酒邪在脈則浮絡雖不動亦必熱也雖大而不堅故陷且空也此浮絡與經脈之不同故可因之以知其動者爲何經之脈也此特舉飲酒爲言者正欲見其動與不動空而經脈絡脈爲可辨矣故經脈之與絡脈異也常不可見也其虛實也以氣口知之其可得而見也

者皆絡脈也經脈隱於肉內深不可見欲知其虛實必就氣口診之而後可知也若其他浮露在外而可見者皆絡脈而非經脈矣然諸絡脈皆不能經大節之間

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

以下原缺

終至絡別

世多不察

也

故不拘

也

於經而闕

於合世知

興是動

生者有

之但未考

其原始要

必行絕道而出入。復合於皮中。如手太陰肺。則經列缺爲絡。別行於大腸經之偏歷。直行似阻而旁行之也。其所會處。皆見於外。大節大關節也。絕道謂經脈所不行之地。凡經脈之行。必由谿谷大節之間。絡脈發爲痺痛之病。今西北之俗。但遇風寒痛痹等疾。卽以繩帶緊束上臂。令手肘青筋脹突。後用磁瓦。鋒於肘中曲澤穴。次合絡結上竅。出其血。謂之放寒。此卽古聖之遺法。不得訾笑。其無據也。凡診絡脈。色青則寒且痛。赤則有熱。胃中寒。則手魚之絡多青矣。胃中熱。魚際之絡多赤矣。其有暴黑者。留久癆也。其有赤有青有黑者。寒熱氣也。其青而短者。少氣也。張景岳曰。診視也。診絡脈之色。可以察病。而手魚之絡。尤爲顯淺。易見。寒則氣血凝滯。則青黑色。青則寒且痛。熱則氣血淖澤。淖澤則黃赤。故赤則有熱。手魚大指本節間之豐肉也。魚雖係手太陰之部位。而胃氣亦至於手太陰。故兼可以候胃氣五色之病。惟黑爲甚。其暴黑者。以痹之留久而致也。其赤色黑色。青色不常者。因寒熱氣之往來也。其青而短者。青爲陰勝。短爲陽不足。故爲少氣也。凡刺寒熱者。皆多血絡。必間日而一取之。血盡則止。乃調其虛實。其色青而短者。少氣也。寫之則悶。悶甚則仆。不得言。悶則急坐之。不至於仆矣。張景岳曰。凡邪氣客於皮毛。未入於經。而爲寒熱者。其病在血絡。故當間日一取。以去其血。血盡則邪盡。邪盡則止。針而後因其虛實以調治之。若視其絡脈小而短者。當知其虛而氣少。故也不可刺。之虛甚而復寫之。其氣重虛。必致昏悶甚。則量仆。暴脫不能出言。急扶坐之。使得氣轉以漸而甦。若偃卧而氣滯。恐致不救。如手太陰之別名曰列缺。不曰絡。而曰別者。謂其繇本經而別走鄰經者也。其絡起於腕上分間。並太陰之經直入掌中。散入於魚際。其病實則手銳掌熱。虛則欠缺。故

二手陽明  
別絡曰偏  
應體形

開止也。小便遺數取之去腕半寸別走陽明也。手太陰之絡名列缺者在腕後一寸五分上側分肉間太陰自此別走手陽明者也其太陰本經之脈由此直入掌中散於魚際張景岳曰人或有寸闊尺三部正脈不見乃自列缺至陽谿乃見者俗謂之反關脈此經脈虛而絡脈滿千金翼所謂陽脈逆反大於氣口三部者是也掌後高骨爲手銳骨實爲邪熱有餘故手銳掌熱欬音去欠欬是張口轉氣今人所謂呵欠虛因肺氣不足故爲欬及小便遺而且數治之者取之列缺邪實則寫之正虛則補之後諸經皆準此半寸當作寸半此太陰之絡別走陽明而陽明之絡曰偏歷者亦入太陰以其相爲表裏故互爲注絡以相通也他經皆然手陽明大腸之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘肩體上出頰偏齒其別者入耳合於宗脈實則齶聾虛則齒寒痹隔取之所別也。手陽明之絡名偏歷者在外踝上三寸上側間別走手太陰者也按本經筋脈皆無入耳上目之文惟此別絡有之宗脈者脈聚於耳目之間者也齶曰許切者舉齶齒齒爲蟲蝕作痛也此經上曲頰偏齒入耳絡肺下膈故邪實則爲齒齶耳聾諸病正虛則爲齒寒內痹而屬諸病治此者當取之所別之偏歷也足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也。足陽明之絡名豐隆者在外踝上八寸別走足太陰者也此經循喉嚨入缺盆胃爲五藏六府之海而喉嗌缺盆爲諸經之孔道故合諸經之氣下絡喉嗌而爲所別之諸病治此諸病皆當取之所別之豐隆也○嗌音益咽也咽以通食喉以通氣所謂食管氣管之分也卒瘡經文原本作瘡瘍作病失音解今從之顛與癲同足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也。足太陰之絡名公孫者在外踝後一寸別走足太陰者也厥氣者脾氣失調而或寒或熱皆謂厥氣逆而上行則爲霍亂本經入腹屬脾絡胃故其所病如此治此者當取所別之公孫也手少陰之別名曰通里去腕一寸上別而上行循經入於心中繫舌本屬目系其實則支膈而罔暢虛則不能言取之掌後一寸別走太陽

四足太陰  
別絡曰公孫  
應體形

五手少陰  
別絡曰通里  
應體形

六手太陽  
別絡曰支  
正證形

七足太陽  
別絡曰飛  
揚證形

八足少陰  
別絡曰大  
鍼證形

九手厥陰  
別絡曰內  
關證形

十手少陽  
別絡曰外  
關證形

十一足少  
陽別絡曰  
光明證形

十二足厥  
陰別絡曰  
微滿證形

手少陰之絡名通里者在腕後一寸陷中別走手太陽者也此經入心下膈故邪實則支膈其脈間若有所支而不暢也其支者上繫舌本故正虛則舌不能言治之者或補或瀉皆當取之掌後一寸別走太陽之手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛肘摩虛則生狀小者如指痴疥取之所別也手太陽之絡名支正者在腕後五寸走臂內側注手少陰者也此經走肘絡肩也小則爲指間痴疥之類治之者當取所別之支正也足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走少陰實則軀室頭背痛虛則軀曲之所別也其病在於面鼻頭背之間治之者當取所前之飛揚也勦音求鼻塞也空音質亦塞也齕丑六切鼻流足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也足少陰之絡名大鍾者在足跟後骨上兩筋間別走太陽者也故其病之所在皆於心胸腰脊見手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋之間循經以上繫於心包之治之者當取所別之大鍾也手少陰心主之絡名內關者在掌後去腕二寸兩筋間別走太陽者也手少陽者也此經繫心包絡心系又出耳後合少陽完骨之絡心系實則心痛虛則頭強取之兩筋間也手少陽者也此經繫心包絡心系又出耳後合少陽完骨之不收取之所別也手少陽之絡名外關者在腕後二寸兩筋間別走手厥陰心主者也此經遠臂足少陽強不利治之者皆當取內關手少陽之別名曰外關去腕二寸外達臂注胸中合心主病實則肘摩虛則不收取之所別也而注胸中故邪實則爲肘摩正虛則爲手臂弛縱不收治之者皆當取外關光明者在足外踝上五寸別走足厥陰者也此經下絡足跗故爲厥爲痿躄爲坐不足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸能起其病皆不離於足治之者均當取光明蹙音必足不能行也足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸光明者在足外

十三任脈  
前絡曰尾  
續形

十四督脈  
前絡曰長  
續形

十五脾脈  
別絡曰大  
包體形  
凡嬰兒之  
在母腹經  
行者惟任  
督二經其  
左十一十  
右二合廿  
四之偶經  
鴻濛未  
始判之律度  
獨任督經  
縣依循母  
氣呼吸通  
乎晝夜養  
其育胚胎及  
其生也督  
胃爲藏府之本而十二經皆以受氣故也凡有十六絡又所當考者也故越人二十七難云經有十二絡

別走少陽。其別者經脰上。畢結於莖。莖陰丸也。莖陰具也。其病氣逆。則畢腫卒痈。實則挺長。虛則暴瘡。取之所別也。足厥陰之絡名蠶溝者。在足內踝上五寸。別走足少陽者也。本經絡陰器上。任脈之別。名曰尾翳。九結於陰莖。故其所病不離其處。治之者皆當取之蠶溝。蠶音高。任脈之別。名曰尾翳。下鳩尾。散於腹。實則腹皮痛。虛則癆搔。取之所別也。任脈之絡名尾翳。卽會陰穴。在大便前小便後兩陰之間。任督衝三脈所起之處也。此經由鳩尾而下散行腹間。故病見於腹。治之者當取所別之會陰也。尾翳一云當作屏翳。搔思馬切爬也。督脈之別。名曰長強。挾臂上項。散頭上下。當肩胛左右。別謂力弱不勝而顫掉也。治此諸病形者。均當取所別走之長強。脾之大絡。名曰大包。出淵腋下三寸。布胸。走太陽。入貫膂。實則脊強。虛則頭重高搖。之挾脊之所過者。取之所別也。督脈之絡名長强者。在尾骶骨上走頭項下歷肩背。故其所病惟及於頭背部位。頭重高搖之脾之大絡。名曰大包。出淵腋下三寸。布胸。腋下三寸。布胸。脇實則身盡痛。虛則百節盡皆縱。此脈若羅絡之血者。皆取之脾之大絡脈也。脾之大絡名大包者。在淵腋下三寸。布胸。脇。總陰陽諸絡。由脾灌溉五臟者也。故其爲病徧及一身百節。羅絡之間。總陰陽諸絡。由脾灌溉五臟者也。故其爲病徧及一身百節。羅絡之血。故治此諸病。皆取脾之大絡以治之也。凡此十五絡者。實則必見虛。則必下視之。不見求之上。人經不同絡脈。異所別也。脈之絡及脾之大絡。共爲十五絡。人之十二經脈。伏行分肉之經深。不可見其浮。而可見者皆絡脈也。然必邪氣盛者。脈乃壅盛。故曰實則必見正氣虛者。脈則陷下而視之。亦不可卽見。故曰虛則必下。若視之不見。又當求上下諸穴。以相印證。而詳察之。蓋以人經有肥瘦長短之不同。脈絡亦異。其所別故不可據常而論也。○本篇以督脈之長強。任脈之尾翳。合爲十五絡。蓋督脈統絡諸陽。任脈統絡諸陰。以爲十二經絡陰陽之綱領故也。越人二十六難。以陰蹻陽蹻合爲十五絡者。不知陽蹻爲足太陽之別。陰蹻爲足少陰之別。不得另以爲言學者。終當以本經爲正。○又按本篇足太陰之別名曰公孫。而復有脾之大絡。名曰大包。足陽明之別名曰豐隆。而平人氣象論復有胃之大絡。名曰虛里。然則諸經之絡。惟一而脾胃之絡。各二蓋以脾之氣。任脉而流之。

未息應度  
符節矣是  
以任督兩  
緒輔先天  
之脈兆者

有十五。凡二十七氣相隨上下者也。世但知有十二經脈之證狀。不知有十五絡脈之病形。如鳥有一翼。不可缺一也。故並錄全文。以供誦記。

右第二十四段詳言十五絡脈之病形證狀。