

醫宗說約外科卷之五

古吳目了漢將示古仲芳氏述

姚江

後學毛

惠公威氏參

婁東

張

浩孟如氏

吳縣

曹

仙鍾英氏

訂

外科賦

瘡瘍外症。歷代推詳膏粱八風。受病本于內經表裏三因治法。分乎先哲。

經云膏粱之變。足生大疔。又云諸癰腫筋亦骨痛者。此寒氣之腫。八風之變也。又云諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。三因詳後。

火氣微甚。酒問推痛痒之原。

河間曰。人近火者。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而爲瘡。皆火之用也。或痒痛如針。輕刺者。猶飛迸火星灼之然也。或疑瘡瘍皆屬火熱。而反腐出膿水者。何也。猶穀肉菓菜。熱極則腐爛而潰爲汚水。火熱過極。反兼水化也。

氣血少者。丹溪分經絡之異。

丹溪云。瘡之要害處。近虛處。怯薄處。前哲已論及之。惟分經之言。未之曾聞。何則。諸經爲少陽厥陰經之瘍。理宜預防。以其氣多血少也。其血本少。肌肉難長。少陽更有相火。遠用驅毒之劑。以伐陰血。禍不旋踵。訣曰。多血多氣。君須記。手經。

大腸足經胃。多氣少血。有六經三焦膽腎心脾肺。多血少氣。心包絡膀胱小腸肝無異記。此則知氣血多少之異矣。

外科精要五善七惡。自明此事。難知九死地。分宜識聖濟錄。名色固詳。宋李書論方斯驗。賈氏之徒。擅針經之妙。毓仁之輩。補思邈之方。熟味羣言。勾述元奧。欲明大旨。先分平病之人。要識安危。宜究陰陽之症。

示吉按啓元子曰。經脉一周于身。凡長一十六長二尺。計人之息。共一萬三千五百。是息平人。一息脉行六寸。漏水下百刻。則氣都行八百一十丈。正難經所謂「日一夜榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。共五十度周于身也」。丹溪曰。得

熱則行速而太過得寒則行遲而不及予按行速熱也多兼實陽症之所由生若兼虛後必陷為陰行遲寒也多兼虛陰症之所由生若兼實後必返為陽陰陽二症詳後

內因之故厚味薰蒸發熱更兼七情內攻外因之原風寒暑濕傷人亦為乘虛體飢飽勞役失節是名不內外因更有冷熱不均而至金石燒煉常服是因藥毒內傷外有痰鬱兼發而來三因既明部位宜審督脉通于背脊背側二行太陽是其本經背分五行中間係奇經督脉之道兩傍四行乃足太陽膀胱經之部分

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.erfongbook.com

腹分七行。奇經任脈從前陰起。由臍中上咽喉至承漿而止。
臍傍第一行一寸足少陰腎經之部。第二行一寸足陽明胃
經之部。第三行一寸足太陰脾足厥陰肝經之部。乳根屬足
陽明胃。乳傍乃手三陰經所起。

足少陽胆經循脇肋行身之側。足陽明胃經由乳中行身之前頭為

諸陽之會。面為三陽之交。手背為陽。手之三陽從手走至面。手

心為陰。手之三陰從胸走至手足之外。肘為陽。足之三陽從足

走至頭。足之內肘為陰。足之三陰從足走至腹。唇為脾竅。舌乃

心苗。目集五臟之精華。鼻通肺家之呼吸。腎竅于耳。足少陽胆經

遠耳之傍。胃通于乳。足厥陰司乳之頭。跨馬囊。離肝家之部。喉

癰臍發任脉之司

先明部分者如毒見于背見于腦中屬督脉。傍屬足太陽經也。見于脅屬手足少陽經。見于眉屬手足太陽少陽經。見于頤見于髭屬手足陽明經。見于腮頰屬手足陽明經。見于額屬手太陽經。見于穿腦屬督衝任三經。見于腿外肘屬足三陽內肘屬足三陰。見于臂從手背赤肉屬手三陽。從手心白肉屬手三陰。見于乳內屬陽明。外屬少陽。頭屬厥陰。逐部推求治療自驗用藥引經。如太陽用防風羌活。陽明白芷升麻少陽用柴胡太陰用白芍升麻少陰止宜獨活厥陰用青皮柴胡左之以桂枝藥力直攻患處也。

經絡已清引經之法有益惡症須識費人之謗不生脫疽并疽
及腎疽天疽銳毒醫之何濟對心雙發及對口蓮子蜂巢急治
乃安

陳毓仁訣曰發于心主出心經五臟乖張事可明名曰并脾
疽最重

家積毒生背脊發于肩下脊上屬脾厚味發熱積
毒所致高腫鮮明根不過肩名順心經火毒

對心臨背上對心而發形截督脈
又名毒刻君位最易傷人兩肩左右雙生發肺肝積

毒不虛稱左搭手屬肝右搭手屬肺俱生
左右肩骨以動之處為可治蓮子蜂巢防毒陷

孔似蜂窠尖如蓮子發多生下背與心相近與脊中
平輕者形長高腫或偏半背重者形斜平塌兩脇俱傷腰間

腎俞發難生生于兩腰內陷肉之間或生兩腰中間椎上毒
從腎來發火消陰十五日前後必死若疔形紅

活高腫為膿急以人參養活高腫為膿急以人參養
甚陽合地黃丸療救之督脉經虛從項發俗名對口治宜

書卷之五 外科 賦

精生下項後而對前口故名對口但有偏正之不同正者屬督脉易于起灸治反易偏者屬太陽經瘡多平塌治反唯俗以正為重偏為輕庸說也何期耳後多生發天疽銳毒病非輕

左天疽右銳毒

生耳後一寸三分陷中是積鬱所致毒從肝肺來形多堅又硬頭多隱伏未潰先黑臭穢易生元氣易敗多致不救

有脫疽生手足或生口面命難存

此症如粟漸大其色如得潮黑潮開漸大黑如烏羽

不知痛痒熱臭唯聞小兒多從積熱積毒大人多因服石燥熱占人雖有割截之法子見三人俱至七八日而死

示吉曰諸症皆因瘡勢之浩大積毒之最深地分之險惡故

特拈出然瘡之足以傷生者不止于此也背上有九處人髮

際為玉枕

又為一占木

也頸項節二也第三椎為崇骨三也第四

椎為玉藏四也肺俞五也脾肝俞六也腎俞七也後心對鳩

尾

鳩尾即八也鳩尾骨穴凡也正而六處喉骨為垂骨一也

有爲神舍一也心腸尾三也乳穴四也脐中爲神闕五也
脐下二寸爲腸屈間六也共十五處俱息生離外腦髻鬢顙
迎香瞳子膠之間者俱地分之所忌然種種地分背脉絡所
會內系府藏皆病者調攝得宜醫者補瀉無失亦可起死回
生苟不知此將息失宜恰不對症呈死于不死之地分吾知
其不免矣

看病之深淺分毒之臟腑大而向起屬乎陽癰也六腑所究乎
而內究屬乎陰疽也五臟所生壯重而癰瘰最難者初起无寒
无熱是熱癰之浮于膚上

凡瘡初起不究寒熱高腫于皮膚之間淺而小最大不過二

二寸者曰癰。六腑積熱。注于肌膚之間。高腫而痛。如碗如

盆。曰癰。五臟積熱。攻注肌膚。初發如粟。或如豆。許與肉俱

平而不高腫。或作赤色。時作痒痛。曰疽。

陽善而陰惡。所慮者其症半陰半陽。須司命之決于胸中。初起

癰痛頂如尖字。惡寒發熱。陽可知。二七之期。膿漸至。

訣曰。癰疽須分陰陽症。純陽初起。必癰疼微。惡寒時身又熱。

頂如尖字。高突形。腫似彎弓。根紫束。高腫氣足根紫束血足也二七之期

膿漸侵。陽症以十四日為限一便如常。口有味。腫消。膿潰復

精神。痛隨膿減。生新肉。新肉紅色如棉子者吉腐皮將斂。白星星。此屬

純陽。誠是善。時調治自功。脫。

初起僵頑形如粟米死熱不渴陰爲逆一十之後倦怠生

訣曰純陰之症症何如初如粟米人不知疙瘩僵頑不紅腫

無疼少熱不厥時七日之後身倦怠瘡根平大實難支氣虛不能

起死則瘡頭平而不高血虛不頂不高尖根不活色無光采

腐膿遲陷軟無膿空結聚精神昏憤氣難舒飲食少減身戰

慄瘡形紫色葉無施舌強痰喘純陰症總有靈丹不治之

半陰半陽死生難卜脉數無力形似半昏半爽半平高食難消

運症見微寒微熱微赤腫按方應病方得陰轉爲陽腐去生新

亦可回生起死

訣曰陰陽相半死生交善惡相兼細辨昭微熱微寒微赤腫

牛昏半爽。牛平高脉來豆數。多無力。飲食重。食難運。消腫而
不潰。因脾弱潰而不斂。爲膿。饒大便多。澹小便數。上身有汗。
下身焦。五善虽兼有。七惡未全。迷口渴。喜茶腸腹痛。面赤。鑿
飲足心高。心煩不穩。睡神乱。咽音焦。投方應病。方爲妙。陰轉
爲陽。漸可調。

外症已審。脉法宜明。氣血沉滯。脉來數。身有痛處。卽灸瘡疔之
兆。身應發熱。脉浮數。人反惡寒。卽爲瘡疽之萌。

仲景曰。脉數不時見。則生惡瘡。又曰。肺脉俱數。則生瘡。

初起。大洪大爲病進。已潰者。爲邪氣未退。而留連潰後。沉寒

症相應無妨也。若知細則將變症。

此六脉總不初起

脉汁大沸。

數邪正相搏有餘也。若促結則非吉也。

此六脉總不

浮大浮數。

瘡必高腫。宜發表。面忌攻利之。

高腫者毒在表經所謂汗之則瘡已也。誤下之則誅伐無

過反傷元氣

沉數沉實邪必內藏。

其外症不煩腫高赤及發熱煩躁大便秘

宜疎通而除。

發表之劑。平場漫腫。宜內補托而益其虛。不浮不沉。當和榮衛。

而解其勢。初起宜疼。不宜痒。潰後作痒。乃有長肉之功。

潰後濕身作痒

風乘虛入宜內托發散

潰後宜痒不宜疼。初起不疼。乃有純陽之咎。不痛。

大痛非佳症。或麻或痒。實難醫。脉症初詳。善惡細辨。善不止于。

五飲食知味。二便調。動息寧靜者吉。惡不止于七嘔吐藥食且。

上視神氣昏沉者凶。善者五臟未傷。善候并至則生。惡者五臟。

醫論卷之五
已損惡候并至則死惡證忽有二三宜當深懼善候乍見一二便可回生

五善訣曰心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安然。肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康。脾善唇滋潤衾無穢氣藏凡食俱有味膿厚更肥黃。肺善聲音響無痰韻更長皮膚多滑潤大便秘自尋常。腎善誠爲要水升火降良口和因不渴小便利清長。

七惡訣曰一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃。二惡腰身強目睛邪視人瘡頭流血水驚悸是肝逆。三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脾敗不知疼。四惡

皮膚腐爛。聲嘶。韻不長。痰多。兼喘急。鼻動。肺將止。五惡成消。
渴。隨飲。卽隨乾。形容多慘黑。囊縮。腎凶端。六惡身浮腫。惕
鳴。嘔飯頻大。便多滑泄。臟腑並將傾。七惡瘡倒陷。形如劍
鏃。同四肢多冷逆。污水自流通。

示吉日五善七惡。方書俱載。此訣尤備。故錄之。然亦不止于
此也。如膿成不自出。失導引者死。膿成不針烙。反敷藥者死。
熱痛正甚。失治則毒內攻者死。毒內攻後。不服藥。反針烙者
死。潰而至于透內膜者死。潰喉者死。未潰而陷面青唇黑。便
汚者死。陰人腹入囊者死。高腫不托裏。反用下藥者死。漫腫
不內托。反用寒涼攻利者死。潰後誤用寒涼。致瘡紫黑者死。

故治者不可不早。亦不可不審也。

善惡明而生死自分。虛實辨而補瀉方得。氣實者瘡頂高而突。起。虛則平塌之可憂。血實者瘡根束而鮮明。虛則漫腫之有咎。瘡之虛者。腫平膿稀軟漫。瘡之實者。腫起堅硬。膿稠瀉。瘡腸鳴。脈弱皮寒。飲食嘔而手足冷。臟腑之虛可知。胸腹滿脹。身熱。脈大。飲食如故。二便調。臟腑之實有驗。瘡口不合。膿稀肉冷。目汗。色脫者。乃氣血之虛寒者。疼痛。高腫。色赤。膿厚。肌熱者。乃血氣之實。上實則口渴。飲冷。目赤。頭疼。鼻不通。下實則小便如淋。腹中膨脹。大便結。下虛精滑洩瀉。脈沉足冷。最爲凶。上虛則目閉。神昏。無熱不渴。眞爲逆。邪氣甚則實。腫焮疼痛。日久不潰。大便