

經方應用

四



經方應用

秦州武國良簡侯編纂

瀉心湯類

煩驚吐衄大便秘之証金匱主用

瀉心湯

大黃

四、八

黃芩

黃連

各二、四

上剉細以水一合煎五勺去滓頓服如以沸湯

一合漬之絞去滓服亦可

証狀表現 原文心氣不足吐血衄血瀉心湯

主之

按 千金方引此文不足作不足宜從之

補充 當有心下痞大便秘結心膈煩躁小便赤澀或驚癇發狂面及眼目有赤色或腫脈數急而實等証

立方意義 本方証由心胃肝胆之火駢集胸中迫血上行乃有煩悸吐衄急迫之狀為用黃連以清心胃之火黃芩以清肝胆之火其熱雖可暫消吐衄亦可暫止仍不能弭其復發故必須以泄熱通利之大黃為主將領導芩連迫使心胃肝胆之火同時下降始能絕其復燃之患此其所以為熱性吐衄之

良劑歟

治療標的 以心下痞而煩悸不定大便秘而
上氣為主標的而用之

諸家經驗談 芳翁醫談江洲多羅尾先侯患
失精數年與人並坐自不知其漏泄諸醫盡力不得
治故延師師至將診之侯因問曰寡人之病可治乎
曰可治侯乃屈一指尋又問如初師曰可治侯又如
是不已至十指抱劍去師曰癰也以三黃瀉心湯而
全愈侯大悅服且從師學醫三年

建殊錄

泉廬伊兵衛年二十餘積年患吐血

以

每旬必一發丙午秋大吐吐已氣息頓絕迎眾醫救之皆以為不可為矣於是家人環泣謀葬事先生後至視之似未定為死者因續着鼻間猶能蠕蠕動乃按其腹有微動蓋氣未盡也急作三黃瀉心湯每帖重十五錢須臾腹中雷鳴下利數行即醒出入二十餘日許全愈十餘年不復發

方輿輓 往年新街之酒家茨才屋其之下婢患逆經起時吐衄後至眼目耳十指頭皆出血形體麻木手足亦至於強直余投瀉心湯十日血止後與回生湯調理復舊

方伎雜誌 數年前京師之莊長筵屋利助循
常例往幕府賀歲冬杪下江戶在途中下血至府後
即請診治週身面色青白爪甲舌亦無血色而乾燥
脈沈弱胸動亢息強切飲食不進大便晝夜有數次
檢其大便皆血也且有數血塊日日如是(中畧)余與
瀉心湯合四逆加人參湯三帖使交互服之(中畧)服
藥後血少減身體手足亦溫至春血止大快但尚有
虛熱之候一身手足蒸熱因轉柴物湯通計三十餘
日而復舊(下畧)

中國內科醫鑑

瀉心湯對於癩癧有鎮癩之

效 又癲狂癰凡實熱者總用此方 又腦溢血用
瀉心湯能救急亦能治緩誠良劑也 又大黃散(即
本方)療黃疸之身體面目之黃者有效

漢葯神效方 惠美寧固曰衄血用諸葯無效
者用瀉心湯加荊芥二錢有奇效

漢方新解 大傷後大熱煩躁嘔吐下利者及
船車暈眩等証用本方尤有奇效

諸家緒論 葯徵凡病心下煩悸心下痞按之
濡者用此湯皆也

表參西錄 吐血非因寒涼者此方服之無

不立愈且愈後而瘀血全消更無他患真良方也

保赤全書 三黃丸治麻後赤白痢裏急後重

身實者

松原家藏方 瀉心湯治卒倒人事不知心下

痞堅痰喘急迫者

瀉疫新論 本方治心下煩嘔吐下利而心下

痞者嘔甚者加辰砂更妙

和劑局方(上略)治五般痔疾糞門腫痛或下鮮

血(中畧)小兒之積熱亦宜服之

聖濟總錄 金花丸(即本方為丸之名)急勞煩

躁羸瘦面色痿黃頭痛眼澀多困少力者三味等分
為末煉蜜為丸服之

肘後方 惡瘡三十年不愈者大黃黃芩黃連
各三兩為散洗瘡淨粉之日三次無不差者

方輿輓 瀉心湯不僅治吐血衄血即下血尿

血齒衄舌衄耳衄等一身九竅出血者無不治之真

血証之玉液金丹也 又墜打損傷昏眩不省人事

者及出血不已者大宜此湯（中略）金瘡亦唯用此湯
可也求真云此証有當以桃核承氣湯治之者不可

不知

按 其他各家用本方治療諸病可供參考者
為彙錄於後千金翼三黃湯(即本方)主解散腹痛脹
滿之發於卒急者外台秘要引集驗大黃散(即本方)
療黃疸身體面目皆黃者 又骨蒸本方加芒硝蜜
丸服古今醫說三黃丸治遺精有熱者名醫方攷三
黃瀉心湯治心膈實熱狂躁面赤者漢法醫典胃潰
瘍吐血時用三黃湯直指方於本方加川芎各等分
為末每服二錢食後井水調服名川芎三黃散治實
熱衄血拔萃方於本方加犀角地黃名犀角地黃湯
治熱甚血積胸中就以上所治各病觀之可知本方

應用之廣泛矣

憑証使用

腦出血半身不遂顏面神經麻痺

衄血肺結核(發熱欬嗽咯血)胃出血胃潰瘍痔出血
眼疾耳疾口腔舌及咽喉之疾患及發狂等(漢方新
解)其他癲狂癇及婦人逆經等証

以下瀉心湯加減方

瀉心湯証而復惡寒汗出者加附子傷寒論名

附子瀉心湯

大黃

四。

黃連

黃芩

附子

各二。

上藥各別判細漬大黃黃連黃芩三味於沸湯

六。〇。〇。內須更絞去渣別以水六。〇。〇。煮附子取二。〇。〇。合而服之

証狀表現 原文心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

補充 有四肢麻冷但欲寐心下滿或猝然昏倒脈沈細而帶微數之狀

立方意義 痞由熱結此証之痞亦不外是當然為瀉心湯証也但三黃苦寒對於惡寒汗出陽虛之証非其所宜茲既欲除去熱結之痞而須_下又補其_上陽虛無已為加辛熱補陽之附子一味猶恐熱勝於

可立

寒而奪三黃之力或寒勝於熱而奪附子之力無已則以三黃漬沸水中片時取其微寒之氣味另煎附子汁和入服之使各行其所事而不相妨各展其所能而共成平調之功高學山云係用一箭射雙鷗之法於此見前人方之精與調劑之妙用矣

治療標的 以瀉心証而有惡寒汗出肢冷為主標的而用之

諸家經驗談 類聚方廣義老人調食替悶昏倒不省人事心下滿四肢厥冷面無血色額上出冷汗脈伏如絕其狀類中風者稱為食鬱食厥宜附子

瀉心湯

方輿輓 瀉心湯証有但欲寐者甚者食時與服藥亦腫又手尖微冷等証亦宜此方

憑証使用 急慢性胃炎出血性病而兼心機衰弱等証

治三黃瀉心湯証而較緩者去黃芩傷寒論名

大黃黃連瀉心湯

大黃 六、四 黃連 三、二

上剉細以沸湯五勺漬之須臾絞去渣頓服之

千金翼註 此方必有黃芩醫壘元成本方加

黃芩名伊尹三黃湯

証狀表現 原文心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

又 傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

補充 富有顏面潮紅便秘或目赤脈多數急而實之証與三黃瀉心湯証類似而較輕

立方意義 此方証由熱氣構結成痞較三黃瀉心湯為輕故祇以大黃黃連黃芩泄熱治痞不用水煎

祇用沸湯浸漬則藥力淡而不濃緩而不急正徐靈胎所謂欲其輕揚清淡以滌上焦之邪也

治療標的 以心下痞大便秘吐衄脈實數為主標的面紅目赤等為副標的而用之

諸家經驗談 漫遊雜記有一贅婿新婚後數月病眩暈隔日衄血欬嗽潮熱其脈弦數家人悉云是腎勞余一診曰其腹氣堅實決非腎勞也審問其病因云平生嗜酒過多比年來始被舅制止絕飲酒故至氣火鬱蒸乃與大黃黃連瀉心湯二十日全愈

麻疹一哈 大久保安人年二十許疹收后衄

血不止四五日心下痞悶身熱不退因與大黃黃連瀉心湯瀉下數行而衄止後兩目微疼至黃昏時不能見物如雀目然仍守前劑至十四五日諸証全退諸家緒論 肘後方徐玉一方(即本方)治乳中起瘰癧痛者

聖惠方 治熱蒸在內不得宣散其先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名為內黃者

張氏醫通 噤口痢有積穢太多惡氣薰蒸者大黃黃連瀉心湯加木香

皇漢醫學 本方加甘草名甘連大黃湯治本