

傷寒條辨

(下冊)

傷寒條辨下冊目錄

武進費通甫著

●陽明篇

辨陽明病脈證治法……………一

陽明府病提綱……………一

陽明府病證……………二

調胃承氣湯證……………五

調胃承氣湯方……………五

小承氣湯證……………六

小承氣湯方……………六

大承氣湯證……………七

大承氣湯方……………七

白虎湯證……………一〇

白虎加人參湯方……………一一

白虎湯方……………一一

陽明經病證……………一二

桂枝湯方……………一三

麻黃湯方……………一三

小柴胡湯方……………一三

陽明風寒受病之不同……………一三

吳茱萸湯方……………一六

小柴胡湯方……………一六

麻黃湯方……………一六

陽明表裏虛實生死之辨……………一七

大承氣湯方……………一七

桂枝湯方……………一七

梔子豉湯方……………一七

白虎加人參湯方……………一八

猪苓湯方……………一八

辨陽明病可下不可下證……………二〇

大承氣湯方……………二〇

小承氣湯方……………二〇

陽明忌下證……………二二

蜜煎導方……………二三

猪胆汁方……………二三

土瓜根方……………二三

麻仁丸方……………二三

陽明發黃證……………二四

茵陳蒿湯方……………二五

梔子柏皮湯方……………二五

麻黃連軹赤小豆湯方……………二五

陽明蓄血證……………二五

抵當湯方……………二六

刺期門法……………二六

●少陽篇

辨少陽脈證治法……………二七

少陽病提綱……………二七

小柴胡湯證……………二七

小柴胡湯方……………二八

小柴胡湯加減法……………二八

小建中湯方……………三一

少陽汗吐下之禁……………三一

辨少陽邪氣進退及病欲愈時……………三二

柴胡桂枝湯證……………三三

柴胡桂枝湯方·····	二三三
柴胡桂枝乾姜湯證·····	二三三
柴胡桂枝乾姜湯方·····	二三三
黃連湯證·····	二三三
黃連湯方·····	三四
柴胡加芒硝湯證·····	三四
柴胡加芒硝湯方·····	三四
大柴胡湯證·····	三四
大柴胡湯方·····	三五
少陽刺法·····	三五
熱入血室證·····	三六
刺法·····	三七
小柴胡湯方·····	三七
併病合病證·····	三八

葛根湯方·····	三八
黃芩加半夏生姜湯方·····	三九
麻黃湯方·····	三八
黃芩湯方·····	三九
黃芩加半夏生姜湯方·····	三九
大承氣湯方·····	三九
白虎湯方·····	三九
●太陰篇	
辨太陰病脈證治法·····	四一
太陰病提綱·····	四一
太陰藏病之證治·····	四一
桂枝加芍藥湯方·····	四二
桂枝加大黃湯方·····	四二
四逆湯輩·····	四三

太陰經病之證治……………四三

桂枝湯方……………四三

太陰病愈期……………四三

●少陰篇

辨少陰病脈證治法……………四四

少陰病提綱……………四四

少陰寒熱脈證……………四四

少陰清法……………四五

黃連阿膠湯方……………四六

四逆散方……………四六

猪苓湯方……………四六

猪膚湯方……………四七

甘草湯方……………四七

桔梗湯方……………四七

苦酒湯方……………四八

半夏散方……………四八

半夏湯方……………四八

少陰下法……………四八

大承氣湯方……………四八

少陰溫法……………四九

麻黃附子細辛湯方……………五〇

麻黃附子甘草湯方……………五〇

附子湯方……………五一

眞武湯方……………五一

眞武湯加減法……………五一

通脈四逆湯方……………五一

四逆湯方……………五二

吳茱萸湯方……………五二

白通湯方……………五三

白通加猪胆汁湯方……………五三

桃花湯方……………五三

少陰生死法……………五四

少陰病禁忌……………五六

●厥陰篇

辨厥陰病脈證治法……………五八

厥陰病提綱……………五八

厥陰寒熱脈證……………五八

厥陰病機之進退……………五九

厥陰生死之辨……………六二

厥陰清法……………六四

乾姜黃連黃芩人參湯方……………六四

白虎湯方……………六四

白頭翁湯方……………六五

梔子豉湯方……………六五

厥陰溫法……………六五

烏梅丸方……………六五

吳茱萸湯方……………六六

當歸四逆湯方……………六六

當歸四逆加吳萸生薑湯方……………六六

四逆湯方……………六六

茯苓甘草湯方……………六七

厥陰病禁忌……………六七

厥陰類證……………六七

●雜篇

辨陰陽易差後勞食復脈證……………六九

燒裯散方……………六九

枳實梔子豉湯方……………六九

小柴胡湯方……………六九

牡蠣澤瀉散方……………七〇

理中丸方……………七〇

竹葉石羔湯方……………七〇

辨霍亂脈證治法……………七〇

五苓散方……………七一

理中丸方……………七一

桂枝湯方……………七一

四逆湯方……………七一

通脈四逆加豬胆汁湯方……………七一

辨痙濕喝病脈證治法……………七二

痙病……………七二

濕病……………七二

中喝……………七三

白虎加人參湯方……………七三

傷寒條辨

●辨陽明病脈證治法

（補論）陽明者、取在天陽氣麗明之意、以名吾身之經府也、夫大地以日出而光明、萬物賴熱力而生長、而吾身血氣最盛之處、其熱力一若天日者、孰有過於腸胃乎、腸胃爲水穀之海、凡穀食之腐爛、糟粕之傳導、津液血氣化生、以灌溉藏府、營養肌肉者、莫不借此熱力之蒸動、其陽熱之氣平衡、則生機不衰、熱力低微、則病爲虛寒、水穀不化、而大便溏瀉、故曰、胃與大腸、謂之陽明、亦得陽而明之意也、

陽明之表、肌肉也、其經脈、挾鼻繞口、至腹抵足趺、故經有邪熱、則身熱汗出、不惡寒、目疼鼻乾、在裏、爲腸胃、腸胃熱盛而化燥、故津氣燥結、大便堅硬、燥熱上擾於心、則狂煩譫語、外蒸肌肉、則潮熱汗出、皆陽熱太過之象、所以病陽明之經、法用清解、病陽明之府、而有三承氣以攻下、經云、陽明之上、燥氣治之、此何非因其亢燥而設者乎、太陽主表、邪從外人、故經病多而府病少、陽明主裏、一有燥熱、則外邪結聚腸胃而不行、所以府證多於經證、但病於表者、頭痛寒熱、無形之邪也、問之切之而可得、病在裏者、脘腹痞鞭脹痛、多有形之結滯、尤

必按之以手、而後知爲虛實、此太陽陽明經府病之所不同也、腸胃之外、爲綱油三焦、綱油透出筋骨、合於肌肉、是以邪傳陽明、有從肌腠而來者、有自三焦傳入者、有太陽陽明合病、法仍表解者、有陽明病兼少陽、治以少陽之法者、若過汗傷陰、妄下損陽、腸胃三焦、濕熱兩蒸、病爲黃疸等、然則治陽明證者、又豈可曰、攻下一法、卽可以盡其能事哉、

●陽明府病提綱

●陽明之爲病。胃家實也。

〔說明〕「胃家實」、腸胃爲水穀之海、凡邪熱與穀食糟粕、相結而爲實、胃實、則譫語昏狂、脹痛閉結、潮熱、手足汗出等證、皆可名曰、陽明府之爲病也、

〔論解〕病陽明之經者、則目痛鼻乾、身熱汗出、不惡寒而惡熱、病陽明之府者、則有痞滿燥實結等、但不曰、陽明之爲病、口渴煩熱、或汗出脈洪大、而僅舉胃家實三字、以府熱燥實、則經病亦在其內、而府證甚多、脈亦時變、又未能一二言之也、况陽明所主之肌肉經脈、介乎太少之間、其邪之外入者、經證每難獨見、故少陽三陰等篇之提綱、或經府同言、或脈證并列、而陽明之爲病、又以其所病之處、作爲全篇之綱領、使後人一讀胃家實三字、其脈症治法、不難而知、然則用意之周密、文筆之簡明、非仲聖而誰屬歟、

陽明府病證

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗。利小便已。胃中燥煩。實。大便難也。

（按）此節言陽明病有太少之傳也、

（說明）「太陽陽明」、病在太陽、其人胃陽素盛、脾陰不足、雖表邪未入、腸中先已燥結約束、故曰「脾約是也」、

「正陽陽明」、邪熱入胃、與穀食糟粕內結、乃陽明自病、而成胃家實、

「少陽陽明」、太陽之邪、已入少陽、發汗利小便後、邪乘胃中燥熱、而轉屬陽明也、

（論解）陽明病之胃家實、固以府氣燥結爲主證、但成病之原理、不可不知也、蓋病家體氣不同、藥有誤治之逆、雖同病陽明之熱實、而未可概施以三承氣湯、故察其陰津不足、胃陽素盛者、其後必有大便難之脾約病、若腸胃宿滯未清、表邪內傳、是不因脾約或汗下所誤、乃邪入陽明而自病、尤未可與前者并論矣、三焦爲少陽之府、毗連腸胃、若誤行汗利、其邪之乘隙而入者尤易、而津傷胃燥、亦較脾約之爲甚、所以於陽明既病之後、必審其體質之虛實、及病前所經過、

而分爲太陽正陽少陽三者之所傳也、

●問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明也。

（按）此承上章、復申明邪傳陽明、而病胃家實之理、

（說明）「不更衣」、古人大便、必更衣、此言腸胃燥結、腑氣不行也、

（論解）邪在少陽、汗利誤治、可爲少陽陽明、若病在太陽、汗下過甚、表邪乘胃中之津液乾燥、亦可內傳、然病有不更衣、腹中無所痛苦、及大便難、胃家實之脹痛燥結等別、而治之有攻利潤燥導腸等法也、

●問曰。陽明病。外證云何。答曰。身熱。汗自出。不惡寒。反惡熱也。

●問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

●問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

（按）此三節、言表邪初傳陽明、所以別於太陽病也、

（說明）「身熱、汗自出」、邪由皮表、內入陽明、此時衛氣之鬱遏於表者、已化爲熱、熱蒸、則肌腠不固、而自汗出、

「病有得之一日」、指陽明受病而言、「惡熱」、內已有熱也、

太陽之表邪未盡、故初傳之始、未見外熱、而先「惡寒」、

「陽明居中土、萬物所歸」、邪在經而不聚、故傳入於府、聚集於府、不復散漫於周身、故曰「無所復傳」、猶萬物之歸化於土也、

（論解）陽明受病之始、必有先兆、其兆維何、卽邪由經而傳者、先目痛鼻乾、由皮表肌腠傳來者、始則寒熱不罷、繼則寒少熱多、終則熱盛汗出、不惡寒、而反惡熱矣、夫發熱惡寒、汗出惡風、爲太陽之的證、身熱不惡寒、汗自出而惡熱、爲陽明之的證、蓋胃爲血氣之海、陽旺之人、邪入之而化熱最易、故病初必惡寒、一二日間、惡寒自止、當此之時、猶不知邪初內入、妄發其汗、有不抱薪救火、以促其內熱者哉、邪之由表而解、其法爲最、不能汗解而入於府、病雖較重、然爲猶順也、以邪聚腸胃、可清可下、邪退熱解、不終日而愈、故曰陽明居中土、萬物所歸、無所復傳也、然治之不善、其嚮之所內盛者、亦未嘗不可侵犯他藏、則知仲聖之所云無所復傳者、以明在經之病、三陰之邪、苟能傳之胃府、可及時以治之、毋待邪復入藏而不可救、否則、

焉有邪既傳府、而無傳藏之理乎、

●本太陽病。初傳病時。發其汗。汗先出不徹。內轉屬陽明也。

●傷寒。發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濇濇然者。是轉屬陽明也。

(按)此兩節、復詳太陽陽明之義、除過汗下利亡津液外、又有汗之不徹、及自汗出而轉屬陽明者、不可不知、

(論解)病在太陽、汗之太過、其胃燥津傷者、爲太陽陽明、前已言之矣、若汗之不徹、在表未盡之邪、亦可內傳陽明、及胃熱素盛者、無論服藥與否、當其在表時、寒熱無汗、嘔不能食、待至熱多寒少、濇濇汗出、而自轉屬陽明者、此兩節是也、蓋邪在肌腠、汗出惡風、邪能外解、則汗出而寒熱退、今汗出、既非外解、又非中風、其熱由裏蒸、肌腠洞開、雖不發汗、汗出濇濇、故曰轉屬陽明、然則汗之過與不及、在表之邪、皆可內傳、其治太陽之邪者、可不預爲之計乎

●傷寒轉繫陽明者。其人濇然微汗出也。

●傷寒。脈浮而緩。手足自溫。是爲繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。大便鞭者。爲陽明也。

(按)此兩節、一言邪傳陽明之經、則濇然汗出、一言邪傳陽明之府、則大便硬也、

（說明）「手足自溫」、別於表熱也、蓋邪入少陰、則手足厥冷、病在太陰、則手足微溫、脾濕與邪熱薰蒸、或無汗、小便不利、其邪無從外洩、則身當發黃、

（論解）浮緩爲太陽之脈、若手足溫、嘔不能食、是邪在太陽、而內連太陰也、太陰濕盛、則邪熱鬱蒸而身發黃、若小便能利、濕從下洩、大便秘通、邪熱亦解矣、至七八日、濕去而熱不解、其必從陽明之燥化、而爲大便秘、然則邪從三陽傳入陽明者、非先身熱澀然以汗出乎、邪自三陰而內傳陽明者、非大便秘之爲燥結乎、故曰陽明居中土、爲萬物之所歸也、

●病人不大便五六日。繞臍痛。煩燥。發作有時者。此爲燥屎。故使不大便也

（按）此論燥屎結於腸胃之明證、

（說明）臍腹間、大小腸所居之處、燥屎內結、故「繞臍痛」也、

「發作有時」、謂潮熱盛於日晡之時、

（論解）邪在皮表、以汗出爲主體、病在陽明之府、以大便通降爲要則、但不大便之病因甚多、若濕盛氣滯、腸胃枯燥、或飲食減少、而腸胃空虛、或陽氣素弱、痰濁內秘而爲陰結者、是未可概以燥屎而論矣、故病人不大便五六日、其煩躁不安、內熱盛也、潮熱有時、血氣邪熱、兩相爭作也、然猶必繞臍而痛、脹滿拒按、則知其不大便者、腸胃之糟粕、爲邪熱搏結而成燥屎、是

以繞臍痛、爲燥屎之的證、其大小承氣之攻下、亦不可少緩矣、

●傷寒四五日。脈沉而喘滿。沉爲在裏。而反發其汗。津液越出。大便爲難。表虛裏實。久則譫語。

（按）此言病入陽明而誤汗之、以促成其胃家實之證、

（說明）誤汗、則傷其在表之津氣、故曰「表虛」、胃中乾燥、則在裏之實熱愈盛、故曰「裏實」
（論解）裏熱、則脈見沉數、邪氣壅滯、故胸滿氣喘、病起四五日時、雖在表之餘邪未罷、但在裏之邪、已化爲熱、不事清解、妄用發汗、其津液外越、胃實愈盛、先之府氣尙行者、今則大便燥結矣、邪熱不得下達而上擾、能不爲之譫語妄言乎、

●脈陽微。而汗出少者。爲自和也。汗出多者。爲太過。陽脈實。因發其汗。出多者。亦爲太過。太過。爲陽絕於裏。亡津液。大便因鞭也。

●脈浮而芤。浮爲陽。芤爲陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

（按）此二節、言治陽明病者、當慎察其脈也、

（說明）「脈陽微」、在表之邪微、則脈浮者亦微、故汗少出而邪解、卽「爲自和也」、若汗出多者、邪雖外解、而氣陰傷矣、故「爲太過」、

「陽脈實」、邪已化熱、若發汗過多、其津液外亡、「亦爲太過」也、「陽絕於裏」、汗出津液外亡、陽明亢熱之氣、無陰以和之、故阻絕於裏、而「大便因硬也」、

芤者、陰血不足、其脈、按之細小而中空也、故「芤爲陰」、陰津不足、氣盛爲熱、則脈芤數不靜、而浮於外、故曰「浮爲陽」、

〔論解〕病在表也、法當汗解、然寒熱微者、固不可過汗、其寒熱盛而陽脈實者、亦不可過汗、以汗多不虛其氣、必傷其陰、氣虛而寒、則病入三陰、津亡於外、陽絕於裏、故大便因之以鞭也、其有不因過汗而病燥結者、乃明陽陰津素弱、邪熱內傳、陽氣盛絕、故診其脈浮數而芤革也、前十節、歷舉陽明見證、以詳其傳變之理、此三節、復示表裏虛實之脈、以明其受病之因、脈證病理、各有不同、而文筆亦逐節變換、此傷寒論之所以百讀而不厭也、

●調胃承氣湯證

●太陽病。三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。

〔按〕此出胃燥熱蒸、調胃承氣之證治、

〔論解〕汗之不解、邪必內傳陽明、此雖三日、病氣未深、特以胃燥素盛、熱聚於內、而氣如炊籠之蒸發於外、與邪之在表、陽鬱發熱者不同、故一則宜解外、一則宜清裏也、然邪熱雖聚、

而無脹痛燥實等象、所以用調胃承氣、調和陽明亢盛之氣、不使熱實、以劫奪陰津焉、

●調胃承氣湯方（見太陽篇、）

●傷寒。十三日不解。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞭。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。調胃承氣湯主之。

（按此以誤下、燥熱未去、仍宜調胃法治之、）

（說明）「過經」、邪過太陽經、而之陽明、

腸胃之津液偏滲於前、則「小便利、大便鞭、」

「脈調和者」、非無病之脈、乃誤下後、血氣挫折、而脈來不見洪大耳、

「自下利者、脈當微厥」、陽虛下利、兩脈微遲微細、而手足厥冷也、

（論解）表邪兩週不解、今見譫語、知邪已過太陽、而之陽明、陽明熱盛、神識昏狂而譫語、但熱實之證、其脈必盛、大便亦鞭、今反下利、脈不沉微、手足不厥逆、而譫語昏狂如故、此爲內實、本可下之以大小承氣、但既因誤下於前、未可急攻於後、故用調胃承氣、緩利其邪熱也、

●陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。