

金匱鈎玄

影印古本醫學叢書之八
上海中醫書局發行

金匱鈞

八

丹溪先生金匱鈎玄目錄

卷第一

中風

六鬱

癰

寒

傷寒

暑

注夏

暑風

濕

內傷

火

傷風

發斑

疹

溫病

癰

咳嗽

痰

喘

哮

痢

禁口痢

泄瀉

脾泄

霍亂

乾霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

傷食

痞

噎氣

吞酸

嘈雜

五疳

消渴泄瀉

水腫

鼓脹

自汗

盜汗

吃逆

頭風

頭痛

頭眩

眩暈

眉痛

耳聾

卷第二

心痛

腰疼

脇痛

腹痛

痛風

勞瘵

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風

夢遺

精滑

濁

淋

小便不通

關格

小便不禁

癰

健忘

怔忡

驚悸

瘰

血塊

吐蟲

癰瘡

疔

脚氣

痿

發熱

陽虛惡寒

手心熱

手麻

手木

厥

面寒面熱

喉痺

纏喉風

咽喉生瘡

口瘡

酒查鼻

肺癰

肺痿

天疱瘡

漏瘡

痔瘡

腸癰

結核

脫肛

卷第三

婦人科

經水

血崩

帶下赤白

白帶并痛風

子嗣

胎前

胎動

惡阻

末胎

安胎

胎漏

子腫

難產

催生方

產後

血暈

補虛

消血塊

泄

惡露不盡

中風

發熱惡寒

小兒科

吐瀉黃疸

急慢驚風

疳病

痘瘡

腹脹

夜啼

口糜

脫囊

脫肛

木舌

癰疹

咯紅

喫泥

痢疾食積

解顱

蛇蟲

口噤

風痰

癩頭

赤瘤

鼻赤

丹溪先生金匱鈎玄目錄

中風

甲治法一治哮喘氣
乙原因
甲氣 中風 火逆

丙死症 驚一切脫
症 中風

丹谿先生金匱鈞玄卷第一

門人戴元禮錄

新安吳勉學校正

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛火興濕亦
有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從
痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直
視喉如鼾睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在

多吐之症候

此法須用於閑寒

之症

者用補法之症

候

補法宜用於氣虛

之症及血虛之

症

氣虛一服參湯

合竹瀝薑汁

血虛一四物湯

汁炒外如汁瀝

右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鰕汁皂角重用藜蘆半錢或三分

加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再

吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑

汁入內服能食者去竹瀝加荆瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稀

涎散

血虛者。四物湯補之。挾痰者。亦用薑汁竹瀝。

脉訣內言。諸不治證。見則不可治。筋枯者。不治。舉動則筋痛者。是筋枯。以其無血滋潤故也。

治痰氣實。能食用。荆瀝。氣虛少食用。竹瀝。

此二味用開經絡。行血氣。入四物湯中。必用薑汁助之。

肥白人。多濕。少用附子。烏頭。行經。

初昏倒。急搯人中。至醒。然後用去痰藥。二陳湯。四物。四君子等湯。加減用。

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也。當升者不得升。當降者不得降。當變化者不得變化也。此爲傳化失常。六鬱之病見矣。氣鬱者。胃脇痛。脉沉澁濕鬱者。周身走痛。或關節痛。遇陰寒則發。脉沉細。痰鬱者。動則卽喘。寸口脉沉滑。熱鬱者。脊小便赤。脉沉數。血鬱者。四肢無力。能食。便紅。脉沉。食鬱者。噯酸腹飽。不能食。人迎脉平和。氣口脉緊盛者是也。

氣血中和。萬病不生。一有怫鬱。諸病生焉。

氣鬱

香附子

蒼朮

川芎

濕

蒼朮

川芎

白芷

痰

海石

香附

南星

瓜蒌

熱

青黛

香附

蒼朮

川芎

梔子

血

桃仁

紅花

青黛

川芎

香附

食

蒼朮

香附

鍼沙

醋炒

山查

神麴

炒

春加芎

夏加苦參

秋冬加吳茱萸

越鞠丸

解諸鬱

又名芎朮丸

蒼朮

香附

撫芎

神麴

梔子等分爲

末水丸如菉豆大

凡鬱皆在中焦。以蒼朮撫芎藭。提其氣以升之。假如食在氣上。提其氣則食自降。餘皆倣此。

癰

大風病是受得天地間殺物之氣。古人謂之癰風者。以其酷烈暴悍可畏耳。人得之者。須分在上在下。夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出。在下者以通天散取惡物陳蟲於穀道中出。取出雖有道路之異。然皆不外乎陽明一經。治此證者。須知此意。看其疣瘡與瘡。上先見者。上體多者。在上也。下先見者。下體多者。在下也。上下同得者。在上後

在下也。陽明胃經與大腸無物不受。此風之入人也。氣受之則在上多。血受之則在下多。血氣俱受之者。上下俱多也。自非醫者神手。病者鐵心。罕有免此。夫從上從下以漸而來者。皆可治。人見其病勢之緩。多忽之。雖按法施治。病已痊可。若不能忌口絕色。皆不免再發。發則終於不能救也。余曾治五人。中間惟一婦人不再發。以其貧甚。而且寡。無物可喫也。餘四人三四年後皆再發。孫真人云。吾嘗治四五十人。終無一人免於死。非真人不能治。蓋無一人能守禁忌耳。此婦人本病藥外。又服百

餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分安愈
治法 在上者醉仙散在下者通天再造散後用通
神散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者
不治之也

醉仙散

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各半兩
爲粗末

同炒
紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風

各半兩

右八味爲細末每一兩半入輕粉三錢拌勻大人
一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間

必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下
惡臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急
者須以再造散下之候補養得還復與此藥喫須
斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒灸等物止可淡
粥及淡煮熟時菜食之茄尚不可食惟有烏稍蛇
菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

鬱金

半兩
生用

大黃

一兩
炮

皂角刺

一兩
黑者
大者

白牽牛

頭末六錢半炒半生用之

右爲末五錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄出蟲

如蟲口黑色乃是多年蟲口如赤色是近者三數日又進一服直候無蟲卽絕根也

寒 主乎溫散

有卒中天地之寒氣。有口傷生冷之物。

戴云。此傷寒謂身受肅殺之氣。口食冰水。瓜果冷物之類。病者必脉沉細。手足冷。息微。身倦。雖身熱亦不渴。倦言語。或遇熱病。誤用此法。輕者至重。重者至死。凡脉數者。或飲水者。或煩燥動掇者。皆是熱病。寒熱二證。若水火也。不可得而同治。誤卽殺人。學者慎之。