

臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸痺

哮

喘

呃

疽

臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰圃

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九全校

華旦玉堂

積聚

葛

噤怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則泯然無跡。

氣下鳥響皆木火餘威乃痼疝之屬攻伐消導必變腹滿以虛中挾滯最難速功近日痛滯。

木犯土
虛中挾滯

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍

廣皮

煨益智仁

又下午倦甚暮夜痛發陽微陰濁乃踞用溫通陽明法。

人參

吳萸

半夏

薑汁

茯苓

炒白芍

又

照前方去白芍加川棟牡蠣

無此藥

脾胃傷
氣分結
痞

白

四十

瘡邪久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可

宗但瘡母必在脇下以少陽厥陰表裏為病今脈弦大

面色黃滯腹大青筋皆露頸脈震動純是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘡母邪結血分又屬兩

途經年病久正氣已怯觀東垣五積必疎補兩施蓋緩

攻為宜。

生於朮

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

薑渣

水法丸

氣滯濕熱腑聚

馬

二三病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕鬱而

成熱六腑滯濁為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每

取丸劑緩攻當倣之

川連

蘆薈

名華上炙

雞肫皮

不落水去垢新瓦上炙脆

煨木香

小青皮

萊菔子

南山查

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱食滯

陳八濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱。

當進和中。忌口勿勞。不致變病。

黃芩 枳實 廣皮 萊菔子 白芍

白朮 蒼朮 雞肫皮 水泛丸

給痰凝脈

吳三右脇有形高突。按之無痛。此屬痕痞。非若氣聚凝痰。難以推求。然病久僅阻在脈。須佐針刺宣通。正在伏天

宜商。

真蛤粉 白芥子 瓜蒌皮 黑梔皮

半夏 鬱金 橘紅 薑皮

痺脈絡凝

曹著而不移。是為陰邪聚絡。診脈弦緩。難以五積肥氣。攻治大旨。以辛溫入血絡治之。

當歸鬚

延胡

官桂

橘核

韭白

王^三騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來右胸脇

形高微突初病脹痛無形久則形堅似梗是初爲氣結
在經久則血傷入絡蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強
支撐但氣鈍血滯日漸瘀痺而延癥瘕怒勞努力氣血
交亂病必旋發故寒溫消剋理氣逐血總之未能講究
絡病工夫考仲景於勞傷血痺諸法其通絡方法每取
蟲蟻迅速飛走諸靈俾飛者升走者降血無凝著氣可
宣通與攻積除堅徒入臟腑者有間錄法備叅末議

蜣螂蟲

塵蟲

當歸鬚

桃仁

川鬱金

伏梁

川芎 生香附 煨木香 生牡蠣 夏枯草

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢

某

伏梁病在絡。日後當血凝之慮。脈數左大。是其徵也。

厚朴 一錢

青皮 八分

當歸 一錢

鬱金 一錢

益母草 三錢

茯苓 一錢

澤瀉 一錢

某

脈數堅。伏梁病在絡。宜氣血分消。

桃仁 三錢

鬱金 一錢

芫蔚子 一錢

枳實 七分

厚朴 一錢

茯苓 三錢

通草 五分

自難經分出積者。陰氣也。五臟所生。聚者陽氣也。六腑所成。後巢氏病源另立癥瘕之名。以不動者為癥。

積聚之症各殊
治法亦迥別案
中皆泛之方治
積聚之法未及
百分之一學者
宜廣求之

動者爲瘕。究之亦卽難經積聚之意也。前賢有云。積聚者。就其官膜結聚之處。以經脈所過部分屬臟者爲陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者爲陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。著而不移。是爲陰。邪聚絡。大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜。不移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰邪者。自必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血。以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入絡。輒仗蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙於

古人書引伸觸類而得。若夫薈肫之去熱滯。芥蛤之豁凝痰。不過爲先生用古處也。案中積症第見伏梁。不能盡備。然宋時諸賢於五積九積治法載在書籍者頗多。大略消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。爾業醫者自當知之稔也。

姚亦陶

痞

痰熱內閉

宋

前議辛潤下氣以治肺痺。謂上焦不行則下脘不通。古稱痞悶都屬氣分之鬱也。兩番大便胸次稍舒而未爲全爽。此豈有形之滯。乃氣鬱必熱。陳腐粘凝膠聚。故脘腹熱氣下注。隱然微痛。法當用仲景梔子豉湯解其陳腐鬱熱。暮臥另進白金丸一錢。蓋熱必生痰。氣阻痰滯。一湯一丸以有形無形之各異也。

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢

此所云不服藥
為中醫說也近
日醫者之藥一
概俱停天下遂
無枉死之人矣

熱邪裏結

孫 寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液。

互膠成痰。氣不展舒。阻痺腕中。治法不但攻病。前議停藥。欲謬藥氣盡。病自退避。三舍耳。

人參

川連

鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

某 脈不清神煩倦中痞惡心乃熱邪裏結進瀉心法。

炒半夏

黃芩

黃連

乾薑

枳實

杏仁

劉

熱氣痞結。非因食滯。胃汁消燦。舌乾便難。苦辛開氣。酸苦泄熱。是治法矣。

川連

生薑

人參

枳實

橘紅

烏梅

生白芍

氣閉化熱

顧

氣閉久則氣結不飢不食不大便

常用酒燉

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又

氣結必化熱乃無形之病故徒補無益

鮮省頭草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何三煩勞之人衛氣少固霧露雨濕傷其流行清肅瘡癰
外涸腕脇反痺乃經脈為病無關腑臟

鈎藤

生白蒺

鬱金

白蔻仁

桑葉

橘紅

又氣室熱鬱仍治上可以通痺。

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

熱邪入厥陰

周

寒熱嘔吐。虬蟲自利。是暑濕熱外因。因嗔怒動肝邪。氣入於厥陰。胸滿腹脹。消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參甘加枳實白芍

伊

因驚而得邪。遂入肝。故厥後熱神識昏狂。視得面青。舌白微嘔渴。飲胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。宗仲景以瀉心湯為法。

暑濕伏
邪夾食

尤

川連

半夏

乾薑

黃芩

人參

枳實

面垢油亮。目皆黃。頭脹如束。胸脘痞悶。此暑濕熱氣
內伏。因勞倦。正氣泄越而發。既非暴受風寒。發散取汗。
徒傷陽氣。按脈形濡濇。豈是表症。凡傷寒必究六經。伏
氣須明三焦。論症參脈。壯年已非有餘之質。當以勞倦
傷。伏邪例診治。

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

薏仁

竹葉

又

胸痞自利。狀如結胸。夫食滯在胃。而胸中清氣。悉爲

濕濁阻遏。與食滯兩途。此清解三焦卻邪湯藥。兼進保和丸消導。

淡黃芩

川連

淡乾薑

厚朴

醋炒半夏

鬱金

白蔻仁

滑石

送保和丸三錢

暑邪阻氣

談氏

胸痞不饑。熱不止。舌白而渴。此暑邪未盡。仍清氣分。

鮮竹茹

淡黃芩

知母

橘紅鹽水炒

滑石

桔梗

枳殼汁

鬱金汁

某

惡寒泄瀉悉減。胸脘仍悶。餘暑未盡。胃氣未甦。故耳。

大麥仁

錢四

佩蘭葉

錢三

新會皮

錢一

半夏麴

炒錢半

金斛

半錢

茯苓

錢三