

00032

齊陽綱目



濟陽綱目目錄

卷六十

衄血

論

脉法

治方

犀角地黃湯一

止衄散二

茜根散三

河間生地黃散四

黃芩芍藥湯五

生地黃湯六

濟陽綱目

卷六十 目錄

一

生地黃湯七

川芎三黃散八

黃連散九

丹溪方十

生料雞蘇散十一

茜梅丸十二

麥門冬散十三

清肺飲十四

人參飲子十五

解鬱湯十六

地黃散十七

麥門冬飲子十八

天地膠十九 名辟穀丹

莎芎散二十 名芎附飲

生地黃湯二十一

白芨散二十二

寸金散二十三

麝香散二十四

龍骨散二十五

山梔散二十六

榴花散二十七

血餘散二十八

伏龍肝飲二十九

人中白散三十

熨法三十一

濟陽綱目

卷六十 目錄

一

濟陽綱目卷六十

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

衄血衄女六切音切鼻出血也俗作衄

陳無擇曰衄者因傷風寒暑濕流傳經絡漏泄於清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢而致者屬內所因飲酒過多咬炙燂辛熱或墜墮車馬傷

濟陽綱目卷六十

損致者此非內外因也原病式曰衄者陽熱佛鬱于於足陽明而上熱則血

妄行而鼻衄也

東垣曰衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生

地紫參丹麥阿膠之類主之

丹溪云衄血涼血行血為主大抵與吐血同犀角地

黃湯加鬱金

戴氏曰鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出治宜

芽花湯調止衄散服之有頭風自衄頭風纔發則

衄不止宜治頭風兼止衄之劑有因虛致衄此為

下虛上盛不宜過用涼劑宜四物湯加參芪沉香磨

服傷濕而衄腎着湯加川芎伏暑而衄宜芽花

湯調五苓散上膈極熱而衄犀角地黃湯加黃芩

芽花荆芥虛者茯苓補心湯飲酒過多而衄芽花

湯加川芎乾葛病衄愈後血因舊路一月或三四

衄又有洗面而衄日以爲常四物湯加阿膠蒲黃仍

佐以蘇子降氣湯使血隨氣下

葉氏曰風行水動氣行血流治衄者只知血藥以治

濟陽綱目卷六十

衄不知降氣則血歸經古人所以血藥中必加氣

藥一二味如蘇子降氣湯是也

李氏曰凡初衄不可遽止去多恐壅急用百草霜末

三錢水調服仍取一捻吹鼻中或用人中白末湯調

服更加髮灰一錢麝一字仍用少許搐鼻立止或將

患人頭髮分開并水濕紙頂上搭之亦好如鼻乾燥

以麻油點入潤之如吐衄太甚不止防其血暈用茅

根燒烟將醋酒之令鼻吸氣以遏其勢或暮然以水

噴面使帶驚則止此法非特衄血雖上吐下便九竅

出血者亦效。止後隨證虛實調之。用涼血散火藥不效者氣鬱血無藏也。古莎芎散天門冬膏。莫白切登也 蔭按夫口出血曰吐。鼻出血曰衄。血逆於中。血隨火上有此二證。然吐血責之府。衄血責之經。求其實則皆灸上之火也。犀角地黃湯主之火者。心之所司。故用生犀。生地以涼心而去其熱。心者肝之所生。故用丹皮芍藥以平肝而瀉其母。此窮源之治也。今人治吐血者以涼水濯其兩足。此釜底抽薪之意也。治衄血者以涼水拊其後頸。此責其火於太陽經也。皆是濟陽綱目

卷六十 衄血

三

良法。

脉法

脈經曰。脉來輕輕在肌肉。尺中自浮。目睛暈黃。衄血未止。太陽脉大而浮。必吐衄血。病人面無血色。無寒熱。脉沉弦者。衄也。難經曰。病若吐血復衄。脉當沉細實大。反浮大而牢者死。汗出若衄。其脉滑小者生。大燥者死。東垣曰。衄血者若但頭汗出。身無汗。及汗出不至足者死。

治方

犀角地黃湯

治衄血及吐血不止。易老云

此藥為最勝

生犀角

生地黄

赤芍藥

牡丹皮

各一錢

右咬咀作一服水煎溫服。無犀角以升麻代

之

止衄散

治饑困勞役動其虛火致衄不止

黃芪

赤茯苓

白芍藥

當歸

生地黄

阿膠

錢半

濟陽綱目

卷六十 衄血

四

右剉水煎服

或為細末每服三錢用茅花五

錢煎湯調下

茜根散

治陰虛衄血

茜根

阿膠

蛤粉

黃芩

側柏葉

生地黄

甘草

兩半

右剉每服四錢加姜三片水煎服不拘時

河間生地黄散

四

諸見血無外寒衄血下血

吐血溺血皆屬於熱但血家證皆宜服此藥

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天冬

黃芪 芍藥 黃芩 甘草 各等分

右剉每服一兩水一盞半煎至一盞去粗溫服
如脈微身涼要加桂半錢吐血者多有此證

黃芩芍藥湯 五 治陰火載血上行衄而不止

黃芩 炒 芍藥 酒炒 甘草 各三錢

右剉水煎服

生地黃湯 六 治上熱衄血

生地黃 阿膠 炒各一兩 川芎 桔梗 蒲黃

甘草 生用各五錢

濟陽綱目 卷六十 衄血 五

右咬咀每服八錢水煎入生姜汁二匙溫服

生地黃湯 七 治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡

一切丹毒

生地黃 赤芍藥 當歸 川芎 各等分

右咬咀每服八錢水煎服若鼻衄加蒲黃

生瘡加黃芩 丹毒加防風

川芎三黃散 八 治實熱衄血

大黃 濕紙裏煨 川芎 黃連 黃芩 各等分

石為末每服二錢井水調下食後服

黃連散 九 治大人小兒盛熱乘於血血隨熱

氣散於鼻者謂之鼻衄凡血得寒則凝凝結聚得熱則流散妄行

黃連 黃芩 柏葉 甘草 各等分 豆豉 三十粒

右咬咀每服一兩水煎食後服

丹溪方 十 治鼻衄脈數有熱

人參 三分 黃柏 甘草 各二分 生地黃 芍藥 各一錢

當歸 黃連 黃芩 各五錢

右剉水煎服

濟陽綱目 卷六十 衄血 六

生料雞蘇散 十一 鼻衄血者初出多不能止用

黃丹吹入鼻中乃肺金受相火所制然也宜此方

治之

雞蘇葉 黃芪 生地 酒洗 阿膠 白茅根 各一錢

麥冬 去心 桔梗 蒲黃 炒 貝母 去心 甘草 各五錢

右咬咀每服四錢加生姜三片水煎服

茜梅丸 十二 治衄血無時

茜草根 艾葉 各一兩 烏梅肉 炒乾

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九烏梅湯

下

麥門冬散 十三 治鼻衄不止

白芍藥 蒲黃 麥冬 各二錢 生地黄 三錢 生薑

錢一 右咬咀入蜜一合水一鍾半煎八分分作二服

清肺飲 十四 治衄血久不愈以三稜針於氣衝

上出血立愈更服此藥尤妙

五味子 十粒 麥冬 人參 當歸身 生地黄 各

分酒黃芪 錢一

濟陽綱目 卷六十 衄血 七

右咬咀作一服水煎食後溫服

人參飲子 十五 治暑月衄血

人參 黃芪 各一錢半 麥冬 當歸 甘草

白芍藥 各一錢 五味子 九粒

右咬咀作一服水煎溫服 按經曰必先歲氣

無伐天和故時當暑月則肺金受尅令人乏氣

之時也理宜清金益氣清金故用麥冬五味益

氣故用甘草參芪芍藥之酸所以收其陰當歸

之辛所以歸其血此亦虛火可補之例也

解鬱湯 十六

柴胡 黃連 黃芩 黃芪 地骨皮 生地黄

熟地 酒蒸 赤芍藥 各等分

右剉每服一兩水煎服

地黃散 十七 治衄血往來久不愈甚效

生地黄 酒炒 熟地 酒蒸 枸杞子 地骨皮 各等

右爲末每服二錢蜜湯調下日三服

麥門冬飲子 十八 治衄血不止

麥冬 心 生地黄 各等分 姜酒炒

濟陽綱目 卷六十 衄血 八

右剉每服一兩水煎服

天地膠 十九 治吐衄諸藥不止亦治咳血

天冬 一斤 熟地 黃斤半

右爲末煉蜜丸如彈子大每服三九溫酒下或

湯下日三服

莎芎散 二十 名芎附飲 衄血用涼血散火藥不效者氣

鬱血無藏也此方主之

香附 四兩 川芎 二兩

右爲末每服二錢茶清調 故香附開鬱行氣

使邪火散於經絡川芎和血通肝使血歸於肝

藏血歸火散其血立止

生地黄湯 二十一 治鼻衄昏迷不醒

用生地黄三五斤取汁服之仍以粗塞鼻中須臾

卽止

白芨散 二十二 治鼻衄不止

用白芨不拘多少爲末冷水調貼鼻竅下

千金散 二十三 治鼻衄不止

土馬鬃 舊草 甘草 各二錢 黃藥子 兩半

濟陽綱目 卷六十 衄血 九

右爲末每服二錢新汲水調下不止再服

麝香散 二十四 治鼻衄不止

白礬 枯過另研 白龍骨 粘者另研各五錢 麝香 五分

右三味拌勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血

涕然後吹藥於鼻中或以濕紙摺醃藥塞鼻內

尤妙

龍骨散 二十五 治鼻衄過多

用白龍骨不拘多少研爲末用少許吹入鼻中凡

九竅出血皆可用此藥吹之

山梔散 二十六 治鼻衄不止

用山梔子不拘多少燒爲末少許吹入鼻中

榴花散 二十七 衄血不止

用百葉石榴花晒乾爲末吹入鼻中立止

血餘散 二十八 治吐血衄血

頭髮燒灰存性爲末米飲調下二錢衄血者以少

許吹入鼻中

伏龍肝飲 二十九 治衄血

伏龍肝卽皂下對月焦土取半升以新汲水一大

濟陽綱目 卷六十 衄血 十

碗淘取汁和頓服

人中白散 三十 治衄血不止

人中白新瓦上焙乾溫湯調下三錢卽止

髮法 三十一 治衄血

用大紙一張作八摺冷水浸濕置頭頂心以熱髮

斗熨之良久立止

稽尚書方二十五

治咯唾血方二

聖餅子二十六

恩抱散二十七

荷葉散二十八

又方二十九

又方三十

天門冬丸三十一

黃連阿膠丸三十二

千金方三十三

白扁豆散三十四

槐花散三十五

白芨散三十六

紫光散三十七

加味小建中湯三十八

保命生地黄散三十九

濟陽綱目

卷六十一 目錄

干

一方四十

丹溪方四十一

又方四十二

又方四十三

濟陽綱目目錄

卷六十一

咳血嗽血咯血唾血

論

脈法

治咳嗽血方一

丹溪方一

金沸草散二

安嗽湯三

補肺湯四

黃芪散五

五味子黃芪散六

濟陽綱目

卷六十一 目錄

一

雲岐子芩散七

人參黃芪散八

加減逍遙散九

七傷散十

扭勞散十一

滋陰保肺湯十二

茯苓補心湯十三

人參芎當湯十四

續斷散十五

紫苑散十六

一方十七

東垣方十八

雞蘇散十九

大阿膠丸二十

雞蘇丸二十一

玄霜膏二十二

薏苡仁散二十三

丹溪方二十四

濟陽綱目卷六十一

涇陽張楠齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

咳血嗽血咯血嘔血

咳血者嗽出痰內有血唾血者鮮血隨唾而出咯血者咯出皆是血疔瘡

丹溪云咳血痰盛身熱多是血虛用青黛瓜蒌仁訶子海石山梔爲末姜汁蜜丸噙化嗽盛者加杏仁後

濟陽綱目卷六十一 咳嗽咯唾血

以八物湯加減調理痰盛宜再加痰藥唾血出於腎亦有

痰血內積肺氣壅遏不能下降用天門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志或加炮乾姜咯血用姜汁

童便青黛入血藥中如四物湯地黃膏牛膝膏之類有咯出痰帶血絲者同治但宜加痰火藥痰涎血出於脾以葛根黃芪

黃連芍藥當歸甘草沉香之類主之痰帶血絲用韭汁童便二物合和加鬱金末入內服之其血自消

舌上無故出血如線用槐花炒爲末搽之愈蔭按葉氏曰嗽血其因有二熱壅於肺者易治不過涼之

而已久嗽損於肺者難治漸已成勞也熱嗽有血宜金沸草散加阿膠痰盛加瓜蒌貝母勞嗽有血宜補肺湯加阿膠白芨嗽血而氣急者仍入杏仁如嗽痰中帶血絲者此是陰虛火動勞傷肺藏宜滋陰保肺湯

李氏曰嗽痰帶血屬脾經虛者六君子湯加桑白皮黃芩枳殼五味子有火者加減逍遙散咳血屬肺火上升痰盛身熱者龍腦雞蘇丸雞蘇散滋陰降火湯古百花膏黃連阿膠丸虛者一陳芎歸湯八物湯

濟陽綱目卷六十一 咳血唾血咯血

或二陳湯加嫩桂枝桑白皮杏仁桔梗知母貝母阿膠生地黃山梔子蓋嫩桂枝能治上焦故也愈後調理玄霜膏咳血咽瘡者不治血隨唾出屬腎滋陰降火湯唾中紅絲乃是肺痿難治咯出血屑或帶紅絲如線爲咯血有血在咽下咯不出者甚咯則有之此精血竭也四物湯加竹瀝姜汁童便青黛以聖餅子地黃膏蓄血在上閉塞清道喜忘者犀角地黃湯

脉法

脉經曰吐血唾血脉滑小弱者生實大者死。唾血脉堅强者生滑濡者死。

○治咳嗽血方一

丹溪方一 治咳嗽痰血

青黛 瓜蒌仁去油 訶子肉 海粉去砂 山梔子

炒黑各等分 咳甚加杏仁去皮尖後以八物湯加威調理

右爲末煉蜜同姜汁丸 舊按吳氏曰肺者至

清之藏纖芥不容有氣有火則咳有痰有血則

嗽青黛山梔所以降火瓜蒌海粉所以行痰訶

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 三

子所以斂肺然而無治血之藥者火去而血自

止也理也

金沸草散二 治熱嗽有血

旋覆花二錢 前胡 赤芍藥一錢 山梔 桑白皮

炒 荆芥穗 黃芩 橘紅各一錢 甘草五分

加阿膠

右剉水煎食遠服 痰盛加瓜蒌貝母

安嗽湯三 治咳嗽有血

五味子十五粒 茯苓 陳皮 知母 川芎各一錢

桑白皮 麥冬去心各一錢二分 馬兜鈴一錢半 粉草

右剉加烏梅一個去核水煎食遠服

補肺湯四 治勞嗽有血

人參 麥冬去心各一錢二分 五味子十五粒 款冬花

紫苑 桑白皮各一錢 當歸酒洗一錢半 芍藥一錢

知母 貝母 茯苓 橘紅各八分 甘草五分

右作一服水煎食遠服

黃芪散五 治咳血成勞

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 四

黃芪 麥冬 熟地砂仁炒 桔梗 白芍藥各五錢

甘草各四錢

右咬咀每服五錢水煎服

五味子黃芪散六 治嗽咯血成勞眼睛疼四

肢困倦脚腿無力

麥冬 熟地砂仁炒 黃芪 桔梗各半兩 人參二錢

白芍藥 五味子各二分 甘草一分

右剉每服四錢水煎日三服

雲岐子芩散七 涼心肺解勞熱

黃芪一兩 白芍藥 黃芩 人參 白茯苓

麥冬 桔梗 生地黃各半兩

右為蠶末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞

生姜三片煎一盞半入藥末三錢煎七分溫服

人參黃芪散八

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減食咳

嗽膿血

人參 桔梗各一兩

秦艽 茯苓 鱉甲去裙酥炙各二兩

兩 黃芪三兩

紫苑 柴胡各二兩 桑白皮

濟陽綱目

卷六十一 咳血唾血咯血

半夏各一兩 知母二錢

右為蠶末每服五錢水煎服

加減逍遙散九

治疫中見血

白朮 牡丹皮各一錢半 當歸 芍藥 桃仁

貝母各一錢 山梔子 黃芩各八分 桔梗七分

青皮五分 甘草三分

右作一服水煎服

七傷散十 治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子各一兩半 赤芍藥七錢 知母

元胡索 當歸各半兩 鬱金二錢半 山藥 乳香

沒藥 血竭各二錢

右為末每服二錢茶湯調下二方紅花當歸煎

湯 本草云黃藥子白藥子治肺熱有功

劫勞散十一

治肺痿咳嗽疫中有紅線盜汗發

熱熱過即冷飲食減少

白芍藥六兩 黃芪 甘草 人參 當歸 半夏

白茯苓 熟地砂仁炒 五味子 阿膠炒各二兩

右咬咀每服三錢加生姜三片棗二枚水煎溫

濟陽綱目

卷六十一 咳血唾血咯血

服無時日三服 陳日華云有女及笄病甚危

一歲之間百藥無效偶得此方只一料除根

滋陰保肺湯十二

治陰虛火動勞傷肺藏嗽疫

中帶血絲

黃柏鹽水炒 知母 天冬去心 阿膠蛤粉炒各一錢二分

當歸一錢 芍藥 生地黃 橘皮 桑白皮

以 紫苑各八分 五味子十五粒 甘草五分

右剉水煎服

茯苓補心湯十三

治心氣虛耗不能藏血以致

面色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血

當歸一兩二錢 白芍藥二兩 熟地黃一兩五錢 川芎

人參 白茯苓 前胡 半夏湯泡七次 紫蘇

枳殼炒 桔梗 甘草炙 陳皮 乾葛各五錢

右咬咀每服四錢水一鐘加生姜三片棗一枚

煎七分食後溫服

人參芎當湯十四 治虛勞少血津液內耗心火

爰燥熱乘肺金咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛

寒咳嗽

濟陽綱目卷六十一 咳血唾血咯血 七

當歸 川芎 白芍藥各五錢 人參 半夏製

橘紅 阿膠炒 赤茯苓 細辛 北五味

甘草炙各二錢半

右咬咀每服八錢加生姜三片水煎食後溫服

續斷散十五 治骨蒸勞熱傳尸瘦病潮熱煩燥

喘嗽氣急身疼盜汗兼治咳嗽唾膿血

續斷 紫苑 桔梗 青竹茹 五味子各三錢

生地酒炒 桑白皮各五兩 甘草炙二兩 赤小豆半斤

右剉每服三錢入小麥五十粒水煎日三服

紫苑散十六 治咳嗽唾血虛勞體肺癆變難

紫苑 人參 知母 貝母 桔梗 甘草

五味子 茯苓 阿膠

右剉加生姜水煎服

一方十七 治嗽而痰內有血

當歸 芍藥 知母 桔梗 麥門冬各一錢

貝母一錢二分 生地酒炒 天花粉各一錢半 茯苓八分

甘草五分

右咬咀水煎食後服

濟陽綱目卷六十一 咳血唾血咯血 八

東垣方十八 治痰帶血咳出

白朮一錢半 川歸 芍藥 牡丹皮各一錢 梔子

炒黑七錢半 桃仁另研 麥門冬各五錢 甘草生三錢

右剉水煎溫服

雞蘇散十九 治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇即薄荷 黃芩 生地酒炒 阿膠珠 貝母

白茅根各一錢 桔梗 麥門冬 蒲黃炒黑

甘草各五分

右剉水煎服

大阿膠九二十 治勞嗽及嗽血唾血

阿膠微炒 卷柏生地炒 熟地砂仁炒 乾山藥

大蓯獨根者 雞蘇葉 五味子各一兩 柏子仁

另研 茯苓 百部 遠志 人參 麥門冬

防風各半兩

右為細末煉蜜九如彈子大每服一九煎小麥

麥門冬湯嚼下

雞蘇九二十一 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血

血

濟陽綱目 卷六十一 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血

雞蘇葉八兩 黃芪 防風 荊芥各一兩 桔梗

川芎 甘草 菊花 生地黃各半兩 片腦五分

右為末煉蜜九如彈子大每服一九用麥門冬

去心煎湯送下

玄霜膏二十二 治吐血虛嗽神效

烏梅汁 梨汁 柿霜 白糖 白蜜 蘿蔔汁

各四兩 姜汁一兩 茯苓末乳汁浸 欬冬花末各二兩

紫苑末二兩

右共入砂鍋內慢火熬成膏九如彈子大臨臥

含化一九

薤苳仁散二十三 治肺癰嗽血

薤苳仁不拘多少

右研為細末以猪肺肺一箇煮熟蘸藥食之

丹溪方二十四 治嗽血吐血皆效

用猪心一個竹刀批開入沉香末一錢大半夏七

箇紙包數重外以童子小便沃濕慢火煨熟去半

夏喫之

諸尚書方二十五 治咳血

濟陽綱目 卷六十一 治咳血

人溺一物飲之按諸證齊之聖醫也其遺書曰咳

血不易醫喉不容物壅塞必咳血滲入喉愈滲愈

咳愈咳愈濇飲洩瀉則百不一死服寒涼則百不

一生隨用此方治咳血活者無數

○治咯唾血方二

聖餅子二十六 治咯血

青黛一兩 杏仁四十枚去皮尖以

右為末捏作餅子入柿餅內濕紙包裹煨連柿

餅研細米飲調服

恩抱散 二十七 治咯血吐血唾血及煩燥咳嗽

生蒲黃 乾荷葉 茅根 各等分

右爲細末每服三分濃煎桑白皮湯食後溫服

荷葉散 二十八 治咯血

荷葉 不拘多少焙乾

右爲末米湯調服二錢匕

又方 二十九 治咯血及衄血

白芍藥 兩一 犀角末 二錢半

右爲末新汲水調服一錢匕血止爲限

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 十

又方 三十 治咯血

桑白皮 一錢半 半夏 炒 陳皮 生地 酒炒 知母

貝母 茯苓 各一錢 桔梗 山梔 各七 阿膠 炒

杏仁 炒 甘草 各五分 柳桂 二分即桂之嫩小枝條也宜入治上焦

右加生姜三片水煎服

天門冬丸 三十一 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 兩一 甘草 白茯苓 阿膠 杏仁 炒

貝母 各五錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一九熱津含化

日夜可十丸

黃連阿膠丸 三十二 治嗽血唾血

阿膠 炒二兩 黃連 茯苓 各三兩

右黃連茯苓爲末水熬阿膠膏搜和丸如桐子

大每服三十九米飲下

千金方 三十三 治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血

生姜汁 杏仁 各二升 糖 蜜 各一升 猪膏 二合

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令

淨搗如膏和姜汁蜜糖等合煎令可丸每服如

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 十一

杏仁一枚日夜六七服漸次增加

白扁豆散 三十四 治久嗽咯血成肺痿及吐白涎

胸膈滿悶不食

扁豆 生姜 各半兩 枇杷葉 半夏 人參

白朮 各一錢 白茅根 三錢

右剉水三升煎一升去粗下檳榔末一錢和勻

分四服不拘時候

右二方用生姜多肺虛及汗多亡陽與便下血

者忌用

槐花散 三十五 治咯血失血

用槐花炒為末每服二錢糯米飲下仰臥

白芨散 三十六 治咯血

白芨 一兩 藕節 半兩

右為細末每服一錢湯調服神效或云白芨下

咽至血竅則竅為芨末填而血止也按試血法

吐在水盥內浮者肺血也沉者肝血也半浮半

沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煮熟

蘸白芨末日日食之若肺血以羊肺治餘做此

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 主

紫光散 三十七 咯血唾血出於腎此方主之

紫苑 知母 熟地 遠志 麥門冬

天門冬 心主

右剉水煎服

加味小建中湯 三十八 治疫涎中見血屬肝虛不

能攝血者

桂枝 甘草 芍藥 黃連 阿膠

大棗 生薑 片

右剉水煎服

保命生地黃散 三十九 治疫涎血出

生地 熟地 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芪 白芍藥 黃芩 甘草

右剉每服一兩水煎服

一方 四十 治咯血及疫中紅

白朮 牡丹皮 當歸 芍藥 桃仁

貝母 山梔子 黃芩 桔梗

青皮 甘草

右剉水煎服

濟陽綱目 卷六十一 咳血唾血咯血 主

丹溪方 四十一 治疫中血

白朮 牡丹皮 貝母 芍藥 桑白皮

山梔子 桃仁 甘草

右剉水煎服

又方 四十二 治疫中血

橘紅 半夏 茯苓 白朮 枳殼 桑白皮

黃芩 人參 五味子 甘草

或加青黛五分

右加生薑三片水煎服

又方 四十三

橘紅一錢 半夏 茯苓 牡丹皮 貝母

桃仁錢各一 黃連分七 甘草 大青分各五

加生姜三片水煎服

濟陽綱目

卷六十一

咳血 唾血 咯血

五

濟陽綱目目錄

卷六十二

溺血

論

治結熱尿血方一

梔子湯一

小薊飲子二

許合公方三

當歸承氣湯四

當歸散五

小薊琥珀散六

元胡索散七

一方八

濟陽綱目

卷六十三

目錄

一

治虛損尿血方二

加味四物湯九

牛膝膏十

一方十一

玉屑膏十二

鹿角膠九十三

髮灰散十四

六味六地九十五

雜方三

蒲黃散十六

一方十七

一方十八

一方十九

一方二十

姚氏方二十一

濟陽綱目卷六十二

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

溺血溺奴弔切與尿同小便也

丹溪云溺血屬熱用梔子炒水煎服之或用小蘗琥珀小蘗治下焦結熱血淋因血虛者四物湯加牛膝膏實者用承氣湯下之後以四物加山梔小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散服之蔭按

濟陽綱目卷六十二溺血

葉氏曰小便血痛者為血淋不痛者為溺血屬熱屬血虛又有因心腎氣結所致或憂勞房室過度此得之虛寒不可專以血得熱而淖奴教切音鬧溺甚曰淖二者皆致溺血熱用小蘗根散或五苓散合四物煎服效虛用四物湯調牛膝膏火動榮血妄行者再加黃柏知母虛寒者十全大補湯加炒蒲黃

李氏曰血從精竅中來乃心移熱小腸四物湯加山梔芩連單髮灰散入麝半釐沒苦酒湯下單苦酒湯單苦賣菜飲單琥珀散暴起熱者山梔一味水煎