

护理学（师）考前预测4套卷

李志宏，曹宝花，张美琴主编



人民军医出版社

护理学专业初级（师）资格考试

预测试卷一



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学 (师) 考前预测 4 套卷 / 李志宏, 曹宝花, 张美琴主编. —4 版. —北京: 人民军医出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5091-8946-7

I. ①护… II. ①李…②曹…③张… III. ①护理学—护士—资格考试—习题集
IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 275042 号

策划编辑: 张 晶 文字编辑: 许泽平 黄维佳 责任审读: 刘 平

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927278

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8610

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 三河市春园印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 11.5 字数: 279 千字

版、印次: 2015 年 12 月第 4 版第 1 次印刷

印数: 00001—10000

定价: 39.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

出版说明

全国初、中级卫生专业技术资格考试从 2001 年开始正式实施。考试通过后可取得相应的专业技术资格，各用人单位以此作为聘任相应技术职务的必要依据。2003 年，护士执业资格考试与护理学专业初级（士）资格考试并轨。目前，该考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，已经覆盖医、药、护、技 4 个系列的 114 个专业，每年参加考试的人数逾百万。各专业考试的通过率略有不同，一般为 50% 左右。实际的考试中一般会有 5% 左右的超大题考题，具有一定难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套全国初、中级卫生专业技术资格考试辅导用书，共 3 大系列，分别为《应试指导及历年考点串讲》系列、《模拟试卷及解析（纸质版）》系列、《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列，针对护理、药学等考生人数较多的专业，还出版了单科考试辅导、考前冲刺试卷等图书，共 163 个品种，覆盖 102 个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为全国初、中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书。

《全国初中级卫生专业技术资格考试（含部队）指定辅导用书》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点、难点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

《应试指导及历年考点串讲》系列共有 12 本，覆盖 36 个考试专业。这个系列的突出特点，是分析了历年两千道考试题，串讲历年考点，把握考试命题方向，有针对性地对考点知识进行详尽叙述。

《模拟试卷及解析（纸质版）》系列是针对专业人数较多的 39 个专业出版的，共有 31 个品种。每个专业一般有 6 套卷，2 400 题。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列共有 100 个品种，对应 100 个考试专业。每个专业一般有 4 套卷，1 600 题。其突出的特点，是专业相当齐全。考虑到部分专业每年考生数量太少，无法出版纸质书和纸质试卷的情况，《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列满足了这些专业考生的特殊需求。同时，针对从 2009 年开始临床医学、全科医学、中医类、计划生育等 65 个专业采用人机对话考试形式的新情况，《模拟试卷及解析（网络学习版）》采用了真实考试的人机对话界面，高度仿真，考生可提前感受与适应考试的真实环境，从而有助于提高考试通过率。同一个专业纸质版与网络学习版试卷中的试题不同，其复习参考价值都非常重要。为了达到互为补充、互为促进的效果，建议两者结合使用。

根据国务院颁布的《护士条例》的有关精神，2008 年开始，允许在校应届毕业生参加当年的护士执业考试。为此，我们专门为参加护士执业资格考试的考生准备了一套《护考急

救包》。近两年，该《护考急救包》与现场培训相结合，许多院校的考试通过率高达 95%，部分部队医院的培训通过率甚至达到了 100%，远高于全国的整体通过率。

本套考试用书对知识点的把握非常准，试题与真实考试的符合率非常高，许多考生参加考试之后对本套考试用书的质量给予了高度认可。考生通过考试之后的无比欣喜和对我们出版工作的由衷感谢、支持，是鼓励我们不断努力把考试产品做得更好的不竭动力。

本次印刷的版本在出版前，我们又组织了各学科的专家对所有试卷进行仔细审读，对一个版本中存在的个别错误进行了修正。但由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如仍有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列能增强心脏传导系统的自律性和心脏收缩力，提高血压并有除颤效果，作为心脏复苏首选药物的是

- A. 异丙肾上腺素
- B. 阿托品
- C. 利多卡因
- D. 肾上腺素
- E. 氯化钙

2. 女性生殖器肿瘤中发病率占首位的是子宫颈癌，好发部位是

- A. 宫颈鳞-柱状上皮交界处
- B. 子宫颈内口
- C. 宫颈管
- D. 宫颈阴道上部
- E. 宫颈阴道部

3. 类风湿关节炎最基本的病理改变是

- A. 血管炎
- B. 软骨炎症
- C. 滑膜炎
- D. 类风湿结节
- E. 关节畸形

4. 所谓交界性肿瘤是指

- A. 可能发生恶变的良性肿瘤
- B. 恶性肿瘤边界清晰包膜完整
- C. 形态上良性，浸润性生长，切除后易复发
- D. 中分化的恶性肿瘤
- E. 发生在多个脏器的良性肿瘤

5. 下列情况中一般不会发生新生儿寒冷损伤综合征的是

- A. 早产低体重
- B. 寒冷
- C. 窒息
- D. 巨大儿
- E. 感染

6. 维持人体内环境稳定最重要的神经内分泌器官是

- A. 肾上腺
- B. 性腺
- C. 下丘脑
- D. 甲状旁腺
- E. 胰腺

7. 妊娠期妇女所患的原发性高血压即妊娠期高血压疾病，其最基本的病理变化是

- A. 胎盘绒毛退行性变化
- B. 血液浓缩
- C. 全身组织器官缺血缺氧
- D. 凝血功能障碍
- E. 全身小动脉痉挛

8. 急性肾衰竭少尿期最危险的并发症是

- A. 出血倾向
- B. 血镁升高、低血钙、高血磷
- C. 代谢性酸中毒
- D. 水钠潴留导致水中毒
- E. 高钾血症

9. 下列与消化性溃疡发病相关的损害性因素中，占主导的是

- A. 胃酸、胃蛋白酶
- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 粗糙或刺激性食物
- D. 遗传因素

E. 服用非甾体抗炎药

10. 原发性下肢静脉曲张的病因不包括

- A. 先天性静脉壁薄弱
- B. 静脉瓣膜功能不全
- C. 长时间站立
- D. 深静脉血栓形成
- E. 长期负重腹压升高

11. 下列关于急性肾小球肾炎，描述正确的是

- A. 最常见的是慢性溶血性链球菌感染后导致的免疫反应性疾病
- B. 最常见的是急性溶血性链球菌感染后导致的免疫反应性疾病
- C. 病毒直接感染肾
- D. 单侧肾化脓性炎症
- E. 双侧肾化脓性炎症

12. 患者，女性，28 岁。因血压升高，双下肢水肿 1 周入院，尿检：尿蛋白(+++)，诊断为原发性肾病综合征。该患者水肿的主要原因是

- A. 毛细血管流体静压增高
- B. 蛋白质合成功能减低
- C. 蛋白质摄入不足
- D. 低白蛋白血症
- E. 微血管壁通透性增高

13. 妊娠期母体子宫的生理变化，下列描述正确的是

- A. 妊娠晚期子宫多呈不同程度的左旋
- B. 子宫体明显增大变软
- C. 子宫颈腺体分泌减少
- D. 子宫峡部收缩变短变厚
- E. 足月时子宫容积可达 1 000ml

14. 手术创伤会导致患者术后发生应激反应，早期的代谢改变是

- A. 高血糖
- B. 肝糖原合成增加
- C. 肝糖原分解降低

D. 肌肉蛋白质分解增强

E. 外源性脂肪分解促进糖异生

15. 以下选项中，最为常见的引起支气管扩张的病因是

- A. 支气管阻塞
- B. 婴幼儿期麻疹、百日咳
- C. 肺纤维化
- D. 肺脓肿
- E. 重症肺炎

16. 极低出生体重儿是指出生 1 小时内体重不足

- A. 1 200g
- B. 1 300g
- C. 1 500g
- D. 1 800kg
- E. 2 000kg

17. 宫内节育器可以避孕的原因是

- A. 阻止受精卵着床
- B. 改变宫腔内环境
- C. 阻止精子的运行
- D. 改变宫腔内的 pH
- E. 阻止受精卵的运行

18. 导致急性肾盂肾炎最常见的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 副大肠杆菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 变型杆菌

19. 丹毒的最常见致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. β 溶血性链球菌
- C. C 型链球菌
- D. 厌氧菌
- E. 大肠埃希菌

20. 引起小儿急性上呼吸道感染 90% 以上的病原体是

- A. 革兰阳性细菌
B. 革兰阴性细菌
C. 真菌
D. 病毒
E. 支原体
21. 引发心绞痛的最主要原因是
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 冠状动脉硬化和痉挛
C. 冠状动脉梗死
D. 全身小动脉痉挛
E. 冠状动脉畸形
22. 系统性红斑狼疮的发病机制是
A. 自身免疫
B. 精神压力过大
C. 对阳光过敏
D. 劳累过度
E. 对药物过敏
23. 消失最晚的小儿原始反射是
A. 觅食反射
B. 吸吮反射
C. 拥抱反射
D. 握持反射
E. 交叉伸腿反射
24. 刺激乳腺管增生的激素是
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 生长激素
D. 卵泡刺激素
E. 黄体生成素
25. 围生期是指产前、产时和产后的一个特定时期，目前我国围生期的时间规定是
A. 孕满 26 周至出生后 14 天
B. 孕满 28 周至出生后 14 天
C. 孕满 28 周至出生后 7 天
D. 孕满 32 周至出生后 7 天
E. 孕满 32 周至出生后 14 天
26. 与消化性溃疡有关的病原菌是
A. 大肠埃希菌
B. 溶血性链球菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 支原体
E. 幽门螺杆菌
27. 妊娠后，母体的血容量将会增加，达到高峰的孕周是
A. 22~25 周
B. 26~28 周
C. 29~31 周
D. 32~34 周
E. 34~36 周
28. 成人每日内生水量在非高分解代谢状态为
A. 100~150ml
B. 150~250ml
C. 250~350ml
D. 350~450ml
E. 500ml
29. 由子宫两侧至骨盆壁、将骨盆分为前、后两部分并维持子宫在盆腔的正中位置韧带是
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 骨盆漏斗韧带
30. 阿托品作为麻醉前用药，错误的是
A. 可松弛平滑肌
B. 可抑制涎腺、呼吸道腺体分泌
C. 可行皮下或肌肉注射
D. 心动过速者不宜应用
E. 可预防局麻药中毒
31. 小儿营养性缺铁性贫血好发于
A. 出生至 6 个月的新生儿
B. 1~6 个月新生儿

C. 6 个月至 2 岁的婴幼儿

D. 1~5 岁小儿

E. 6~14 岁儿童

32. 临床最常见的慢性宫颈炎炎症的病理类型为

A. 宫颈黏膜炎

B. 宫颈腺体囊肿

C. 宫颈糜烂

D. 宫颈水肿

E. 宫颈息肉

33. 护理道德监督方式应除外

A. 自我监督

B. 领导监督

C. 社会监督

D. 舆论监督

E. 制度监督

34. 最重要的诱发肺癌的危险因素是

A. 从事石棉等职业因素

B. 吸烟

C. 工业废气

D. 营养失调

E. 电离辐射

35. 以下哪项营养素是除水以外人体构成的主要成分

A. 脂肪

B. 碳水化合物

C. 维生素

D. 蛋白质

E. 纤维素

36. 心脏传导系统中心脏冲动的起源部位是

A. 结间束

B. 房室结

C. 窦房结

D. 左右束支

E. 浦肯野纤维

37. 新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征出

现不明显的原因是

A. 新生儿机体敏感性差

B. 囟门未闭所起的缓冲作用

C. 颈部肌肉不发达

D. 新生儿神经系统发育不完善

E. 脑膜炎症反应不明显

38. 以颈肩疼痛和僵硬为主要症状的颈椎病属于

A. 复合型

B. 交感神经型

C. 脊髓型

D. 神经根型

E. 椎动脉型

39. 心绞痛疼痛的特点应除外

A. 疼痛多数为持续疼痛

B. 疼痛位于胸骨体中或上段之后可波及心前区

C. 疼痛可放射至左肩、左臂内侧

D. 服硝酸甘油可缓解疼痛

E. 疼痛可伴有濒死感

40. 引发小儿急性上呼吸道感染最常见的病原体是

A. 病毒

B. 细菌

C. 衣原体

D. 支原体

E. 真菌

41. 肉芽创面淡红、表面光滑，质地松软，触之不出血时，换药时宜用

A. 凡士林纱布覆盖

B. 3%~5%高渗盐水纱布湿敷

C. 蒸馏水纱布湿敷

D. 等渗盐水纱布湿敷

E. 过氧化氢溶液（双氧水）纱布湿敷

42. 导致女性不孕的原因中最常见的是

A. 输卵管因素

B. 子宫因素

- C. 免疫因素
D. 外阴阴道因素
E. 卵巢因素
43. 不属于急性心力衰竭病因的是
A. 快速大量地输液
B. 广泛心肌梗死
C. 二尖瓣狭窄合并心动过速
D. 进食高蛋白高脂肪饮食
E. 严重的急性心肌炎
44. 以下符合泌尿系统梗阻早期病理改变的是
A. 肾实质病变
B. 肾盂积水
C. 梗阻以上的尿路扩张
D. 肾功能损害
E. 继发感染菌血症
45. 不符合颅内压增高病情改变的是
A. 脑血流量减少
B. 呼吸深而慢
C. 脉搏慢而有力
D. 脑血管扩张
E. 周围血管扩张
46. 不会导致中暑的情况是
A. 对高温的耐受性降低者
B. 环境温度超过 35℃
C. 湿度超过 60%
D. 大量出汗
E. 空气流通不畅
47. 最重要的颅内压增高的客观体征为
A. 心率减慢
B. 头痛
C. 口渴
D. 呕吐
E. 视盘水肿
48. 类风湿关节炎发生自身免疫反应产生的一种抗体是
A. 自身抗体 IgA
B. 自身抗体 IgD
C. 自身抗体 IgG
D. 自身抗体 IgE
E. 自身抗体 IgM
49. 以下不属于全身麻醉的临床表现是
A. 反射活动减弱
B. 明显肌肉松弛
C. 运动功能减弱
D. 中枢神经系统无知觉状态
E. 痛觉消失
50. 局麻药中毒出现严重惊厥，处理时的首选药物是
A. 吗啡
B. 地西泮（安定）
C. 哌替啶
D. 异丙嗪
E. 苯巴比妥钠
51. 属于烷化剂类的抗癌药是
A. 环磷酰胺
B. 巯嘌呤
C. 替加氟
D. 甲氨蝶呤
E. 丝裂霉素
52. 肺结核患者，久治不愈，出现剧烈头痛伴呕吐。查体有头向后仰、屈颈困难。
提示
A. 肩关节炎
B. 颈肌痉挛
C. 颅内压增高
D. 脑膜刺激征
E. 癫痫发作
53. 关于开放性骨折，说法错误的是
A. 颅底骨折伴脑脊液漏属开放性骨折
B. 骨盆骨折伴伤口漏尿属开放性骨折
C. 开放性骨折感染危险大
D. 开放性骨折断端外露不宜现场复位

E. 骨折处有皮肤擦伤出血，应属开放性骨折

54. 蜘蛛痣形成的可能原因是

- A. 严重感染
- B. 血小板减少
- C. 过敏性紫癜
- D. 出血性疾病
- E. 雌激素过多

55. 烧伤伤员五指并拢，其手掌面积约为体表面积的

- A. 1%
- B. 2%
- C. 7%
- D. 8%
- E. 9%

56. 高压氧疗治疗一氧化碳中毒的主要机制是

- A. 增加血液中溶解氧量使易向细胞内弥散
- B. 促进血液中碳氧血红蛋白解离
- C. 保护主要脏器供氧
- D. 加速体内血液循环
- E. 增加椎动脉血容量

57. 绒毛膜癌发生转移，最常见的部位是

- A. 肺
- B. 脑
- C. 肾
- D. 骨骼
- E. 阴道

58. 胆囊三角内有哪些重要结构穿行

- A. 肝动脉和副肝管
- B. 肝门静脉和胆囊动脉
- C. 胆囊静脉和肝门静脉
- D. 肝门静脉和肝动脉
- E. 胆囊动脉和副肝管

59. 婴儿上呼吸道感染早期高热最常见的并发症为

- A. 抽搐
- B. 中耳炎
- C. 结膜炎
- D. 肺炎
- E. 风湿热

60. 护士见习正常阴道分娩，护士讲解脐带结构正确的是

- A. 2 条动脉，2 条静脉
- B. 1 条动脉，2 条静脉
- C. 2 条动脉，1 条静脉
- D. 静脉较细但壁厚
- E. 动脉较粗但壁薄

61. ICU 基础监护的内容除外

- A. 血氧饱和度
- B. 持续心电图监护
- C. 出入量
- D. 血压
- E. 测瞳孔，每 2 小时 1 次

62. 颈部手术后出现抬肩困难，损伤的神经最可能是

- A. 交感神经
- B. 膈神经
- C. 喉返神经
- D. 喉上神经
- E. 副神经

63. 下列引起排尿困难的疾病除外

- A. 肾肿瘤
- B. 前列腺增生
- C. 膀胱癌
- D. 尿道结石
- E. 包茎

64. 肥厚型心肌病患儿最常见的死亡原因是

- A. 心力衰竭
- B. 心脏压塞
- C. 心源性休克
- D. 阿-斯综合征
- E. 洋地黄类药物中毒

65. 下列胎心属于异常的是

- A. 100/分
- B. 120/分
- C. 136/分
- D. 142/分
- E. 160/分

66. 小儿体液的分布与成人不同之处是

- A. 血浆的比例较高
- B. 间质液的比例较高
- C. 细胞内液比例较低
- D. 血浆与间质液均低
- E. 间质液与细胞内液均低

67. 长期食用未加热牛奶，婴儿可能发生

- A. 免疫力下降
- B. 铁丢失过多
- C. 消化不良
- D. 铁摄入不足
- E. 铁吸收减少

68. 吃腌制食物与肝癌发病有一定的关系，是因为腌制食物中含有

- A. 亚硝酸盐
- B. 黄曲霉素
- C. 烷化剂
- D. EB 病毒
- E. 较高的铬

69. 患者，男性，39 岁。消化性溃疡病史 5 年，未规律服药，本次因出现黑粪 3 天就诊，估计其每日出血量至少为

- A. 20ml
- B. 40ml
- C. 60ml
- D. 80ml
- E. 100ml

70. 患者，女性，58 岁。慢性支气管炎病史 10 年，慢性阻塞性肺气肿病史 5 年，入冬后因感冒着凉病情加重入院。护士在晚间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感左上胸

刺痛，胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体左侧胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为

- A. 肺梗死
- B. 急性心肌梗死
- C. 自发性气胸
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

71. 患者，女性，46 岁。2 周前因胃溃疡行胃大部切除术，现患者出现头晕、乏力、口唇黏膜苍白。查血红蛋白 75g/L，其贫血的原因是

- A. 铁转运障碍
- B. 铁吸收不良
- C. 储存铁减少
- D. 铁排泄增加
- E. 铁供给不足

72. 患者，女性，36 岁。主诉停经 42 天，阴道不规则出血 10 天，下腹胀痛 1 天就诊。妇科检查：阴道指检发现后穹饱满，并有触痛，后穹穿刺抽出不凝血 5ml，尿妊娠试验（+），诊断为异位妊娠，其可能的病因是

- A. 输卵管炎
- B. 盆腔炎
- C. 宫颈炎
- D. 阴道炎
- E. 外阴炎

73. 患者，男性，70 岁。突发急性广泛心肌梗死，经治疗，疼痛有所好转，继而出现呼吸困难，咳嗽，发绀，咳大量粉红色泡沫痰，其咳痰病因是

- A. 急性肺淤血
- B. 急性肺不张
- C. 急性肺水肿
- D. 急性肺炎
- E. 急性胸膜炎

74. 患者，男性，42 岁。某日参加酒宴饮酒过量，突感上腹部剧烈疼痛，伴有恶心呕吐。急诊入院，诊断为急性胰腺炎，该病原因为

- A. 暴饮暴食
- B. 消化酶分泌增多
- C. 大肠埃希杆菌感染
- D. 自体免疫
- E. 自体消化

75. 患儿，女，1 周岁。无母乳给予人工喂养。因上呼吸道感染出现咳嗽、发热、测体温 38.2℃。患儿突发抽搐，持续约 1 分钟。引发抽搐的原因是

- A. 脑血管畸形
- B. 低血糖
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 高热惊厥
- E. 低钙血症

76. 患者，女性，45 岁。进餐后 1~3 小时或在午夜至凌晨腹部钝痛、灼痛或有饥饿样不适感，进食后迅速缓解。此疼痛缓解的机制为

- A. 胃酸分泌减少
- B. 胃蛋白酶分泌减少
- C. 胃酸被中和
- D. 迷走神经张力增加
- E. 交感神经兴奋

77. 患者，男性，52 岁。从事搬运工作 28 年，双下肢内侧出现隆起、迂曲、扩张的静脉，部分呈团块状，足靴区出现淤滞性皮炎，诊断为原发性静脉曲张。不属于原发性静脉曲张发病原因的是

- A. 先天性的静脉壁薄弱
- B. 在湿冷的环境下工作
- C. 下肢静脉压力增高
- D. 静脉瓣膜发育不良
- E. 从事负重工作使腹压增高

78. 患者，女性，50 岁。体重指数（BMI）为 30。自诉经常头晕、头痛、耳鸣、乏力、失眠，查血 160/110mmHg，查三酰甘油 4.9mmol/L，胆固醇 8.12mmol/L，血糖 7.0mmol/L。导致患者血压升高最可能的发病机制为

- A. 胰岛素抵抗高血压
- B. 内皮素水平升高
- C. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统失调
- D. 细胞膜离子转运异常
- E. 交感神经兴奋，儿茶酚胺水平升高

79. 患者，女性，32 岁。口服短效避孕药进行避孕已 2 年，一次房事后当晚漏服，应告知补服时间为房事后

- A. 5 小时内
- B. 8 小时内
- C. 10 小时内
- D. 12 小时内
- E. 1 天内

80. 患儿，女孩，4 岁，在幼儿园染上水痘，其最可能的传播途径是

- A. 水源传播
- B. 体液传播
- C. 血液传播
- D. 呼吸道传播
- E. 消化道传播

81. 患者，男性，38 岁，近期发现排尿终末有血尿现象，该血液最可能来自

- A. 海绵体
- B. 输尿管
- C. 肾
- D. 膀胱颈部
- E. 睾丸

82. 产妇，30 岁，正常阴道分娩。查房时护士告知新生儿呼吸次数的正常范围是

- A. 70~80/分
- B. 60~70/分

- C. 40~60/分
- D. 30~40/分
- E. 20~30/分

83. 患者, 女性, 23 岁。头晕、乏力 1 年, 手足关节肿胀疼痛 2 年余。查体: 双手指间肌肉萎缩, 手指向尺侧偏; X 线片示关节腔变窄, 关节半脱位; 实验室检查: 抗链“O” 350U, 红细胞沉降率每小时 400mm。

此患者最可能的诊断是

- A. 外伤性关节畸形
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 骨质疏松
- E. 系统性红斑狼疮

84. 患者, 女性, 20 岁。1 型糖尿病 3 年。近日恶心、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸, 呼气可闻烂苹果味。患者出现的可能情况是

- A. 酮症酸中毒
- B. 呼吸衰竭
- C. 颅内压升高
- D. 低血糖
- E. 脑血管意外

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(85~86 题共用题干)

患者, 男性, 41 岁。维修家电时不慎触电, 心搏、呼吸骤停来院急诊, 需迅速心肺复苏。

85. 心脏复苏按压的部位, 正确的是
- A. 胸骨角
 - B. 胸骨上段
 - C. 胸骨下段
 - D. 胸骨中段

E. 胸骨剑突

86. 心脏复苏时, 应使胸骨下陷

- A. 1~2cm
- B. 2~3cm
- C. 至少 5cm
- D. 6~8cm
- E. 9cm

(87~88 题共用题干)

某新生儿母亲向护士咨询如何预防佝偻病, 护士指导其服用维生素 D。

87. 小儿开始服用维生素 D 的时间是

- A. 出生后立即
- B. 出生后 2 周
- C. 出生后 1 个月
- D. 出生后 5 个月
- E. 出生后 1 年

88. 每天服用维生素 D 的剂量是

- A. 100U
- B. 150U
- C. 400U
- D. 61 200U
- E. 1 500U

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(89~91 题共用备选答案)

- A. 长期反复接触化学毒物
- B. 暴饮暴食
- C. 慢性肝炎
- D. 血吸虫感染
- E. 循环障碍

89. 与急性胰腺炎的发病有关的是

90. 在我国引起肝硬化的主要原因有

91. 与原发性肝癌的发病最密切相关的因素是

(92~93 题共用备选答案)

- A. 出生后 1~2 天
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 4~5 天
- D. 出生后 5~7 天
- E. 出生后 10~14 天

92. 新生儿生理性黄疸开始消退的时间是

93. 大多数新生儿最早出现生理性黄疸的时间是

(94~96 题共用备选答案)

- A. 孕 24 周末
- B. 孕 28 周末
- C. 孕 32 周末
- D. 孕 36 周末
- E. 孕 40 周末

94. 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起点，用软尺测量宫底高度为 26cm (22.4~29.0cm)，其孕周为

95. 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起

点，用软尺测量宫底高度为 32cm (29.8~34.5cm)，其孕周为

96. 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起点，用软尺测量宫底高度为 33cm (30.0~35.3cm)，其孕周为

(97~98 题共用备选答案)

- A. 器官移植
- B. 输注移植
- C. 带蒂移植
- D. 游离移植
- E. 吻合移植

97. 干细胞移植的种类为

98. 烧伤病人皮瓣移植的种类

(99~100 题共用备选答案)

- A. 潜伏期
- B. 传染期
- C. 发热期
- D. 极期
- E. 后遗症期

99. 确定传染病检疫期的依据是

100. 确定传染病隔离期的依据是

相关专业知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列化验能提示早期肾衰竭的是

- A. 夜尿量测定
- B. 尿比重测定
- C. 尿蛋白测定
- D. 24 小时尿量测定
- E. 血尿素氮测定

2. 在分娩过程中，枕左前位胎头入盆衔接

的径线是

- A. 小斜径
- B. 大斜径
- C. 双顶径
- D. 双颞径
- E. 枕颈径

3. 原发性肝癌发生早期转移最常见的部位是

- A. 脑
- B. 肝内
- C. 肾
- D. 胆囊

E. 腹腔内种植

4. 急性感染性多发性神经根神经炎, 进行血清免疫球蛋白检测, 下列指标显著增高的是

- A. IgB
- B. IgD
- C. IgC
- D. IgE
- E. IgM

5. 治疗小儿心力衰竭时须立即停用强心苷的指征是

- A. 心率少于 90/分
- B. 心率超过 120/分
- C. 心电图显示出现病理性 Q 波
- D. 心电图显示室性期前收缩
- E. 心电图显示 ST 段下移

6. 蜘蛛痣形成的原因是

- A. 深部组织出血
- B. 小动脉分支扩张
- C. 皮下出血
- D. 皮肤组织出血
- E. 毛细血管和小静脉同时扩张

7. 最可靠的确诊输卵管妊娠的辅助检查是

- A. 子宫输卵管碘化油造影
- B. 腹部彩超
- C. 早孕试纸
- D. 阴道后穹穿刺
- E. 血绒毛膜促性腺激素 (hCG) 测定

8. 有助于判断类风湿关节炎关节病变分期的检查是

- A. 血常规检查
- B. 骨髓液检查
- C. 关节滑液检查
- D. 磁共振检查
- E. 关节 X 线检查

9. 治疗轻度溃疡性结肠炎最适合的药物是

- A. 青霉素
- B. 柳氮磺吡啶
- C. 头孢匹胺 (先锋利胺)
- D. 地塞米松
- E. 硫唑嘌呤

10. 肾结核病人术前药物抗结核的疗程至少应为

- A. 7 天
- B. 10 天
- C. 14 天
- D. 21 天
- E. 48 天

11. 当肝性脑病患者出现烦躁不安时, 临床常使用

- A. 可待因
- B. 肥皂水
- C. 哌替啶 (度冷丁)
- D. 地西泮
- E. 阿司匹林

12. 胆道蛔虫病首选的检查方法是

- A. X 线检查
- B. 磁共振检查
- C. 胆管造影检查
- D. B 超检查
- E. 胆囊造影检查

13. 以下不适于慢性肾衰竭患者的饮食是

- A. 清淡饮食
- B. 优质蛋白质饮食
- C. 高磷低钙饮食
- D. 补充维生素
- E. 易消化饮食

14. 与尖锐湿疣发病相关的病原体是

- A. 麻疹病毒
- B. 人乳头瘤病毒
- C. 疱疹病毒
- D. 柯萨奇病毒
- E. 人类免疫缺陷病毒

15. 对疑有胎盘胎膜残留的产妇，首选的措施是

- A. 应用宫缩药
- B. 按摩腹部
- C. 加强营养和休息，增强机体抵抗力
- D. 开腹探查
- E. 行刮宫术

16. 被动体位常见于

- A. 慢性肺气肿患者
- B. 左心衰竭患者
- C. 瘫痪患者
- D. 胎位不正患者
- E. 胸腔积液患者

17. 根据粪便常规检查结果：黏液脓血便，镜检有大量的脓细胞和分散的红细胞，提示

- A. 阿米巴痢疾
- B. 肠胃炎
- C. 胰腺炎
- D. 肝炎
- E. 细菌性痢疾、肠炎

18. 脓毒症时的热型是

- A. 高热
- B. 间歇热
- C. 不规则热
- D. 稽留热
- E. 弛张热

19. 符合胃穿孔时 X 线改变的是

- A. 双侧肺受压
- B. 胃萎缩
- C. 膈下游离气体
- D. 胃扩张
- E. 胃内有液平面

20. 患者，男性，26 岁。钝物撞击伤导致多根多处肋骨闭合性骨折，首选的治疗措施是

- A. 镇痛
- B. 建立静脉通道

C. 应用镇静药

D. 局部加压包扎固定

E. 应用抗生素

21. 下列用药方法最适合癫痫患者的是

- A. 单一用药
- B. 多种联合用药
- C. 口服用药
- D. 持续用药
- E. 静脉给药

22. 低血钾患者进行静脉输液补钾最重要的先决条件是

- A. 每日补钾量为 70~90mmol
- B. 每日尿量在 600ml 以上
- C. 补钾浓度不宜超过 50mmol/L
- D. 补钾速度不宜超过每小时 10~20mmol
- E. 每小时尿量在 30ml 以上

23. 下列不属于心搏骤停诊断依据的是

- A. 面色苍白，发绀
- B. 意识突然丧失
- C. 颈动脉搏动消失
- D. 呼吸停止
- E. 两侧瞳孔不等大

24. 中毒型细菌性痢疾，最有诊断意义的检查是

- A. 粪便细菌培养
- B. 周围血红细胞、白细胞计数
- C. 粪便镜检
- D. 尿培养
- E. 脑脊液特异性抗体检查

25. 进行基础代谢率（BMR）测定前，不需要的准备是

- A. 空腹
- B. 充足睡眠，禁止剧烈活动
- C. 不能服用兴奋剂
- D. 排空膀胱后
- E. 清晨醒来后静卧状态