

秦氏幼科折衷

凡例

一是編之作、因幼科諸書、非偏寒偏熱之誤、便喜補喜瀉之殊、予故儲而折衷之、因命曰幼科折衷、

一凡諸病總論、皆採內經要旨、以為提綱、繼之以歷代名醫可法之語、間或附以己意成篇、亦從本來、非臆說也、

一每論之首、錄舊人總括四句、使後學臨症時、便識其槩、其向缺者、予自補之、詞雖鄙俚、但便誦習耳、

一論首脉法、皆採王叔和脉經要語、本經缺者、則于歷代名醫諸書、採其可法者、以附錄之、其一二歲未可論脉、則有三關指

脉形、在下卷四十三條論內。

一論首諸方、大槩某病用某藥、故止錄諸方、為後學設繩墨、其分量重輕、并修合服法、大畧不出書、欲學者随机應變、因時制宜、決不可妄執古方、以治今病也。

一凡諸書有可採句、論中未能盡述、俱補遺于論之首、以便參閱。

一痘疹一書、或坊刻、或家傳、種々不一、然多有可採處、予另有痘疹折衷一集、茲不編入。

一幼科與大方症、用藥原無大異、予有內科折衷、亦須兼看。

一此集本為初學而設、當善藏之、不可輕傳外人、反取謗詈。
一論中稍有疑難字眼、悉照海篇直音註解、以便初學者之誦
讀、

記錄十四科

古醫十四科、而今亡之矣、自宋元以來、止用十三科、其十四科
者、中有脾胃一科也、今亦終莫之續、考醫政、其一為風科、二為
傷寒科、三為大方脉科、四為小方脉科、五為婦人胎產科、六為
鍼灸科、七為眼科、八為咽喉口齒科、九為瘡瘍科、即是
外科十為正

骨科十一為金鑲科十二為養生科

即今修養家導引按摩咽納是也

十三為

祝由科
經曰移精變氣者可祝由而已即今符祝禳禳道教是也

初生護養

小兒食物所宜

鯽魚

鰻魚

殺虫

田雞

鴨

肚子

肺頭

火肉

風魚

蓮肉

芡實

榧子

殺虫

熟棗

熟栗

圓眼

山藥

扁豆

小甌糕

小兒食物所忌

蜜同瓜

水紅菱

白蒲朮

荔枝

硬蚕豆

油膩物

汁淘飯

粽子

鷄虫

麵食

糯食

蛋

桃子

古廟凶祠不可入之則神驚狂禽

異獸不可戲戲之則神恐閉爭之處

十月嬰兒初孕育肌膚未實陰未足正當

生下未啼時急以拭去胎液毒黃連甘草

硃蜜佳免致斑瘡夭死速五六日間臍未

乾縱然炎熱休頻浴但將故絮遮其身下

體單寒常露足見此風日有何妨月裡頻

啼終是福胎毒胎熱得以伸熱氣隨啼無

蘊蓄勿令過愛不置懷免與新綿重被覆

昧者重綿尚恐寒乳哺不離猶恐哭但見

不可近、近之則心偏枯、木大樹之下、不可息、防久陰之炁觸入、

稀豆方

三豆湯

赤小豆 大黑豆 綠豆 甘草

各一升、以三豆淘淨、用水八升煮、豆熟為度、迺日空心、任意吃豆飲、汁七日、永不出、

油飲子 童子用

真麻油一斤

迺日飲盡、永不出、

以上二方、出扁鵲倉公書、

龍鳳膏

烏雞卵一个

地龍一條 活而細者方用

者、

微風便感寒、纔聞音响時驚愕、做出疾病、不可言、所以富兒多命促、吾嘗語此歷驗、之、故此子孫多易鞠、凡小兒病、宜先觀形症神色、然後察脉、假如肝之為疾、則面青、心之為病、則面赤、脾之為病、則面黃、肺之為病、則面白、腎之為病、則面黑、先要分別五臟形症、湏看稟受、盈虧、胎氣虛實、明其標本而治之、無不可、

以蠶開一小孔入地龍在內夾皮

紙糊飯甑蒸熟去蚰與兒吃之每

歲立春日食一枚亦可蚰蛭性白

頭者可用誤用殺人

入門審候歌

觀形察色辨因由、陰弱陽強髮硬柔、若是

傷寒雙足冷、要知有熱肚皮求、鼻冷便知

小兒初生臍帶脫落取置新瓦上用
是瘡疹耳冷應知風熱症、渾身皆熱是傷

炭火四圍燒至烟盡放土地上用瓦
寒上熱下冷傷熱病、

蓋之類蓋之存性研為細末預將硃

砂透明者為極細末水飛過臍帶若
五指稍頭冷驚來不可當、若逢中指熱必

有五分重硃砂用二分五厘生地黄
定是傷寒、中指獨自冷麻痘症相傳、女右

當歸身煎濃汁一二蜆殼調和前兩

味抹兒上臍間及乳母乳頭上一日
男分左分明仔細看、

之內至晚食盡次日大便遺下穢污

濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生

觀面部五色

一子則得一子、十分妙法也。

面赤為風熱、面青驚可詳、心肝形此見脉、
症辨溫涼、脾怯黃疳積、虛寒皤白光、若逢
生黑氣、腎敗命湏亡、

小兒三歲以下有病、湏看男左女右手、虎
口三關、從第二指側看、第一節名風關、第
二節名氣關、第三節名命關、辨其紋色、紫
者屬熱、紅者屬寒、青者驚風、白者疳病、黑
者中惡、黃者脾之困也、若現于風關為輕、
氣關為重、過於命關、則難治矣、

三關脉紋主病歌

紫黑紅傷寒

青驚白是疳

黑時因中

惡

黃即因脾端

又

青色大小曲

人驚併四足

赤色大小

曲

水火飛禽撲

紫色大小曲

紫^傷米

面魚肉

黑色大小曲

脾風微作搐

幼科折衷上卷

廣堃山人景明秦昌運編集

總括

急慢驚風

附慢脾

面紅赤中渾身熱唇黑牙關氣如絕
目翻搐搦喉有聲此是急驚容易決

內經曰諸風掉眩皆屬肝木蓋小兒係純

又

陰虛陽寢盛病已深吐餘瀉後睡揭睛

陽之體為其真水未旺心火已炎肺金受

神昏搐緩涎流甚此症分明是慢驚

制而無以平木故肝木常有餘而脾土常

脉法

浮數洪緊為急驚沉遲散緩為慢驚

不足也為父母者或失于保養抱于當風

虎口紋青紫為驚風形勢滑入裡者
為順出外者為逆

迫于熱地或辛辣多食衣衾過厚邪熱鬱

醫學綱目云搐一也而有晨夕之分

蒸積于心傳于肝再受人物驚觸未發之

表裏之異。身熱力大者為急驚。身冷力小者為慢驚。仆地作聲。醒時多沫者為癰。頭目仰視者為天吊。角弓反張為瘥。而治各不同也。

寬氣飲

枳殼

枳實

人參

甘草

三解散

人參

防風

天麻

茯神

時夜卧不穩。睡中或笑或哭。齧齒齬乳。鼻額有汗。氣促痰鳴。忽爾悶絕。目直上視。口噤不開。手足搐掣。此熱甚而然。況兼面紅脉數可辨。蓋心有熱而肝有風。風主乎動。火得風則煙焰起。二陽相鼓。風火相搏。肝藏魂。心藏神。因熱則神魂易動。故發驚也。心主乎神。獨不受觸。遇有驚則發熱。極生風。故能成搐。名曰急驚。以寬氣飲。三解散去參主之。如暴感此症。未別陰陽虛實。

山梔

白附

大黃

赤芍

黃芩

姜蚕

全蝎

枳殼

甘草

實者加大黃、藿香、虛者加參

五苓散

白水

猪苓

茯苓

澤瀉

肉桂

寬熱飲

玄明粉

枳殼

大黃

甘草

病有相似而寔不同、此余素所經驗

近有小兒先覺身熱、少頃便僵、仆不

知人事、目睛上視、口唇牽動、狀如驚

風、掣跳不止、一醫以驚風治之、食頃

先用五苓散和寬氣飲、少加寬熱飲、三藥

合用、薑汁沸湯調灌、即解、大抵治搐之法、

以寬氣為妙、氣順則搐停、此自然之理、予

嘗感慨諸人、每見驚風搐作、不明標本、混

為一症、遽用金石腦射、蜈蚣蛇蝎、大寒搜

救、殊不知驚生于心、風生于肝、搐始于氣、

是為三症、其驚與風、首已詳及、所謂搐始

于氣者、蓋因風寒暑濕燥火之氣、有一不

急慢

間屢醒屢搖故招予視之予問曰兩
口熱否病家曰前日午時發熱至傍
晚方止昨日無恙不意今午後熱遂
成驚風予曰此宿食頑痰膠固于中
榮衛不行邪正相攻乃瘧疾也以金
石鎮驚之藥投之寧無助火為患乎
命渠且勿服藥恐藥毒交攻病勢反
劇至下午少減以二陳湯加查麥青
皮枳榔葛粉服之至次日瘧作而餘
症悉退又服消痰散表之藥四劑而
瘧愈

順便蓄于喉膈間搏于心肺傳入肝經其
氣上不能升下不能降使津液鬱滯不得
流行故痰涎壅蔽而作搖也亦宜寬氣飲
治之

然當知所以受病如病在驚、由痰熱得、
只可退熱化痰其驚自止病在風、由驚
作、只可利驚化痰其風自散病在痰涎急
須退熱化痰若也有搖須用截風散驚此
不治之症也

黃芪益黃散

人參 黃芪 甘草 白芍

陳皮 黃連 白茯苓

看手法

風關青黑如懸針主水瀉易治氣關
赤色如懸針主疳病兼肺臟積熱稍
可治命關凡有此脉不問五色皆是
危症又三關通度如懸針主慢驚難
治風關青如魚刺易治乃初瀉之候
黑色難治氣關青如魚刺主疳癆身
熱易治命關青如魚刺主虛風邪傳
脾難治三關青是四足驚赤是水瀉

東垣云小兒瀉青有驚當先補其土後瀉
其木其風木旺症右關脉洪大掌中熱臍
皮熱者是也今立一方黃芪益黃散主之
人參甘草黃芪各等分此三味皆溫補脾
土益元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以
甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒能瀉火酸
能瀉肝木而大補肺金所補得金土之位
火旺則火虛矣風木何由而來尅土然後
瀉風木之旺脾虛者以火邪乘其土位故

黑是人驚

驚風有四症八候四症者驚風痰熱

是已八候者搐搦掣顫反引竄視是

已搐者兩手伸縮搦者手指開合掣

者兩若相撲顫者頭偏不正反者兩

手仰向後引者臂若開弓竄者目直

視怒視者睛露不活四症已具八候

生焉四症既無八候安有

急驚風大呌三兩聲者是心絕難治

急驚四肢俱軟者不治急驚鼻中出

血者為熱將散易治口中出血則難

治大小便秘者易治尿尿遺者難治

閉黑紋直者死

四肢厥冷二便不禁服煖胃回陽以

也故曰從後來者為虛邪火旺能實其水

水旺故乘尅土當于心經中以甘溫補土

之源更于脾土中瀉火以甘寒補金以酸

涼故致脾土中金旺火衰則風木自虛也

矣

有傷風後發搐者口中氣出熱呵欠煩悶

手足動搖此氣血未實不能勝任故也治

當先發散大青膏主之

有傷食後發搐者身溫多睡或嘔吐不思

治之治之不効乃稱不治予嘗治而効不可因其有此症便說不治也

大青膏

白附

青黛

天麻

全蝎

硃砂

烏蛇

附香

天竺

大青葉

瀉青丸

當歸

胆草

川芎

山柰

羌活

防風

大黃

白餅子

消石

輕粉

半夏

南星

巴豆四十粒去皮尖水一升煎水

乳食此食滯而氣亦因之而滯故發搐也

當先定搐加羌活防風兼下瀉青丸後用

白餅子下其食漸用異攻散養其氣

有欲出麻疹而發搐者身溫多睡或嘔吐

不欲飲食此乃熱乘于心心火炎上故目

睛上竄其症耳輪鼻尖手足稍冷噴嚏眼

澁睡中驚跳是也但無痰涎為異耳治法

當平肝木利小便平肝木則風自去利小

便則心熱除風熱既退則痘出而搐愈矣

急慢