

卷十三

心藏脉論

心虛實

脉灸法

脉極

脉虛實

心腹痛

胸痺

頭面風

附頭眩

卷十四

小腸腑

小腸腑脉論

小腸虛實

舌論

風眩

風癰

風虛驚悸

好忘

孫真人備急千金要方

孫真人備急千金要方卷十三

心臟方凡八類

心臟脈論第一論一首

論曰心主神神者五臟專精之本也爲帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅爲耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳內右耳耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名囟囟主藏神號五神居隨節應會故云心臟脈脈舍神在氣爲吞在液爲汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燭灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢邱山烟火凡心臟象火與小腸合爲腑其經手少陰與太陽爲表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈞心脉洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得卽引水漿漑灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊己用牢根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此爲重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母夏脈如鈞夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故

其氣來盛去衰故曰鈞反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩心上見咳唾下爲氣泄 心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣爲本心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後居如操帶鈞曰心死 真心脈至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死 夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病 心臟脈脈舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破腠脫肉毛色悴夭死於冬 手少陰氣絕則脈不運少陰者心脈也心者脈之合也脈不通則血不流血不流則髮不澤面黑如漆柴者血先死壬篤癸死水勝火也 心死臟浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心火王其脈浮大而散

一作

洪曰平反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子爲虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母爲實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘心水之尅火爲賊邪大逆十死不治反得微澀而短者是肺之乘心金之陵火爲微邪雖病卽瘥腎乘心必瘥 左手關前寸口陰絕者無心脈也若心下熱痛掌中熱時時喜嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰實者心實也是心下有水氣憂悲發之刺手心主治陰 心脈來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脈也 心脈急甚爲瘕瘕微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微緩爲伏梁在心下上下行有時唾血大甚爲喉介微大爲心痹引背善淚出小甚爲善噦微小爲消痺滑甚爲善渴微滑爲心疝引臍小腹鳴漚甚爲瘖微漚爲血溢維厥耳鳴癰

疾 心脈搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病瘡渴自己

渴一作環

赤脈之至也喘而堅詮曰有積氣

在中時害於食名心痹得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有病則口生瘡腐爛 心在聲為笑在變

動為憂在志為喜喜傷心精氣并於心則喜心虛則悲悲則憂憂則笑笑則喜 時主夏病者時間時甚知其

源取其腧觀其應審其害 病先發於心者心痛一日之肺喘咳三日之肝脇痛支滿五日之脾閉塞不通身

痛體重三日不已死冬夜半夏日中 病在心日中慧夜半甚平旦靜 假令心病北行若食豚魚得之不者

當以冬時發得病以壬癸日也 凡心病之狀胸內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛虛則胸腹

大脇下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者 心脈沈之小而緊浮之不喘

苦心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思 心病其色赤心痛短氣手掌

煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脈實大而數此為可治宜服

闕宜服者藥

春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺

大陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之

此是手心胞絡經

又當灸巨闕五十壯背第五椎壯百 邪在心則病心痛

善悲時眈仆視有餘不足而調其輸 憂愁思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒 心中風者翕翕發熱不能

起心中飢而欲食則嘔 心中寒者其人病如噉蒜薑狀劇者心痛徹背背痛徹心如蠱注其脈浮者自吐乃

愈 心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也 邪哭使

魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣

衰者卽爲癰陽氣衰者卽爲狂五臟者魂魄之宅含精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟空虛也卽邪神居之神靈所使鬼而下之脈短而微其臟不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液卽爲涕泣出肺氣衰者卽泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲呼心水者其人身體腫一作重而少氣不得臥煩而躁其陰大

腫真心痛手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行痛有休作心

腹中熱善渴涎出者是虵咬也以手聚而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼腸中有蟲虵咬皆不可取以小鍼心脹者煩心短氣臥不安凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以心爲牡藏小腸爲

之使故小腹當有形診得心積沈而芤時上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身瘦癯主血厥夏差冬劇色赤也心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不愈病煩心心痛以秋

庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結爲積故知伏梁以秋得之心病煩悶少氣大熱熱上湯心嘔咳吐逆狂強語汗出如珠身體厥冷其脈當浮今反沈濡而

滑其色當赤而復黑者此是水之尅火爲大逆十死不治徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經

第十方見前語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好自笑此爲厲風入心荊瀝湯主之方見前第八卷心虛風寒半

而反憂此爲水尅火陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱熱則狂悶亂冒昧言多謬誤不可採聽此心已傷
若其人口唇正赤可療青黃白黑不可療也 心病爲瘧者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱

方見前第十卷

其人本來心性和雅而忽弊急反於常白朮酒主之

方見前第八卷

或言未竟便住以手剔腳爪此人必死禍雖未及

名曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可治者明以察之 赤爲心心合脈赤如雞冠者吉心主

舌舌是心之餘其人火形相比於上微赤色廣則兌面小頭好肩背脾腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有
氣輕財少信多慮見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬感而生病主手少陰數數然髑髁長
短傾正則心應之正赤色小理者則心小小則邪弗能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不
能傷易傷於邪無髑髁者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善忘難開以言髑髁小短舉者則心下
下則藏外易傷於寒易恐以言髑髁長者則心堅堅則藏安守固髑髁弱以薄者則心脆脆則善病消痺熱中
髑髁直下不舉者則心端正端正則和利離傷髑髁向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也

下云若髑髁小

短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒病憂患內損心暴痛而好唾清涎口臭蟲齒痛侵唇齒若髑髁高起
則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌傷小兒則便秘口重舌鵝口聲嘶方
見頭面 凡人部分陷起者必有病生小腸太陽爲心之部其處陷起卽病生矣藏舍內外部亦內外沈濁屬內
方中 浮清居外若外病內入小腹滿起內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前補陰後瀉陽陽則實

熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則藏神前變形於外人心前病則口爲之開張若心前死則

枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日內促則不延旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黯點如博碁見顏度年上此必卒死心絕一日死何以知之兩目回直視肩息立死凡面赤目白憂患思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日死又面黃目赤不死赤如衄血血死吉凶之色若在於分部臍臍而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣 夏火心脈色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火始治心氣始長脈瘦氣弱陽氣留滯熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也所謂盛經者陽脈也 其脈本在外踝之後應在命門之上三寸命門者在心上一寸也脈根在少澤少澤在手小指端 其筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結肘內兌骨之後彈之應小指之上入結腋下其支者後走腋後廉上繞肩甲循頸出足太陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直出耳上下結於頤上屬目外眥 其脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頤抵鼻至目內眥斜絡於顴合手少陰爲表裏少陰本在兌骨之端應在背後同會於手太陽 其手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃主心生病病實則小腸熱熱則節弛弛則陽病腸脈大反逆於寸口再倍病則噤痛頤腫耳聾目黃臥不能言悶則急坐虛則小腸寒寒則生虺虺則陰病陰脈反小於寸口過於一倍病則短氣百節痛筋急

頸痛不能轉顧此盡是手太陽小腸經筋脈支別爲病今取心主胞絡少陰心經附於後手心主之別名曰內關去腕五寸甲乙作二寸出於兩筋間循

經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則爲煩心取之兩筋間 手心主之脈起於胸中出屬心包下膈歷

絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循膈內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循

中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端也是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹

澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎 手少陰之

別名曰通理在腕後一寸別而上行循經入咽中系舌本屬目系其實則大膈虛則不能言取之掌後一寸別

走太陽 手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上俠咽系目系系目系一作循胸出脇其直者

復從心系却上肺出腋下下循膈內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌後

內廉循小指之內出其端是動則病噤乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脇滿痛膈臂內後

廉痛厥掌中熱痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎 手

少陰之脈獨無輸何也曰少陰者心脈也心者五臟六腑之大主爲帝王精神之所舍其臟堅固邪不能容

之則傷心心傷則神去神去則身死故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈故少陰無輸也少陰

無輸心不病乎曰其外經腑病臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也 夏三月手心小腸赤脈攢病其源

從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病

也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脈掉捉所不禁若臟實則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶故

曰赤脈攢病

方見傷寒卷中

扁鵲云灸腎肝心三膻主治丹

一作

毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二

脈四首 灸法一首

方十一首

心實熱

左手寸口人迎以前脈陰實者手少陰經也病苦閉大便秘不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

石膏湯

治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛方

石膏一斤 淡竹葉

香豉各一升

小麥

地骨皮

茯苓三兩 梔子仁

三七枚

右七味咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮取二升去

滓分三服

外臺名瀉肺湯

〔衍義〕

靈樞云手少陰之脈獨無腧少陰心脈也心者五臟六腑之大主也精神之所舍也其臟堅固邪弗

能容也容之則傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡受邪則欲吐不

吐煩悶喘急故宜石膏清熱降火為主人但知石膏解利陽明熱邪不知本經原有中風寒熱心下逆氣諸

治中藏梔子豉湯主心下懊憹為清膈熱之專藥竹葉解煩清心合地骨皮主五內邪氣熱中消渴以本經

與枸杞同列不分不知實為地骨皮主治也小麥雖為肝穀能助少火而通心包與瀉心湯中用人參助長

諸藥同意彼主乾嘔故用半夏此治心熱故用石膏淡竹同治心熱而所主各有攸宜也

半夏瀉心湯 治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安方 人參 黃芩 甘草各一兩 乾薑一兩

半夏連一兩 半夏半升 大棗十二枚 右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂若寒加附子一

枚渴加栝蒌根二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩客熱以生薑代乾薑

大黃黃連瀉心湯 治心氣不足吐血衄血方 大黃二兩 黃連 黃芩各一兩 右三味咬咀以水三升煮取

一升頓服亦治霍亂

〔衍義〕半夏瀉心湯在傷寒治心下滿而不痛在金匱治嘔而腸鳴心下痞千金借以治下利腸鳴心下痞滿乾嘔似與心臟無關然痞滿雖屬太陽其瑕正在心下駸駸上犯心包不得不以芩連祛熱半夏滌痰乾薑導火人參甘棗輔正祛邪為務也 大黃黃連瀉心湯在傷寒治心下痞按之濡關上脈浮之證在金匱治心氣不足吐血衄血與千金主治相同總取芩連以清三焦之火大黃以蕩大腑之滯乃救心包蘊熱之專藥餘說見十卷傷寒門甘草瀉心湯下

心小腸俱實 左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實

竹瀝湯 治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安方 淡竹瀝 生地黃汁各二兩 石膏八兩 芩藥 白朮 人參

梔子仁各三兩 赤石脂 紫苑 知母 茯神各二兩 右十一味咬咀以水九升煮十味至二升七合去滓下

竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

〔衍義〕胃爲五臟之本心爲五臟之主胃氣不得轉運外則身熱內則便難包絡之火散漫無以主持神識故用參朮茯神實其中土則火不致於乘虛內擾地黃芍藥石膏知母竹瀝梔子仁得以建清心降火之功紫苑開結氣於上石脂固藥力於下也

茯神散

治心實熱口乾煩渴眠臥不安方

茯神

麥門冬

各三十
六銖

通草

升麻

各三十
銖

紫苑

桂心

各十
銖

母一兩

赤石脂

四十
二銖

大棗

二十
枚

淡竹茹

雞子大
一塊

右十味治下篩爲粗散以綿裹方寸七并花水二升半煮

取七合時動裹子爲一服日再

〔衍義〕

前竹瀝湯治胃氣不能轉運故用人參白朮杜心包火於內此以肺燥不能勝熱故用麥門冬桂心

蒸發津氣於上又以升麻通草上升下泄輔佐清熱導火之方紫苑赤石脂知母茯神與前竹瀝湯不殊也

安心散

治心熱滿煩悶驚恐方

白芍藥

遠志

宿薑

各二
銖

茯苓

赤石脂

麥門冬

知母

紫苑

石膏

各四
銖

人參

二十
銖

桂心

麻黃

黃芩

各三
銖

歲蕤

三十
銖

甘草

十二
銖

右十五味治下篩爲粗散先以水五

升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸七半以絹裹時動之煎取八合爲一服日再

〔衍義〕

此兼竹瀝湯茯神散二方之製方中麻黃遠志歲蕤卽茯苓散中升麻桂心麥門冬之義人參甘草

黃芩卽竹瀝湯中人參白朮梔子之義三方合究其微則滋中寓清清中寓散散中寓清之法了然心目矣

治不能食胸中滿膈上逆氣悶熱方 灸心膻二七壯小兒減半

心虛寒 左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出一作汗

忘恐走不定婦人崩中面色赤方 茯苓四兩 桂心 甘草各一兩 紫石英 人參各一兩 麥門冬三兩 大棗十二枚

赤小豆二十枚 右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

〔衍義〕人參茯苓補手少陰氣分石英桂心補手少陰血分甘草大棗乃參苓之匡佐麥門冬赤小豆乃英

桂之報使并開泄心包旺氣以療喉舌諸疾石英兼行足厥陰而主婦人崩中以其能溫經散結也

半夏補心湯 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山邱平澤者方 半夏六兩 宿薑五兩 茯苓 桂心 枳實

橘皮各三兩 白朮四兩 防風 遠志各二兩 右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

〔衍義〕茯苓補心湯兼調肝氣半夏補心湯兼調脾氣方中桂心宿薑溫補心脾枳朮橘半溫理胃氣茯苓

佐桂心下導虛陽防風佐白朮上散溼濕遠志一味通心氣之專藥

牛髓丸 通治百病虛癆羸乏等方 牛髓 羊髓 棗膏 白蜜 酥各一升 麥門冬 芎藭 桂心 當歸

茯苓一作茯神 甘草 羌活各三兩 乾地黄 乾薑各三十兩 人參 五味子 防風各一兩 白朮四十兩 細辛十八兩 右

十九味切搗十四味篩別研聚膏和散次內諸髓蜜和攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎取堪作丸如梧子大酒服三十丸稍加至四十丸日再

〔衍義〕牛髓丸治百病虛羸兼調五臟以心爲君主諸臟之氣靡不稟之於君方用桂心茯苓以補心芎藭當歸以調肝乾薑白朮以溫脾人參門冬以益肺地黃五味以滋腎甘草聚膏以和胃二髓蜜酥以充髓羌防細辛以司督脈而禦外邪不但兼調五臟并以交濟陰陽則四維莫安而九重寧謐矣

心小腸俱虛左寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱病也病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛

大補心湯 治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮方 黃芩 附子各一兩 甘草 茯苓

麥門冬 乾地黃 桂心 阿膠各三兩 半夏 遠志 石膏各四兩 生薑六兩 飴糖一斤 大棗二十枚 右十四

味取十三味咬咀以水一斗五升煮取五升湯成下糖分四服

〔衍義〕方下所主虛損不足心氣弱悸而方所用反屬足少陰巨陽之藥其義云何夫君主之令良由相火所司故專取桂附收攝虛陽則麥門冬阿膠茯苓地黃之屬得以上充靈臺其他半夏甘草薑聚飴糖實其土臟黃芩石膏清肅心包遠志交通心腎若腎志不虧遠志似可不用水臟無泄附子儘可勿施語言無妄心包原無火擾石膏亦宜裁酌四肢安和脾陽猶能自強薑聚飴糖量減未爲不可師古人方須要得古人

意活法在心奚必固守成則哉

補心丸 治臟虛善恐怖如魘狀及婦人產後餘疾月經不調方 當歸 防風 芎藭 附子 芍藥 甘

草 蜀椒 乾薑 細辛 桂心 半夏 厚朴 大黃 猪苓各一兩 茯苓一作茯神 遠志各二兩 右十六味爲

末蜜丸如梧子大酒服五丸日三不知加至十丸冷加熱藥

〔衍義〕恐怖雖屬心腎之虛然如魘狀乃虛陽鼓激痰涎湧塞心包而成正虛邪實之象虛能受熱故用薑附實能受寒故用大黃獨倍用遠志引領諸藥歸就心包以建補虛逐實之功諸臟安和則君主泰然又何必專用補心之藥乎

心勞第三論一首 方一首

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

大黃洩熱湯 治心勞熱口爲生瘡大便秘閉澀不通心滿痛小腸熱方 大黃 澤瀉 黃芩 芒硝

梔子仁各三兩 桂心 通草 石膏各二兩 甘草一兩 大棗二十枚 右十味㕮咀用水九升先以水一升別浸大

黃一宿餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烊分三服

〔衍義〕心勞則火氣內燔勞之太過則心氣內洞固宜補脾以益之土實則火不妄發君主自寧若火氣方

熾又須泄熱爲務硝黃石膏羣行泄熱惟取桂心爲從治之導耳

脈極第四 論一首 方一首 灸法二首

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病爲脈痹脈痹不已復感於邪內舍於心則飲食不爲肌膚咳脫血色白不澤其脈空虛口脣見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脈爲心風心風之狀多汗惡風若脈氣實則熱熱則傷心使人好怒口爲赤赤甚則語言不快血脫色乾燥不澤飲食不爲肌膚若脈氣虛則寒寒則咳嗽則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痹故曰心風虛實候也生地黃煎 治脈熱極則血氣脫色白乾燥不澤飲食不爲肌膚消熱止極強胃氣方 生地黃汁 生麥門冬 赤蜜各一升 尊心一作鼓 遠志各二升 人參 白朮 茯苓 芍藥 乾地黃各二兩 甘草二兩 石膏六兩 生薑 麴四兩 右十三味十一味咬咀以水一斗二升煮取二升七合去滓下地黃汁及蜜更煎取三升半分四服

〔衍義〕血枯氣脫脈極而咳故用二地芍藥以滋血參苓朮甘以益氣門冬歲麴以潤肺尊心石膏以清胃達志赤蜜以通心而行諸味膩滯之性也

灸法

胸中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯穴在俠巨闕兩邊相去各半寸一寸云 顏色焦枯勞氣失

精肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

脈虛實第五

論一首 方三首 鍼灸法二首

論曰凡脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿凡脈虛實之應主於心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒則應腑也

防風圓 補虛調中治脈虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒方 防風 桂心 通草 茯神 遠志 麥

門冬 甘草 人參 白石英各三兩 右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服之十丸日再加至四十丸

〔衍義〕脈虛而用桂心石英遠志當矣反用防風為主兼木通同入手足太陽引領人參茯神等味歸就心

與小腸千金奧旨於此稍露一斑特為拈出以開學人心目

升麻湯 治脈實洪滿主心熱病方 升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝各三兩 生地黃切一升

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

〔衍義〕脈實洪滿心與包絡邪實之應心主血故用生地黃黃芩涼血為主然火逆上僭非芒硝梔子竹葉

澤瀉并通二陰不能旋折其威又需升麻開發於上分解蘊隆之勢也

麻黃湯 調心洩熱治心脈厥大寸口小腸熱齒齲噤痛方 麻黃 生薑各四兩 細辛 子芩 茯苓 芍藥

各三兩 白朮二兩桂心一兩生地黃切一升 右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加芒硝二兩

〔衍義〕心脈厥大言左寸沉伏而按之益大應指厥厥動搖故宜生地黃黃芩清利伏熱卽以麻桂薑辛辛溫散結茯苓白朮填其空以杜火氣之復入芍藥爲地黃之佐使勢甚則加芒硝與前升麻湯法不殊

鍼灸法

脈不出鍼不容穴在幽門兩傍各一寸五分是 心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯

心腹痛第六

論一首 二十六首
熨蒸一首 針灸法二十五首

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胸痹感於寒微者爲咳甚者爲痛爲泄厥心痛與背相引善癢如物從後觸其心身僂偃者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也厥心痛如以鍼錐刺其心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死虵心痛心腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是虵咬也以手按而堅持之勿令得移以大鍼刺之復久持之蟲不動乃出鍼心下不可刺中有成聚不可取於膻腸中有蟲虵咬皆不可取以小鍼

治寒氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃

芍藥

柴胡

各四兩

升麻

黃芩

桔梗

硃砂

各三兩

鬼臼

鬼箭羽

桂心

朴硝

各二兩

右十一味

咬咀

以水九升

煮取二升七合

分三服

先分硃砂作三分

每服內

一分

攪勻服之

得快利如痛不止宜服後方

赤芍

六兩

桔梗

杏仁

各五兩

右三味

咬咀

以水六升

煮取