

R 2-31

34-1a

此葉天士家藏秘書也前此流傳皆為贗本余歸田後始得原書重為訂註附於傷寒論金匱要略之後蓋以傷寒論金匱要略為萬古不易之準繩而此書則奇以取勝也然奇而不離於正故可取焉

閩長樂陳念祖識

姑蘇葛可久先生精通方術與丹溪朱彥修齊名所著十藥神書專治虛損雖編中僅列十方而用藥之次第逐一條陳吳航陳修園謂其奇而不離於正誠哉是言也顧前此流傳皆成贗本修園解組後始得原書重加註解將刊附於傷寒論金匱要略之後而未果已卯歲夏從舊書坊中得一抄本於今三年矣遍詢方家俱無是書嘗不敢私自秘藏因並作湯方俚歌亟謀付梓以廣其傳庶不負先生壽世壽人之意云爾

成豐歲次疆圉大荒落季冬月後學林壽萱謹跋

程序

吾吳天士葉先生凡治吐血証皆祖葛可久十藥神書更參以人之性情病之淺深隨宜應變無過不及治無不愈然亦治之於初病之時與夫病之未經深入者若至五載遍傳雖盧扁亦莫可如何矣家藏此書有年幾獲脈望政事仔梓然書中僅列十方世皆以方少忽之不知十方中錯綜變化有幾千百方故復探周氏之說使人粗曉業是者更察虛損二字分自上而下自下而上自不致概以六味開手矣古吳瘦樵程永培識

葛氏自叙

夫人之生皆稟天地之氣而成形宜乎保養真元固守根本則一病不生四體輕健若曰不養真元不守根本病即生矣根本者氣血精液也予得先師之教萬病無如癆証之難蓋因人之壯年血氣充聚精液完足之際不能守養惟務酒色豈分饑飽日夜耽怒無有休息以致耗散精液則嘔血吐痰骨蒸煩熱腎虛精竭形羸頰紅面白口乾咽燥小便白濁遺精溢汗飲食難進氣力全無斯因火乘金位重則半年而斃輕則一載而傾况為醫者不究其源不通其治或大寒大熱之藥妄投亂進不能取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫者無察其情予師用藥治療如羿之射無不中的余以用藥次第開列於後用藥之法逐一條陳如嘔血咳嗽者先服十灰散

擋住如不住者煩以花蕊石散止之大抵血熱則行血冷則凝見黑則止此定理也血止之後患人必舒解其體用獨參湯補之令其熟睡一覺不要驚動醒則病去六七矣次服保真湯止嗽寧肺太平丸潤肺扶痿消化丸下痰疏氣保和湯分治血盛痰盛喘熱盛風盛寒盛六事加味治之餘無加法又服藥法曰三日前服保真湯三日後服保和湯二藥相間服之為準每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸徐徐噙下次噙一丸緩緩化下至上床時候如此用之夜則肺竅開藥必流入肺竅此訣最為切要如痰壅却先用錫糖烊消化凡百丸吞下又依前噙太平丸令其仰卧而睡嗽必止矣如有餘嗽可煮潤肺膏服之復其根本完其真元全愈之後方合十珍丸服之此謂收功起身藥也前藥如神之妙如神之靈雖倉扁再世不過於此吁世之方脈用藥不過草木金石碌碌之常耳何以得此通神訣要奇異之靈也余蒙師授此書吳中治癆何止千萬人而未嘗傳與一人今此書恐就泯失重次序一新名曰十藥神書留遺子孫以廣其傳時至正乙酉一陽日可久書於姑蘇養道丹房

余自髫稚覺醫業道孜究方脈三十餘年遍歷江湖多學廣傳者不過言語文字形容之耳及至用藥治病皆不能捷是以日夜苦心用志務在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方術用藥如發矢無不中的余曰心神人也遂拜為師得授奇方一冊閱之或羣隊者或三四味者皆余目覩至人用效者也使余如久旱逢霖夜行得月心中豁然自此四至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可鑄粹者也余以三餘暇日將至人所授奇方併日用決效之法類成一帙名曰十藥神書蓋用效者輒記錄之今西浙大癆道人與余通家之好用禮求授故錄以奉養生濟人之功用爾時至正戊子春正月三陽日可久再書於姑蘇養道丹房

姑蘇葛可久編

長樂陳念祖徐園注
閩東治林壽萱洲甫龍

甲子十灰散 治嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薑

小薑

荷葉

扁柏葉

茅根

茜根

山梔

大黃

牡丹皮

棗榔皮

京墨

半碗

調服

五錢

食後

服下

如病勢輕用

此立止如血出成升斗者用後藥止之

十灰大小薑大者梔子茅根茜草根側柏葉同荷葉等瓊榔皮並牡丹皮

陳修園按前散自注云燒灰存性今藥肆中止知燒灰則色變為黑而不知存性二字大有深義蓋各藥有各藥之性若燒之太過則成灰灰無用之物矣惟燒之初燃即速放於地上以碗覆之令滅其火俾各藥一經火燥色雖變易而本來之真性俱存所以用之有效人以為放地出火氣猶淺焉者也然余治証四十餘年習見時醫喜用此藥效者固多而不效者亦復不少推原其故蓋因製不如法亦因輕藥不能當此重任必須深一步論治審其脈共而赤傷於醉惱怒者為火載血而上行証余製有惜紅丸日夜三四服但須以麻沸湯泡服不可煮服為囑審其素能保養脈況而細面赤淡白血來時外有寒冷之狀者為陽虛陰必走証余製有惜紅散加鮮竹茹日夜服三劑其藥之配合散見於拙刻各種中茲因集謐不能備登

己字花蕊石散 五藏崩損湧噴血成升斗用此止之

花蕊石人以假存性研為末右用童便一盞燉溫調末三錢甚者五錢食後服下男子用酒一半女人用醋一半與童便和藥服使瘀血化為黃水服此以後藥補之

花蕊石須火煅研細分酒醋和童便功能化瘀為黃水輕用三錢重五錢

舊註但瘦無以名號為未得傳治吐血者競推萬古而先生首以二方止血明明剝毫無顧忌細玩始知先生意之所到理之精也人生於陽根於陰陰氣虧則陽自勝上氣為之喘促致吐痰沫發熱面紅無不相因而致故留得一分自家之血減得一分上升之火易為收拾何今日之醫動以引血歸經為談不過概用止血之味甚至

有吐出亦美璽反為害遂令遷延時日陰虛陽旺煎熬不止至於不救果誰之咎執引經而緩時日冀復元神吾恐有形之血豈能使之速生而無偶之陽何法使之速降此先生所以急於止血之大旨也 陳修園按虛勞証金匱以桂枝加龍骨牡蠣湯從腎虛以立法建中湯從脾虛以立法黃耆建中湯從氣血兩虛以立法八味地黃丸天雄散溫其下元從脾胃氣血之總根虛以立法是以補虛為一大綱也以薯蕷丸治風氣百疾虛羸諸不足是以祛風為一大綱也以大黃䗪蟲丸治乾血成癆是以逐瘀為一大綱也三綱鼎足為此証不易之準繩令葛仙翁以花蕊石散繼於十灰散之後雖云止血寔欲使瘀血化為黃水而不見血也然自余思之吐血既止而離經之血蓄而不行不可不用此散化之若血來勢如泉湧相續不絕竟用此散令其盡化為水是令一身之血俱歸烏有尚有生理乎讀書不可死於句下此其一也且三大綱因虛而成癆醫書恒有治法而因風而致者言之頗罕而因瘀血而致者除仲景金匱大黃䗪蟲丸仲景小品百勞丸外未有發明其旨且金匱以薯蕷丸與大黃䗪蟲並舉意以風氣不去則足以賊正氣而生長不禁乾血不去則足以留新血而滲灌不周怯証種種所由來也余治吐血諸藥不止者用金匱瀉心湯百試百效其效在生大黃之多以行瘀也 附錄仲景百勞丸方當歸炒乳香沒藥各一錢人參分數瓣䗪蟲十四個去翅足水蛭十四個炒桃仁十四粒去皮尖大黃四錢蜜丸如梧桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物為度服白粥十日百勞水者杓楊百遍即甘瀉水也

丙字獨參湯

止血後此藥補之

大人參二兩
去蘆

右每服水一盞棗五枚煎一盞細呷之服後熟睡一覺後服諸藥除根

功建三才得今名陰陽血脫可回生人參二兩棗五枚服後方知氣力充

舊註凡失血後不免精神怯弱神思散亂前方雖有止血之功而無補益之力故有形之陰不能即復而幾微之氣不當急固乎頓使獨參湯不但脫血益氣亦且陽生陰長觀先生自註云熟睡一覺使心安氣和則煩除而自靜蓋人之精神由靜而生亦由靜而復也奈何今之醫者遇吐血家乃視參如毒耶 陳修園按神農本草經云人參氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明日開心益智久服輕身延年經文只此三十字其後續云王補五藏以五藏屬陰也精神不安驚悸不止目不明心智不足皆陰虛為亢陽所擾也今五藏

得甘寒之助則安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣火即邪氣也今五藏得甘寒之助則邪氣除矣細味經文無一字言及溫補回陽何後人信從宋元無稽之說而反疑開天明道之聖經相此証用至二兩以失血之後藏陰大虛陰虛則不能維陽陽亦隨脫故用二兩任專力大可以頃刻奏功但人參雖有補虛之功而欬嗽者忌之乘此大血甫止之際欬嗽未作急止之若得熟睡一夜則生沛然莫之能禦即所失成升成斗週時補之而有餘矣若睡未足而驚醒之則血亦停而不生矣若血止一二三日而始服之不徒無益而有害周氏舊註亦超但以人參為補氣之品未免囿於俗見然人參補陰與地黃龜板之一於補陰者不同按其字義參者參也其功與天地人並立為參且能入肺肺為一身之靈禽謂益氣却亦近道程山齡謂參者以歸脾湯代之然不如取當歸補血湯二劑入童便二茶碗隔湯炖二炷香取汁頓服之

丁字保和湯 父嗽肺痿成痿

知母

貝母

天門冬

款冬花各三錢

天花粉

薏苡仁

杏仁

五味子各二錢

甘草

兜鈴

紫苑

百合

桔梗

阿膠

當歸

地黃

紫蘇

薄荷

百部各一錢

右以水二盞生薑三片煎一盞入

飴糖一匙調服

日三食後各進一鍾與保真湯相間服

血盛加炒蒲黃根葛節大薑小薑茅花當歸

痰盛加桑白皮陳皮蘿蔔子葶苈子蘇子

熱甚加山梔子黃連黃芩黃柏

連翹大黃款冬花

風甚加荆芥防風菊花細辛香附子旋覆花

寒甚加人參桂枝蠟片芍藥

知貝款天冬各三二錢杏意味天花五分二百阿歸地紫苑兜蘇薄桔甘

加減歌

歸茅大小薊蒲黃葛節茜根血盛當瘻盛南星陳半入茯苓枳實殼須將喘加桑白陳皮等蘿蔔草蘇三子詳熱甚

芩連梔柏款連翹合併大黃杏風加香附荆防細旋覆菊花六件良寒盛加參薰桂芍加蠟片不須言 陳修園

按此方治久嗽不過類集順氣化痰清火解鬱之品以多為貴絕無把柄抑又思之先生有道之士也其方又得之神人何以庸陋至此且蘇葉桔梗薄荷辛散非久嗽所宜百部款冬苦溫非血後所宜兜鈴花粉杏仁亦為中

虛所忌知母貝母天門冬地黃阿膠百合性寒而滯力亦輕微其去市肆中之間証立方搖鈴輩之儂統配合以零賣者幾希耶然此方不見於大家之書如明季襲太醫名刻及萬病回春壽世葆元等本亦載之但方名間有不同藥品偶有增減村醫用之往往見效余向以病人壽算未終總不歸功於此方亦隨見而隨忘之耳今得此書始知禮失而求諸野沾體塗足中大有人焉轉悔從前之肉眼也究竟於此方未得其旨大抵奇之弗去而耦之一方不去而複之如韓信將兵多多益善且其輕重大有法度加生薑之辛溫以潤肺飴糖之甘培土以生金卓然大家可知仙方非凡人所可窺測也但喘盛加蘿蔔子與地黃相反臨時自當去取

戊字保真湯 治虛弱骨蒸體虛

當歸 生地黃 白朮 黃耆 人參各三 赤茯苓 陳皮 赤芍藥 甘草

白茯苓

厚朴各一錢五分 天冬

麥冬

白芍藥

知母

黃柏

五味子

柴胡

地骨皮

熟地黃各一錢五分

每服水二盞

薑三片

棗子五枚

煎

與保和湯同服

每日一服

驚悸加

茯苓

遠志

子仁酸棗仁

淋濁加草薢烏藥豬苓澤瀉

便澀加石葦扁蓄木通赤苓

遺精加龍骨牡蠣

蓮心蓮鬚

燥熱加石膏滑石鱗甲青蒿

盜汗加浮小麥牡蠣黃耆麻黃根

參耆歸地木三錢赤白茯苓朴草兼赤芍陳皮錢半等味柴白芍二錢編骨皮熟地和知柏各一錢加薑裏煎

加減歌

骨蒸又見悸和驚棗達茯神柏子仁淋濁草薢烏藥澤入遺精龍牡蓮鬚心小便澀要和石葦扁蓄木通共赤苓燥加青蒿石滑鱗麻根盜汗蠅浮者

舊註一名保和者因失血之後氣血未調率難把握然調血者以氣為王調氣者實肺為司故大旨以潤肺中之伏熱益下焦之化源此其治也若和而失其所以為和則保亦失其所以為保矣至保真則氣血之味俱等大旨以甘溫為主甘涼佐之而苦寒又佐之未嘗禁用苦寒也而與今日之用寒涼者異矣曰保真者大補其正兼潤其邪使生機活潑油油然而不已也兩方加法大備然非盡用亦姑列之以俟去取耳學者須知 陳修園按此方即十全大補湯去川芎肉桂加赤芍赤芍生地天冬麥冬五味子柴胡厚朴陳皮地骨皮知母黃柏是也氣血

雙補之中加柴胡地骨以疏肝邪肝火即雷火也知母黃柏以降腎火腎火即龍火也又合麥冬五味子為生脈散俾水天一氣又合天門冬為三才湯以位育一身最妙是陳皮厚朴甘草入胃寬中行滯導諸藥各盡其運動之力而協和共濟且藥品輕重得宜大有法度但芍藥以花之赤白別之其根則不可辨也藥肆中另有一草葉小根大與芍藥無異余家山中親見採藥人握取盈囊間之則曰藥鋪所備亦苟皆此種也始信本草崇原註云赤苟不知何草之根今外科小兒科習用害人之說非虛語也方中當去之

二字太平丸 治久嗽肺痿肺癰

天門冬 麥門冬 知母 貝母 款冬花各二
當歸 熟地

生地 黃連 阿膠珠各一兩
蒲黃 京墨 桔梗

白蜜四 麝香少許
右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬

三二沸丸如彈子大每日三食後細嚼一丸薄荷煎湯緩緩化下臨卧時如痰盛先用飴糖拌消化丸吞下却噙
嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除服七日病痊凡效嗽只服此藥立愈

二兩三冬二母如歸連二地杏阿珠各需兩五錢皆兩京墨蒲黃薄桔俱

舊註太平丸非正方也先生意計周密忍人正氣漸復之後尚留一分未盡必有一分未妥特於晏息之時噙服
此丸使人於靜中不知其所以然而藥力無不到此少許麝香之所以為神妙也 陳修園按方中潤燥化痰養
液少佐薄荷以利氣無甚深義惟難以黃連之苦寒麝香之走竅不幾令人駭而吐舌乎而不知令人駭處正是
神仙妙用處神農本草經云黃連氣味苦寒苦為火之本味以其味之苦而補之而寒能勝火即以其氣之寒而
潤之一物而兼補心潤心之妙故凡久嗽肺痿肺癰得此則火不赴金而金自受益矣本草經又云麝香主辟惡
一在喉肺竅宜開不宜閉喉竅宜閉不宜開今鼻竅不通則喉竅將啟而為患必後麝香之香氣最盛直通於鼻
竅而開之則呼吸順而欬嗽之病除也舊註未闡出所以然之妙今特補之

庚字沉香消化丸 治熱嗽壅盛

青礞石

明礬細研
五錢

猪牙皂角

生南星

生半夏

白茯苓

陳皮各二錢

枳殼

枳實各一兩

黃芩

薄荷各一兩

沉香

五錢

右為細末和勻薑汁浸神曲為丸梧桐

子大每服一百丸每夜臨卧飴糖拌吞嚥噙太平丸二藥相攻痰嗽除根

南星皂半後芩陳礞石明礬二兩均枳實殼皆需兩五薄芩一兩五錢沉

舊註人見此數味或畏其狠即予亦嫌其峻然先生註云熱痰壅盛乃以此治其不致壅盛者稍稍減服四五十

九可也况前先服獨參繼用保真則神氣亦漸復矣暫用幾服胡為不可若情形消瘦者未可用也是又在學者

臨證自明耳 陳修園按此方即滾痰丸去大黃加明礬皂角南星半夏茯苓陳皮枳殼枳實薄荷葉是也一方面

略同而功用則有南轍北轍之判彼以大黃領各種化痰藥從大腸一滾而下而知不得痰之所在徒下其冀

則反傷胃氣也蓋痰者水也水者氣也水性下行得火則上沸而為痰方中所以取用黃芩以清火水非氣不行

氣滯則水亦滯遂停瘀不行而為痰方中所以取用沉香陳皮枳殼枳實等藥重重疊疊以順氣化氣行氣且水

汜濫則患大由於地中行則天下安方中取半夏南星之辛溫茯苓之淡滲以燥治濕即以上制水之義語云見

痰休治痰是也方中惟礞石化痰為水質重而力大薄荷利氣化痰體輕而行速二味為治標之藥亦輕重各得

其宜最妙若明礬皂角二味凡水渾濁入明礬攬之則濁者立刻轉清矣衣服污穢則皂角洗之則污者隨滌而

淨矣古人制方之周到如此或疑虛勞之証不能當此峻烈然病重藥輕多致誤人喻嘉言譏為養殺不如毒一

生路而為破釜沉舟之計倘有餘望每見痰嗽不絕肌骨消瘦聲啞骨蒸五更更熱而汗出早飯後皮膚雖熱而

脊背畏寒手指微冷此虧損既成十不救一之証醫者議論互異而一種迂儒謂肺虛液少但云保肺猶其淺也

必以六君子湯歸脾湯補中益氣湯之類常服土旺自可生金母區區於保肺因前病金受火耗但知清心治其

末也必以六味地黃湯瓊玉膏三才湯都氣丸八仙長壽丸之類常服脾水足自能濟火母汲汲以清心此為東

門元陰之水中生艮土而上通心火陰陽互根而不相離六味湯丸左歸飲九

八味湯丸右歸飲丸皆為極品自此說一行而虛勞之証十患九死曷不思脾為諸臟之母當無病時常服補藥尚難進其飲食長其肌肉至虛損病篤之時將何法補其不足且能令其有餘以生金耶腎為壽命之根當無病之時服補藥尚難充其精氣強其腰膝至虛損病篤之時又何法補其不足且能令其有餘以濟火邪鄉愿德之賊吾謂庸醫之陰毒更甚妄醫之陽毒也近日更有襲取葉天士一派遇有感冒即用前胡乾葛杏仁桑葉桔梗紫蘇防風茯苓橘紅蘇法夏神曲穀芽麥芽山楂炭甘草為王方頭痛加川芎白芷身痛加羌活秦艽效嗽加紫苑百部口渴加麥冬花粉小便短少加滑石木通澤瀉猪苓腹脹加厚朴枳實蘿蔔子砂仁殼皮膚作痒加蟬退白蒺藜連翹喉痛加元參射干牛蒡子貝母寒熱往來加柴胡酒芩腰膝痛加牛膝杜仲脚腫加木瓜防己病從怫鬱則加黑鬱金香附發熱不退加白薇地骨青萬白芍數日未愈曰當略調其氣血加當歸酒芍何首烏乾地黃丹參沙參等出入互用至於久病虛人則以遼東海參燕窩鮑魚穀芽首烏炙草等為主其參术者芩二地桂附吳萸炮薑等隨証加入而金銀花炭枸杞炭菊花炭白朮炭地黃炭鮮桑枝金銀花藤泡淡乾薑生薑渣泡淡附子泡淡吳茱萸秋稻根鬚鱉血柴胡五色石英冬瓜子整丁生扁豆黑櫻豆皮綠豆皮西瓜翠皮之類曰我是葉天士一派與恒法不同而不知葉天士居江蘇該處人腠理較薄外邪易入而亦易出不用仲景正法故於傷寒論一部未得師授議論甚覺隔靴其於雜証胸中頗有書卷加以絕世聰明臨症甚多所以名謠一時而虛勞一証專祖十藥神書不必全用其方神而明之信手拈來頭頭是道何若輩僅於臨証指南中食其糟粕而譏託之也耶

辛字潤肺膏 矢嗽肺燥肺痿

羊肺一具

杏仁淨研

柿霜

真酥

真粉略一

白蜜二兩

右先將羊肺洗淨

次將五味入水攪黏灌入肺中白水煮熟如常服食前七藥相間服之亦佳

真粉真酥並柿霜杏仁淨研兩平當蜜加二兩調黏用灌入肺中水煮嘗

舊註血去則燥燥則火旺肺必枯欲從腎源滋水而不先滋水之母有是理乎然肺為多氣少血之藏故一切血藥概不欲用以羊肺為王諸味之潤者佐之人所易能也若以真粉之甘寒不獨涼金且以培土人所未知也

陳修園按方中真粉即傷寒論猪膚湯之白粉也本文未明為何粉一說即天花粉王滋潤肺金取金水相生之義一說即粳米粉以少陰之水火交會於陽明中土粳米補陽明中土交水火而止煩躁而且藉土氣以生金二說俱有深義余每用則從後說今讀先生此方又閱周氏所註真白粉即天花粉無疑嘉慶丁巳歲余應興泉觀察阿公泉州郡伯張公聘主清源書院講席日者用天花粉一味藥鋪送白粉一包其色瑩晶潔白迥出諸藥之上余傳問之答曰此物最賤而製造却難惟冬月葉落其氣盡歸於根掘取以法取汁和水淘洗澄之晒乾收貯纔有如此寶色若無此色恐偽物弗效不如止用天花粉片之較妥也今先生加一真字何等鄭重其辭推而論之金匱於蟲病製有甘草粉蜜湯以殺蟲若虛勞久嗽為療蟲蝕肺鉛粉性毒能殺三蟲今雜於蜂蠍柿霜羊肺之中誘蟲食之旋而甘味盡毒性發而蟲患除矣此非正解亦可備之以啟悟機

壬字白鳳膏

一切久怯極虛憊咳嗽吐痰咯血發熱

黑嘴白鴨一大京棗半參芩平胃散升陳者酒一瓶右將鴨縛定腳量患人飲酒多少隨量以酒浸溫將鴨頸割開滴血入酒攪勻飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾去其毛於脇邊開一孔取去腸雜拭乾次將棗子去核每個中實納參芩平胃丸末填滿鴨肚中用麻紮定以砂瓶一個置鴨在內四圍用火慢煨將陳酒者作三次添入煮乾為度然後食棗子陰乾隨意用參湯化下後服補體丹則補體生精和血順氣

參芩平胃散一升京棗二升酒一瓶黑嘴白毛肥鴨一隻照方如法製來斟

陳修園按怯而日久虛極而憊而且咳嗽不已則肺日因嗽而動擾矣吐痰不已則肺因痰而壅滯矣咯血發熱壯火食氣不特肌肉消瘦而且氣衰言微矣此為極證恩非無情之草木所能治故用黑嘴白鴨一隻為君蓋以毛白者味較清而入肺嘴黑者骨亦黑而入腎取金水相生之義亦資異類有情之物以補之也最妙入京棗二升取其甘溫以補胃平胃散一升取其消導以轉胃胃為五藏六府之本胃安則藏府俱安與保真湯佐以厚朴同義葉天士於此書亦參透其旨但其方隨證加入以致學徒刊刻彙案用厚朴者於虛勞門止收一方意者中人以下不可以語上重其道而不輕傳歟修園則異於是

猪脊背一條 羊脊背一條 團魚一枚 鳥雞一隻 四味製淨去骨存肉用酒一大碗於砂瓶內煮熟細
擂細再用後藥

大山藥五條

蓮肉十斤

京棗一百

霜柿十個

四味修製淨用井花水一大瓶於沙瓮內煮熟細

擂與前熟肉一處用慢火熬之却下

明膠四兩

黃蠟三兩

右二味逐漸下與前八味和一處研成膏子和平胃散末四君子湯末并知母黃柏末各一兩共一十兩搜和成劑如十分堅硬入白蜜同熬取起放青石上用水搗打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候東陽下

諸羊脊督雞圓魚煮擂宜當去骨需霜柿十枚京棗百建蓮八兩五條薯熟和前味熬文火黃蠟明膠漸入諸知柏四君平胃末各加一兩製丸如

陳修園按久癆虛憊髓乾精竭等証服煎藥愈後服此藥二十字是為虛癆既愈延壽一善後之計實為虛癆窮極証覓一回春之路也虛癆至六極之候凡和解溫涼補潤之藥無不歷試初服間或少效久之無不增劇名醫俱束手無策然藥以治病食以養人二語參透大有妙義蓋得病日久日在藥中禾黍之腸改死雜草腸胃之所惡者藥也若更以藥投之是重因之而不能堪矣先生用山藥蓮肉京棗霜柿取日食之果菜以悅脾胃之性情用猪髓羊髓圓魚烏雞牛膠日用之肉食以充脾胃之虛餒即偏鵠所謂損其脾者調其飲食內經所謂精不足者補之以味是也惟方中黃蠟一味俗醫見之無不驚駭本草備要謂服此物著於陽胃令人濕痢不止而不知此物性澀豈能作潤威喜丸用此鎔化為丸王晉三註云黃蠟性味緩滯續絕補髓之功專調斬喪之陽分理滑亂之精故為元陽虛憊遺濁帶下之神品俗傳本草之害人往往如此况此丹儘屬骨肉有情之品溫養吾身之氣血與無情之草木懸殊葉天士用人乳粉秋石霜血餘灰之類引人身之膏脂以為繼續之計亦由此方悟出若紫河車污穢有毒服之無不發熱減食豈非惑於以人補人之說忍心害理適以自戕也耶又按明膠是取嫩肥黃牛皮以河水製造為之或用牛肉煎汁去滓再熬成膏每斤入薑製牛夏朮二兩名為霞天膏治勞傷久嗽乾隆丁未余肄業鼇峰書院孟瓶菴師言其督學四川時患嗽數月同審製餽因素不食牛拜受而不敢嘗署中

閱卷張友患瘧証二十餘載喜而嘗之膠瘦成塊吐出甚多半月全愈身體立見壯健附志之以廣其傳 舊註人若色慾過度傷損精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午夜發熱哈哈放噏倦怠無力飲食少進甚則痰涎泄血咯吐出血或效血吐血衄血身熱脈沉數肌肉消瘦此名瘧瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人惜命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根此謂內外交治可獲全功 周氏總註予讀此十方俱出人意表其間次第緩急可為千百世法即不必十方並用要無能出其範圍者矣一方之中自得肯綮即不必全用其藥亦可細推其理矣乃今日之治血証者輒用一味地黃增減冀其收功皆由醫貫入手而未嘗從神書體會者也彼之腎水衰則火炎為患壯水之主可鎮陽光孰知人之患此病者陰虛固多而他因者亦復不少假如從勞役饑飽而得者其傷在足太陰矣從憂患而得者其傷在手少陰矣從嗜飲而得者其傷在手太陰矣從憤怒而得者其傷又在足厥陰矣此足致吐血效血咯血等証豈一壯水可以勝其任乎總之人身之血附氣而行者也一藏傷則氣必不調而血遂溢於外故逆則上出墮則下行滯則阻痛寒則凝熱則散此自然之勢也後之君子於診視之際聞問之餘斟酌而得其情否乎果能於此著眼視其病之所傷在何藏脈之所傷在何部時之所值在何季思過半矣曹治一咯血之人平日極勞每咯紫黑色俱成小塊者然必是飽食則多少食則少不食或少或無余以薤汁童便製大黃治之二服而安後以補中益氣湯加血藥而愈知者以為怪妄子謂極平常蓋實從神書究心而置醫貫為談料者也

附平胃散方

厚朴蠻汁

陳皮去白各五兩

蒼朮去皮米泔浸炒八兩

炙甘草三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參芩平胃

散

四君子湯

白术

茯苓三兩

炙甘草一兩

急救經驗良方目錄

烏鵲痧

白眼痧

蛇 痘

啞叭痧

蝦蟆痧

鳳凰痧

珍珠痧

羔羊痧

魚 痘

血流不止痧

鹿 痘

象 痘

獅子痧

蜈蚣痧

蜜蜂痧

母豬痧

兔子痧

老鼠痧

鵝子痧

羝羊痧

猩 痘

醋豬痧

犛牛痧

猿猴痧

狐狸痧

蜻蜓痧

血腥痧

老鶴痧

纏絲痧

鵝 痘

鷹 痘

螳螂痧

蚊蟲痧

蠻蛇痧

鳩子痧

雞子痧

喜鵲痧

鵝鴨痧

野雀痧

鵝鴨痧

黃鷹痧

海青痧

鷹嘴痧

鵠子痧

蝎虎痧

蚰子痧

秋蟬痧

蚯蚓痧

鱸魚痧

腳魚痧

螞蟻痧

鵝鴨痧

斧牛痧

雷公救度丹

羊毛痧

擦雞蛋清方

雷擊散

霍 亂

火 疗 證

發斑證

發狂發渴

以上各時疫證治

唇腫舌腫口爛各証

切實火喉病不論何名

白喉證

喉中生泡生珠

喉痛破爛日久不愈

時疫結喉白繩序論

一切虛火喉病不論何名

養陰清肺湯

地黃散

紫正散

吹喉藥方

辛烏散 一名角藥散

捷妙丹 治雙單城

嚴氏赤瘞散

雄黃解毒丸

火刺仙丹

絳雪丹治喉腫喉癬口舌生瘡

金鎖匙

真功丹

孚佑帝君救喉痛方

黃瓜霜

以上喉科急證

神妙經驗痧藥良方

普濟散急痧方

展子明傳接骨方

神驗刀瘡藥方

治痔瘡毒方

治鼠瘡方

治猪羊癩癰方

千搥膏

解吞鴉片生煙毒方

亂瘡膏藥方

治痔瘡毒方

喙喘奇方

仙傳百草霜丸治諸血證方

腹瀉初起

腹瀉痢疾方

瘧疾熨藥方

萬應琥珀膏

化鬱膏

治癬方

牙疳覓棗散

擦牙散

倪涵初先生治瘻三方

久瘻全消方

一切腫毒及大小外證方

老人飲食噎塞不通方

應驗如意散

傷寒初起病由

藿香正氣散

九味羌活湯

敗毒散

達原飲

白虎湯

小承氣湯

三消散

大承氣湯

調胃承氣湯

中暑中風中熱癲病治法

香薷飲方

薰冷益元湯

六一散方

療牙止痛散

治耳內出膿血水腫痛方

膿瘡方

治喉牙紫砂散

純陽青娥丹

治牙閑神驗方

回天再造丸方

記再造丸真方

急痧應靈散

乾隆年間黔中人多感異證病發輒立死方書不載治法有人於丹平山得神授奇方分四十九痧全活甚眾後此方傳至關中以治諸怪異急證無不奇驗道光壬午粵東奇証多有相似者偶得此方試之立效當經刊布今歲夏秋之間浙中時疫俗名吊腳痧亦頗類此爰急重梓以廣流傳至原抄本內字畫容有一二訛脫之處無從攷證姑仍其舊以俟知者咸豐辛亥仲秋上浣覺因道人識

烏鵲痧狗痧二證同治其證頭疼頭沉頭麻眼黑惡心發搐指甲青後遍身青上吐下瀉不能言語小腹疼痛不急治則死牙關不閉則已若閉急用箸撬令病者捲舌視之舌根下或有紅黃紫黑等泡急用針刺破出血雄黃點之即愈如不愈再以松皮猪牙皂石竹花子煎湯服之蓋被出汗忌風忌米湯三日

白眼痧其形長翻白眼治法將頂門上灸三艾如不愈再灸三艾即愈

蛇痧其形亂滾肚脹痛治法先挑肚臍三針次挑頂門一針左右脚心各一針用烟油拭之即愈

啞叭痧得病著地不能言語用鞋底蘸涼水輕打頂門女人分髮用手蘸涼水拍之即愈

蠍蟆痧其証肚脹治法肚臍圓圈挑七針小肚挑三針即好

鳳凰痧其形股肱搖擺急用鞋底打腳與腰再以雄黃水飲之

珍珠痧其病身上起泡似珍珠形用針刺破出血即愈

羔羊痧得病如羊聲滿口吐沫用雄黃白礬蟬退合薑汁涼水飲下即愈

魚痧其證惡心多飲水肚中疼脹用魚骨燒灰存性黃酒調服出汗即愈

血流不止痧得病血流不止治法用指甲頭髮錢三纏住煅黃為末黃酒送下不論何處流血即此證

鹿痧其證口吐血渾身上發紫斑似梅花形用針刺破次用鹿角膠合黃酒送下

象痧得病流鼻心痛昏迷針挑兩肩膀尖出血雄黃點之即愈

獅子痧其証心荒頭疼渾身起大泡用針刺破雄黃點之再用鹽醋水飲之

蜈蚣痧得病頭出冷汗擁心吐黃水細看脊骨兩膀有紫筋用針刺雄黃點之

蜜蜂癰其証哭聲不斷惡心上吐下瀉舌下有紫疔針刺破用鹽點之即愈

母猪癰其形拱地先針刺舌根又兩手除大指將指甲邊肉上各刺一針後用猪食盆內剩泔水灌一大碗即愈

兔子癰其形走荒野脚走不停即用炮藥捲舌擦止許走著治勿令坐卧或用濕土

如帽戴頭上使聞土氣即愈

老鶴癰其形黑唇紫腫疼咽喉痛或胸膈膨脹

髮鬚角眉心

各口挑一針見血即愈

鵝子癰其形胸背腫痛小腹飽脹口渴身熱見食即嘔心中頓跳挑兩大脣脹揭見血一針即愈

羝羊癰其形脹滿似困似睡眼閉身轉呼哈俱疼痛尾巴骨上挑二針見血即愈

狐狸癰其形頭疼乾嘔不思飲食頭仰渾身出汗張口胡言針挑

咽喉前後心窩見血即愈

醋豬癰其證心熱四肢厥冷渾身打戰心疼舌下有紫疔刺破小鹽點之

莽牛癰其證肚腹脹心疼將唇掀起挑沿唇上牙牀及唇面見血即愈

猿猴癰其證坐卧不安心腹脹滿口舌指甲色青小腹疼用針挑陰囊即愈

經終痧其證肚腹脹頭疼心煩前後心或有紫黑黃點子用針挑破以醋擦之即愈如覺遍體麻木無此點子者即

心炒子證將胎脾灣腿灣青筋針出紫血用炒鹽煎湯服之即愈

蜻蜓痧其形渾身打戰兩手張翼用掃箒著面頂一拍即愈

血腥痧其證食時即間血腥氣看舌下有紫泡夾指窩亦有紫泡刺破雄黃點之

老鶴痧其證惡心舌根强硬嘔吐不止舌下有紫疔刺破火藥點之

猫痧其證鼻舌兩手扣地擁心用針挑兩齶角出血以雄黃酒飲之

鷄痧其證長身伸脖用鵝毛三根燒灰水飲之

鷹痧其形蹶嘴心疼昏迷用針刺臂脾灣出血雄黃點之

螳螂痧其證頭斜心疼昏迷臂脾灣挑破用老鶴嘴裸燒灰點之

蚊蟲痧其證吐痰昏迷用燒酒拍心口至紅住手