

婦人科 產後 雜治 難產 胞衣不下 臨產急救

增輯

足本大字驗方新編

上海啟新書局

印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

目部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃 嘔
吐附

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

麻症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

卷十二

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十三

誤吞諸物

烟酒醉傷

急救
凡吊頭割喉腹破腸出溺水凍死雷擊疾厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

卷十四

人畜蛇蟲咬傷 湯火傷 跌打損傷 刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十五

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黄疸

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷九目錄

婦人科調經門

不及期而經先行 經過期後行

一月而經再行

數月而經一行 經行或前或後

經行或多或少

逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點一月常三四次面色青黃
經行不止來往無時

經來不止形如魚腦足痛不能動履

經來不止形如牛膜昏迷倒地

經來不止或下血胞大如鷄蛋割開內如石榴子昏迷不知人事

經來有白蟲如鷄腸滿腹疼痛

經來成塊如葱白又如死豬血黑色頭昏目暗唇麻

經來結成一塊如皂角一条痛不可忍不思飲食

腹大如鼓經如蝦蟆子

經來如禽獸形

經來過期形如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白帶喉中臭如魚腥惡
心吐逆

經來紫色

經來淡色

經如綠水

經如黃水

經來腸內一塊作痛其色深黃

經來全白色五心煩熱小便作痛

經來疼痛小便如刀割

經來狂言如見鬼神

經來常嘔吐不思飲食

經來食物即吐

經來咳嗽

經來腹痛

經後腹痛

經來潮熱不思飲食

經少腹大如漏胎狀

經閉不通

通治經閉

經閉腹大如孕

室女經閉遍身浮腫

室女因開齋為熱氣所衝面目腫大經水不通

婦女疳疾經水不調面色黃瘦咳嗽發燒或吐血或不吐血不思飲食精神疲倦

經逆上行從口鼻出

經水從口鼻出咳嗽氣喘

經來房事相撞

血崩不止

老婦血崩

崩中漏下五色

崩久成漏連年不休

白帶白濁白澑

赤白帶下

赤白帶下臍腹疼痛

五色帶下

婦人科種子門

種子芻言

保命延生種子戒期

求嗣得孕法

種子諸方

子宮寒冷不能受孕

婦人科胎前門

保產諸方

孕婦惡食嘔吐

孕婦吞酸

孕婦頭痛

孕婦目鼻咽喉口齒唇舌諸病

孕婦口渴

孕婦咳嗽

孕婦心痛不可忍

孕婦心忡

胎上衝心

孕婦心痛

孕婦腹癢

孕婦腰痛

孕婦小便不通

孕婦大便虛急不出

孕婦泄瀉

孕婦痢疾

孕婦瘧疾

孕婦霍亂

孕婦中暑

孕婦中濕

孕婦中風

孕婦癱瘓

孕婦遍身搔癩

子懸

子煩

子瘤

子滿

子淋

孕婦無故心虛驚恐悲泣狀如遇邪

孕婦至七八九個月內忽然聲啞不語

孕婦忽然倒地 胎動不安

撲跌胎動腹痛下血

胎動下血不止

孕婦漏胎

小便多而動紅勢欲小產

誤服藥胎欲墜

臨產須知

催生諸方

臨產胡言亂語

臨產暈絕不省人事

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不開

難產

救逆產

救橫產

救側產

救碍產

一切橫生逆產

盤腸生

臨產兒尚未見有物先出形如胎衣

胎衣不下

子死腹中

婦人科產後門

產子氣絕不啼

產後宜擠兩乳

產後乳汁不通

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹

產後子腸掉出一截

產後腸出不收

產後子宮脫出

產後尿胞脫出

產後尿胞損破小便直流

產後胎膜脫出

產後陰蟲一對

產後陰戶翻出疼痛

產後陰戶腫痛或手足灣屈不能伸轉

產後陰戶不閉或脫出

產後惡露不下

產後血崩

產後一月惡露重來血水不止倒地不省人事

產後瘕塊

產後發狂

產後眼見黑花昏眩

產後血暈

產後中風

產後中風聲啞不語心口發紅如鏡

產後肝虛風從內生

產後不語

產後風癱

產後鼻血不止

產後口渴

產後口渴痞悶

產後舌出

產後腹脹滿悶嘔吐惡心

產後嘔水

產後呃逆

產後咳嗽

產後氣喘

產後面赤發喘欲死

產後心痛

產後腹痛

產後腹中有塊上下時動痛不可忍

產後血氣痛不可忍

產後腸痛

產後頭痛

產後汗出不止兼變症

產後發熱

產後乍寒乍熱似瘧

產後傷寒

產後腰痛

產後遍身疼痛

產後身有冷處數塊日久不愈

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉

產後上吐下痢

產後大便不通

產後小便多及夜睡遺尿在床

產後小便不通或短少

產後熱淋澁痛

產後尿血

產後癰疽

回生丹論

婦人科雜治

血風頭痛

烏髮長髮

乳癰乳巖

婦女性妬

陰外生瘡

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似瘧病

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似瘧病

陰戶突出一物如蛇如菌或如鷄冠

陰戶生物如茄

陰戶生核腫大不消

吊陰痛不可忍

陰戶翻出仰卧不能轉動

陰戶吹響

陰戶寒冷

陰戶疼痛

裏小腳法

腳生鷄眼

臨產急救補遺

正產腸下

產後肉線出

產後肝癥

子死產門

子死腹中

胞衣不下

正產氣虛血暈

正產血暈不語

正產敗血攻心暈狂

產後四肢浮腫

久慣小產

胞衣不下 此因產母力乏氣不轉運或因血少乾澀或因子宮空虛而不下

者急用

芡實葉

又名鷄頭蓮葉

一張扯作二三塊煎之服

胎衣即破作二三塊而

下又蓮蓬壳一個扯作二三塊煎水服或用荷葉扯碎

亦相同

神效無比

此數物須平時收存以備急用○又方

明礬三分

開水冲服立下○又方

用竹桿於堂中正樑上截三下即下○又方

用雄鷄一隻連毛破開去腸

雜蓋孕婦臍上鷄頭向上以布紮縛即下神效○又方

生鷄蛋兩個去黃

用白好陳醋燒開沖服即下○又方

草麻子

十四粒去壳

搗爛敷兩足心胎衣

即下衣下後趕急將藥洗去久則恐腸出也如腸已出仍用此藥敷顙門上

腸自收入藥隨洗去勿遲

子死腹中 產母唇舌俱紅者母子無事唇青舌紅者母死子活唇紅舌青者

母活子死唇舌俱青者母子俱死用平胃散最為神效

平胃散

專治胎

死腹中 蒼朮

淘米水泡炒

紫川厚朴

蜜炙各五錢炒

陳皮

各二錢

炙草

五分

酒水各一鍾煎至

一半加朴硝末

五錢

再煎三五滾去渣溫服其胎即化為水而出矣若倉卒製

藥不及只用朴硝五錢以溫童便調下亦效如胎未死產婦舌不青黑不可亂用凡貓犬生子不下而叫號者亦以此藥灌之 又方 用醋炒黃牛糞

穀肚腹上用布捆好即下神效

婦人科產後門

胎衣不下見胎前門無病用童便好酒煮熱服之百病不作

產子氣絕不啼 胎衣來時切勿斷臍即取小鍋燒水以胎衣放熱水中並以水澆臍帶俟暖氣入腹兒氣即回啼聲發出矣若先斷臍帶不可救矣並參看小兒科保嬰各法

產後宜擠兩乳 凡婦人初產即將兩乳放溫熱淘米水內揉洗良久將乳擠出乳孔內有白絲數條用手扯去方與兒食則小兒易於吸食可免吹乳乳癩等病此秘方也

產後乳汁不通 或初產之婦則乳方長乳脈未行或產多之婦則氣血虛弱乳汁短少並用加味四物湯 歸身 當參 川芎 赤芍 生地 桔梗甘草 麥冬 白芷錢各一水煎服如因乳不行身體壯熱胸膈脹悶頭目昏眩者加木通滑石末煎水食後服更煮豬蹄湯食之則乳汁自通豬蹄一對洗淨煮爛入葱調和並汁食之又云要入香油炒過穿山甲共煮去甲食之神效或查卷二乳部通乳各方治之

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹 老薑三觔連皮搗爛入真麻

油二觔炒乾先用舊紬五尺摺疊輕輕盛起肉線使之屈作三二圍納入陰戶再用紬衣盛薑使薑氣就近薰之冷則隨換薰一日夜收入大半二日收盡神效非常肉線切不可斷斷則不治並宜禁風

產後子腸掉出一截 凡婦人產後胞衣已下有腸出一截俗名外衣或腸上胎衣脱落未盡不必驚慌不必服藥用枳壳煎湯洗之切宜避風若怕風寒不洗亦可三五日後自然爛落近日有人經驗甚多並不碍事亦無後患若腸出多者則照後方治之

產後腸出不收 真麻油三觔煉熟入盆內候溫令產婦坐盆中另用皂角尖燒枯去皮研細末吹鼻中作嚏即收○又方 枳壳煎湯溫浸良久自入冷則隨換或照肉線方前治之或照後子宮墜出方亦可○又方 新鮮鯽魚頭焙枯研細末一半搽腸一半酒服即時收上

產後子宮脫出 產後下一物如合鉢狀有兩塊者子宮也名陰癩又名癩葫蘆用補中益氣湯見卷十一內外備用諸方去柴胡連服二三大劑一響而收並用荆芥穗 蕙香葉 吳椿樹白皮災各六七錢煎湯時時洗之再用熟地

歸身錢各二半 川芎 白芍各錢半 台黨三錢水煎服數劑可免後患或照上腸出不

收鯽魚方最效

產後尿胞_音脫出 棕樹根和豬瘦肉久煮去根食肉與湯三五次自然收入其效如神

產後胎膜墜出

後補傳青主產後肝癥一方最效

產後出一物如手帕因臨產用力太過或肝

痙所致有粘席不得上者乃胎膜也照上子宮脫出方治之即入

產後尿胞_音破損小便直流

黃絲絹

天生黃者三尺用炭灰淋汁煮爛以清水漂極淨剪極細碎

黃蠟_{錢五}

白蜜_{一錢}

白茅根 馬尾勃

各二錢

水二盞煎一盞

空心服服時須歛氣不得開口作聲如作聲則不效○又方

得開口作聲如作聲則不效○又方

生成黃色絲絹

一尺照前治法

白牡丹根木

研末一錢

白芨_{研末一錢}

水二鍾煮至絹爛加糖食之不宜作聲此名補脬散觀其補

法有不可思議之妙生絲造者白絹色黃者入血丹皮連木者入裡色白者

走氣二者皆能瀉膀胱之火引清氣以達外竅白芨性黏功專收滯補能五

臟之破損服之不作聲乃有效者蓋聲出於五臟有聲則五臟之氣動而來

迎無聲則五臟之氣靜而安謐所服之藥不由五臟分布入肺竟從胃口

闢門分別清濁之處由脂膜之絡滲入膀胱之外膜使白芨護外而為固也

本草載台州大辟剖出肺傷之處皆白芨所補信有是夫○又方

雲苓陳皮

桃仁
錢各一

台黨半錢

災芪半錢

災草五分

用猪尿脬

羊尿脬亦可

洗淨煮湯去脬入藥

煎好空心服亦不作聲多服乃效血虛者加

川芎當歸○又方

大鯉魚一條取魚鱗用油煎極酥脆音

翠加鹽醋薑汁拌鱗蒸食亦效

產後癥瘕突出

先用連翹散後用黃蠟膏立效

連翹散

災芪

連翹

花粉防風梔子

錢各一

甘草三分

水煎服

黃蠟膏

黃蠟

枯礬

麻黃

以上各肆分為末用開水沖服或用前子宮脫出諸方亦妙

產後陰戶生蟲一對

此蟲約長寸餘埋入土中數日間視暴大如拳名子母

蟲以後月生一對

苦參一兩淘米水浸

使君子一粒蒸熟晒乾

共研末

煉蜜為丸每空

心服三錢服完再生一對再服一料即可斷根

產後陰戶翻出疼痛名曰翻花用澤蘭葉四分

煎湯薰洗二三次再加枯礬

煎洗即安○又方見後雜治門○又方

如泥敷之效

產後陰戶不閉或脫出石灰一斗炒黃色以水二斗加入攪勻澄清乘熱薰

之○又方溫水洗軟用雄鼠屎

頭尖燒烟薰之即愈

如陰戶破爛久

不收口白芨白龍骨荳子

燭蜂窠黃柏

炒各研末先用野紫蘇

煎水洗拭乾再用此藥敷之或銀青散

見癰毒散

諸方門敷之均效