

審視瑤函

三

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之三自錄

淫熱皮剋之病

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

黃連爐甘石散

龍腦黃連膏

啗鼻碧雲散

蕤仁春雪膏

風熱不制之病

羌活勝風湯

杏仁龍膽藪散

七情五賊勞役饑飽之病

柴胡復生湯

黃連羊肝丸

當歸養榮湯

助陽活血湯

決明益陰丸

加減地黃丸

血爲邪盛凝而不行之病

川芎行經散

消癰大丸子

氣爲怒傷散而不聚之病

千金磁硃丸

滋陰地黃丸

石斛夜光丸

滋陰腎氣丸

血氣不分凝而遂結之病

防風散結湯

熱積必潰之病

竹葉瀉經湯

蜜劑解毒丸

陽衰不能抗陰之病

決明夜靈散

陰弱不配陽之病

沖和養胃湯

東垣瀉熱黃連湯

益氣聰明湯

心火乘金水衰反制之病

還陰救苦湯

菊花決明散

神驗錦鳩丸

萬應蟬花散

內急外弛之病

黃芪防風飲于

無比蔓荊子湯

奇經客邪之症

撥雲退翳丸

梔子勝奇散

磨障靈光膏

消翳復明膏

爲物所傷之病

除風益損湯

傷寒愈後之病

人參補胃湯

強陽搏實陰之病

抑陽酒連散

亡血過多之病

芎歸補血湯

痲疹餘毒之病


羚羊角散

消毒化痲湯

生肌玉
深疔爲害之病

扶苓瀉濕湯

升麻龍膽草飲子



傅氏眼科審視瑤函卷之二

秣陵傅仁宇允科纂輯

增張文翽題辭

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顙 全次

目病有三因

陳無擇曰喜怒不節憂思兼併以致臟腑氣不平鬱而生

涎隨氣上厥乘腦之虛漫注目系陰注於目輕則昏澀

重則障翳膜淚努肉白膜遮睛皆內如數冒風寒不避

暑濕邪中於項乘虛循系以入於腦侵於目而生目病

者

皆外因

若嗜慾無節飲食不時煩食五辛過啖炙煨驢

騁田獵冒涉烟塵勞動外情皆喪明之具

此內外因也

徐彥純曰人之眼目備臟腑五行相資而神明故能視若

內障乃瞳神黑小神光昏脉也外障則有翳膜可見矣

凡見內障有因於痰火氣鬱血熱偏陽偏陰虛脫榮衛

種種不同外障有起於內皆睛上睛下睛中視其翳色

從何經來惟宜分治蓋目之爲病肝熱則昏暗心熱則

煩痛風濕則癢血少則澁腎虛則睛損甚則陷突微則

翳暗矣。

診視

脉經曰左寸脉洪數

心火上炎也

左關脉弦而洪

乃肝火盛也

左尺

脉微弱

乃腎水不升而火在上也

右寸關脉俱弦洪

乃肝木挾相火之勢來海所不

勝之金而戕已

右尺脉洪數

為相火邪火上炎挾肝本之邪而燦目也。按六脉

浮緊有力者為寒沉數有力者為熱微細而弱者為虛

洪大而滑者為實夫五臟常欲相順相生如心見緩肝

見洪肺見沉脾見濡腎見弦此五臟相合相生之理稟

太和之氣其疾何以生焉是為疾者五臟必相尅反

如心見沉細肝見短濇腎見遲緩肝見洪大脾見弦長

此五臟相形相尅通相互變之機其疾再無不作者萬

物生尅一定之理豈止於病自而言哉經謂五臟不和

則六腑不通六腑不通則九竅痰癰九竅痰癰則氣血

壅滯亦令人憎寒發熱惡風自汗胸膈痞滿有類傷寒

似瘧但目紅赤而頭不痛項不强身發寒不致戰慄發

熱不致悶亂為異而為外障或頃眩目昏頭痛而目不

紅為內障由人於六淫七情飲食色慾過度運動失宜

豈能一一中節而無所乖亂臟腑關竅不得宣通而痰

內漬也予特叙痰飲之脉皆弦微沉滑或云左右關脉

大者或伏而大者皆痰也。眼皮及眼或如灰烟黑者亦痰也。然治法痰因火動降火爲先。火因氣逆順氣爲要。亢則害。承迥制者寒極則生熱。熱極則生寒。木極而似金。火極而似水。土極而似木。金極而似火。水極而似土也。左手寸口心與小腸之脉所由君火也。左手關部肝與膽之脉所出風木也。左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也。右手寸口肺與大腸之脉所出燥金也。右手關部脾與胃之脉所出濕土也。右手尺部命門與三焦之脉所出相火也。

六脉者浮沉遲數滑濇也。浮者爲陽在表爲陽爲虛也。沉者爲陰在裏爲濕爲實也。沉遲者爲陰寒在臟也。浮數者爲陽熱在腑也。滑者血多氣盛也。濇者氣滯血枯也。

通不拘一隅不執一方子謂予同病而異治不知人事有種種不同者也或男子婦人嬰兒處女鰥寡老弱師尼婢妾兼之胎前產後與夫情性之溫暴飲食之多寡二便之通塞四時之寒暑溫涼病症之虛實冷熱歲月之遠近淺深有能節戒不能節戒者服藥曾傷元氣未傷元氣者于態萬狀不可勝計治之安可同於一轍乎况富貴貧賤之殊途蓋富貴之人其志樂其性驕或酒色之不戒家務之勞心暴怒之傷肝以致五火俱動且藥餌委諸童僕火候或失宜故取其効也不易至於貧賤者其志苦其形勞或因薪穀之憂忿怒之傷或藥餌力之不繼欲愈其疾也更

八要者表裏虛實寒熱邪正也表者病不在裏也裏者病不在表也虛者五虛也脉細皮寒氣少泄利飲食不入也漿粥入胃瀉止則生實者五實也脉盛皮熱腹脹前後不通瞤悶也大小便通利而得汗者生寒者臟腑積寒也熱者臟腑積熱也邪者外邪相于也正者臟腑自病也

內經謂曰病赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病從內走外者少陰病太陽病宜溫之散之陽明病宜下之寒之少陽病宜和之少陰病宜清之

保命集云眼之爲病在腑則爲表當除風散熱在臟則爲裏當養血安神暴發者爲表易治久病者爲裏難療按此論表裏之不同明矣用以治病如鼓應桴也

靈樞顛狂篇云目眚外決於面者爲銳眚在內遲鼻者爲內眚上爲外眚下爲內眚

凡看目疾者男子多患左目女子多患右目此陰陽氣血不同故也或有左右無常者乃邪熱攻迫故也如勇先傷左目而右目屢發定不可保女先傷右目而左目屢發亦不能救必須觀人老少壯弱爲主少而怯者易治老而弱者難治易治者用藥溫和難治者用藥滋補

症用藥不可執一目症雖有多端然看者先將難易預定用藥不致有悞如瞳神凸凹者不治青綠白色者不治純黑者不治睛少光彩者不治此老人血衰之症若翳障如半月之狀俱難治之若睛圓不損不論星多少翳厚薄悉皆治之翳怕光滑星怕在瞳神總宜翳膜輕薄星點細小若遇翳障未盡切不可用刀割目得血而能視刀割則傷血亦不可用火灸翳膜生白肝火又以火攻之是以火濟火豈是良法惟服藥於先必兼點藥則病漸退根陰而不復發也

按目病有外感有內傷外感者風寒暑濕燥火此標症也

患者致目暴發疼痛白睛紅腫收淚赤爛其勢雖急易
治內傷者喜怒憂思悲恐驚此七情也患者致黑珠下
陷或起蟹睛翳膜障朦或白珠不紅瞳神大小視物昏
花內障不現其勢雖緩難治又有不內不外而飲食不
節饑飽勞役所致當理脾胃爲主目病雖多不外風熱
虛實之候治亦不離散清補瀉之法然補不可過用參
朮以助其火惟用清和滋潤之類瀉不可過用硝黃龍
膽以凝其血惟用發散消滯之類藥用當則目自愈今
人治目往往非大補則驟用大寒多致受傷治目毋投
寒劑固是要法又當省其致病之源以治之如貪酒者

徐徐戒其酒好色者。緩緩戒其色暴怒者。與言戒其暴怒。不聽則難療也。然心生血。脾統血。肝藏血。血得熱則行。得寒則凝。凝則生翳。生膜。目斯患矣。不可不慎。凡病目後。宜滋腎水。何也。目以肝爲主。肝開竅於目。目得血而能視。若滋腎水。則水能生木。木能生火。火能生土。土能生金。金能生水。生生不已。其益無窮。若腎水虧耗。則水不能生木。木不能生火。火不能生土。土不能生金。金不能生水。肝血虧而火妄熾。其害可勝言哉。

目不專重診脉說

夫曰有是病卽有是脉者。此亦大槩言之。其微渺未必皆