

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一十九方

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥生人參新加湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

傷寒類方

目錄

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加葛根湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二方

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石羔湯

大青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三方

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四方六

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五方七

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生姜豉湯

梔子乾姜湯

梔子厚朴枳實湯

梔子檳皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六方十二

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣

抵當湯

抵當丸

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

瀉心湯類七方十一

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾姜黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八方

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

傷寒類方

五苓湯類九方四

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十方十一

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪胆汁湯

乾姜附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加猪胆汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

理中湯類十一方

理中丸

真武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二方

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾姜湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軀赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

猪胆汁方

燒裨散

吳江徐以上共二百十三方男

熾開和校

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝二兩芍藥二兩

甘草二兩

生薑三兩

大枣十二枚

擘

右五味以水七升微火煮取三升去滓通寒溫服

一升服已須臾飲熱稀粥一升助藥力

桂枝本不

須助以熱粥內經云穀入於胃以傳於肺

桂枝本不

助胃氣以達於肺也觀此可知

桂枝本不

許

文

上

方

桂枝本不

瀉心湯類七

生薑瀉心湯一

生薑

四兩

甘草

炙

人參

黃芩

半裏

黃連

乾姜

各一兩

大棗

十二枚

右八味以水一斗煮取

六升去渣煎取三升溫服一升日三服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有

水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

汗後而邪未盡必有留飲在心

下其症甚雜而方中諸藥一一對症內中又有一藥治兩

症者亦有兩藥台治一症者錯綜變化或補兼施寒熱互

用皆本內經立方諸法其藥性又有與神農本草所載無

處不合學者能於此等方講求其理而推廣之則操縱在

我矣。凡瀉心諸法皆已汗已下已吐之餘痰。

甘草瀉心湯

二 即生薑瀉心湯去人參生薑加甘草一兩

甘草

四兩

黃芩

乾姜

各三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗煮取六升去渣再煎取三

升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不

盡復下之其痞益甚比非熱結但以胃中虛

兩法誤下故用甘草以補

胃而痞自除俗醫以甘草滿中為痞嘔禁用之藥蓋不知虛實之義者也

客氣上逆故使鞭也

甘草瀉心湯主之

半夏瀉心湯三

半夏

半升

黃芩

乾姜

甘草

炙

人參

各三兩

黃連

一兩

大棗

十一枚

右七味以水

一斗

煮取六升去渣

再煎取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴

胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而

振却發熱汗出而解

本症湯在則即

若心滿而不痛者此

為痞

又指不痛二

柴胡不中與之宜

半夏瀉心湯

以上三

方

瀉心湯

三

傷寒類
藥大半皆本於柴胡湯故其所治之症多
與柴胡症相同而加治虛治痞之藥耳

大黃黃連瀉心湯

大黃二兩黃連一兩右二味以麻沸湯二升漬之須臾

絞去渣分溫再服此又法之最奇者不取煎而取泡欲其輕揚清淡以滌上焦之邪

脈浮而緊而復下之緊反入裡則作痞緊脈為陰此所謂病發於陰下之作

痞是也按之自濡但氣痞耳并無脇下之水心下痞按之濡其關上

浮者邪氣甚高大黃黃連瀉心湯主之

傷寒大下後復發汗再誤心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜此湯

詳見前桂枝類中

附子瀉心湯五

大黃

二兩酒浸

黃連

炒

黃芩

炒各一兩

附子

一枚去皮

石四味

切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去渣內附子汁分

溫再服

此法更精附子用煎三味其熱而性重開痞欲其生而性輕也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

此條不過二語

而妙理無窮前

條發汗之後惡寒則用桂枝此條汗止而猶惡寒乃表邪未盡故先用桂枝以

去表邪此惡寒而仍汗出則亡陽在即故加入附子以

陽氣又彼先後分二方此併一方者何也蓋彼有表復有

裡此則祇有裡病故有分有合也

瀉心湯

瀉心湯

瀉心湯

瀉心湯

瀉心湯

瀉心湯

瀉心湯

傷寒類方

黃連湯六

即半夏瀉心湯
去黃芩加桂枝

黃連

甘草炙

乾姜

桂

枝去皮各三兩

人參二兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右七味以水

一斗煮取六升去渣

溫服

一升

日三夜二服

治上焦之

服藥宜少

病故而數

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛

欲嘔吐者黃連湯主

之

諸瀉心之法皆治心胃之間寒熱

不調全屬裡症此方

一分未盡胃中邪氣尚當外達故加

黃連湯乃表邪尚有

黃芩湯七

黃芩

三兩

甘草

炙

芍藥

各二兩

大

棗

十二枚

右四味以水

一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜一服

黃芩加半夏生薑湯八

黃芩三兩 甘草炙 芍藥各二兩 半夏半升 生薑三兩

大棗十二枚 右六味以水一斗煮取三升去渣溫服一升

日再夜一服

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半

夏生薑湯主之不利即導於治利不雜以風寒表藥此亦急當救裡之義若嘔亦即兼以止嘔之藥

總之見症施治服藥後而本症愈復見他症則仍見症施治可推而知也

乾姜黃連黃芩人參湯九

瀉心湯