

醫學從衆錄下

陳修園醫書五十種
十

R2-51

34-4

醫學從衆錄卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

痙 厥 癰 狂 癰 癰

次男元犀靈石參訂

厥者從下逆上之病也。

傷寒論厥者手足厥冷而實陽用四逆散陰厥用四逆湯

厥之旨與傷寒不同

痙者強直反張之象也。癰者猝然昏仆筋脈痙瘓口角流涎或作牛馬猪羊

鷄之聲後人分爲五癰是也。

病有間斷癰者或歌或哭如醉如癡其候多靜而常昏狂

者語言狂妄少臥不饑其候多躁而常醒癰瘓者病在筋骨左癰右瘓將成廢人六症

醫書分治其實一厥陰盡之治得其要只取數方捷如影響蓋厥陰屬風木與少陽相

火同居厥陰之氣一逆則諸氣皆逆氣逆則火發火發則風生風生則必挾木勢而害

土土病則聚液而成痰其歸并於心也心氣大虛而不能禦之或從陽化而爲狂或從

陰化而爲癰心氣尙未全虛受其所凌則昏倒正氣一復而遂瘥其症有作有止則爲

癰其逆行於內也或乘腎氣之虛則爲瘖瘓而爲腎厥或因煩勞以擾其陽陽亢陰虧

而爲煎厥或怒火載血上行氣血亂於胸中相薄而厥逆則爲薄厥或因怫鬱不解陽

氣不能四達手足與身俱冷。

中風身冷溫則爲氣厥或陽騰絡沸則爲血厥或因穢濁蒙

神亂其陰陽之氣則爲尸厥或於飽食之後適有感觸胃氣不行陽并於上則爲食厥

時見吐衄則爲衄厥。溼痰上逆則爲痰厥。以及陽衰而陰湊之令人五指至膝上皆寒

則爲陰厥。陰衰而陽湊之。令人足下熱。熱甚則循三陰上逆。則爲熱厥。其發見於外也。風火迅發。病起於驟然。手足抽掣。角弓反張。或從實化。爲無汗之剛瘳。或從虛化。爲有汗之柔瘳。內經云。諸暴強直。支痛繚戾。裏急筋縮。皆屬於風。醫者可於此而驗風邪之體段焉。土爲木尅。則聚液而成痰。痰挾風而流注。則左癱而右瘓。左傳云。風淫末疾。醫者可於此而知風邪之流極焉。凡此大者。症各不同。其源則一。余只以烏梅丸益厥陰之體。以宣厥陰之用。又以風引湯治厥陰風火。痰涎幻變錯雜之病。舉凡治剛瘳。用葛根湯。柔瘳用桂枝加括蘂根湯。瘳之表症急者。用小續命湯以攻表。瘳之裏症急者。用承氣湯以攻裏之類而不效。治寒厥用六物附子湯。熱厥用六味湯。薄厥用蒲黃湯。煎厥用玉女煎。龍膏丸。氣厥用八味順氣湯。血厥用白薇湯。尸厥用蘇合香丸。食厥用加味平胃散。虬厥用掃蟲煎。腎厥用地黃飲子。痰厥用瓜蒂散之類而不效。治狂用白虎湯。生鐵落飲。涼膈散。滾痰丸。治癲用定志丸。天王補心丹。導痰湯。及獨參湯。加竹瀝薑汁之類而不效。治癰用龍膏丸。丹礬丸。五癰丸。及紫河車丸之類而不效。治癱瘓用二妙散。及舒筋保肝散之類而不效者。種種方藥。無不對症。對症而猶不效。其故何也。蓋緣未嘗求於厥陰一經。而信服烏梅丸風引湯二方之神妙也。二方本於仲景。而喻嘉言獨得其旨。但引而不發。淺學人捫索不來。至葉天士則引伸觸類。妙義無窮。若風火犯於上者。此風火二字即上厥陰風木與少陽相火之義勿誤解爲外來風火不免凌金燄液。用麥門冬湯及瓊玉膏。

爲補金柔制法。若風火犯於中而爲嘔爲脹者。用六君子湯去朮加木瓜薑芍之類。及附子粳米湯加人參。爲補脾凝肝法。若風火震動心脾而爲悸爲消者。用甘麥大棗湯合龍牡之屬。爲緩其急鎮其逆法。若少陽相火挾厥陰風木之威而乘巔搖絡者。用羚羊鉤藤元參連翹之劑。爲熄風清絡法。若肝膽厥陰化風旋逆者。用龍膽蘆薈木通青黛之類。爲苦降直折法。若本藏自病而體用失和者。以椒梅桂芍之類。爲寒暄各得法。若因母藏之虛而擾及子藏之位者。用三才配合龜甲磁硃及復脈湯去薑桂入鷄子黃之屬。爲安攝其子母法。至於痿厥之治。厥陰病風旋陽明病絡空四末不用則爲痿尤覺神奇。取血肉介類。改湯爲膏。謂其力厚重實填隙止厥最速。凡此之類。雖不明用烏梅丸風引湯成方。而細味其旨。無一不從此二方神悟出來。甲寅歲余在吳航書院掌教。嘗與學徒講論。以讀於無字處。文到有神時。二句爲舉業妙諦。而學醫者亦必到此境地。方許出而論證也。

脈息

宜實大。忌沉細。漸緩則漸愈。漸數則漸甚。若數而弦緊。及見牢革促代諸脈。

難治。

葛根湯。

傷寒方見

小續命湯。

時方見

風引湯。

金匱方見

桂枝加括蕒根湯。

金匱方見

原方加括蕒。分兩倍於桂芍。

六物附子湯。治寒厥。

附子 肉桂 防己錢各二 炙草 一錢 白朮 茯苓各一錢 水煎服。

六味湯。時方 白虎湯。傷方 麥門冬湯。金方

白薇湯。事本 人平居無疾苦。忽如死人。氣過血還。陰陽復通。移時方寤。名曰血厥。婦人

多有之。

白薇 當歸各二 人參 甘草各五分 水二杯煎一杯溫服。

蒲黃湯。治薄厥。

蒲黃一兩 清酒十六盞 溫服。

八物順氣湯。治氣厥。

白芷 台烏藥 青皮 陳皮各一錢 人參七分 茯苓 白朮各一錢 炙草七分 水

煎服。

地黃飲子。時方 平胃散。時方 玉女煎。見頭痛 瓜蒂散。大小承氣湯。調胃承氣

湯。傷寒 附子粳米湯。金方 三才湯。見咳嗽

涼膈散。時方 或加膽南星石菖蒲。見中風。

舒筋保肝散。治左癱右瘓。筋脈拘攣。身體不遂。脚腿少力。乾溼脚氣。及溼滯經絡。久

不能去。宣導諸氣。

木瓜

五兩

草薺

五靈脂

牛膝

酒浸

續斷

白殭蠶

炒

松節

芍藥

烏藥

天

麻

威靈仙

黃耆

當歸

防風

虎骨

酒炒各

右用無灰酒一斗。浸上藥二七日。緊封紮。日足取藥焙乾。搗爲細末。每服二錢。用浸

藥酒調下。酒盡用米湯調下。

喻嘉言曰。此治風濕搏結於筋脈之間。凝滯不散。阻遏正氣不得通行之方。

滾痰丸

時方見

治一切實痰異症。孕婦忌服。

生鐵落飲

時方見

治狂妄不避親疎。

定志丸

金

治言語失倫。常常喜笑發狂。

人參

茯苓

各三兩

石菖蒲

遠志

甘草湯去骨一兩

右四味爲末。蜜丸梧子大。飲服七十丸。亦可作湯服。

血虛加當歸。有痰加半夏。橘

皮。甘草。生薑。

五癰丸

治五癰。

硃砂

眞珠

各二錢

水銀

雄黃

各五分

黑鉛

銀一兩

煨結

成砂

用水

研末蜜煉丸。如麻子大。

小兒每服三四丸。大人加倍。煎金銀花薄荷湯送下。

紫河車丸

癰癤多由母腹中受驚。積久失調。一觸而發。遂成此症。此先天受病。故用河車丸。以

人乳送下。取同氣相求之義。時醫加當歸人參各二兩。硃砂五錢。此方如龍骨

龜版石菖蒲皆可加入。

紫河車洗一具用米泔禾米蒸熟晒乾研末爲丸。梧子大。空心每服五十丸。人乳送

下。

當歸龍薈丸。時方見治肝經實火。大便秘結。小便澀滯。或胸膈疼痛。陰囊腫脹。凡屬肝

經實火。皆宜用之。葉天士云動怒驚觸致五志清爽其神識也

丹礬丸。張石治五癰甚效。

黃丹一兩白礬二兩銀罐中煨通紅爲末。入臘茶一兩。不落水猪心血爲丸。菉豆

大。硃砂爲衣。每服三十丸。茶清送下。久服其涎自便出。服一月後。更以安神藥調之。

甘麥大棗湯。葉天士加減方治厥發丑寅。陽明少陽之陽震動。

生地 天冬 阿膠 雞子黃 生龍骨 小麥 甘草 水煎服。

本方只小麥大棗甘草三味。治婦人臟燥悲哀欲哭。

葉天士方。治驚恐。陽升風動。宿癰遂發。吐痰嘔逆。不言。絡脈失利也。

羚羊角 石菖蒲 膽星 遠志 連翹 鉤藤 天麻 橘紅 水煎服。

小半夏湯加白糯米。

葉天士云。衝脈乃陽明所屬。陽明虛則失闔。厥氣上犯莫遏。內經治肝不應。當取陽

明制其侮也。暫用通補入府。取乎府以通爲補之義。

葉天士藥膏方

案云。嘗治顧某陰絡空隙。內風掀然鼓動。而爲厥。余用鹹味入陰和陽。介類有情之潛伏。頗見小效。但病根在下深遠。湯劑輕浮。焉能填隙。改湯爲膏。取藥力味重以填實之。亦止厥一法。

鮮鼈甲 龜板 猪脊髓 羊骨髓 生地 天冬 阿膠 淡菜 黃柏 熬膏。

早服七錢。午服四錢。

烏梅丸

傷寒見

統治厥陰諸症。厥熱相間。及虺厥久利。

柯韻伯曰。六經惟厥陰難治。其本陰而標熱。其體風木。其用相火。內經云。必伏其所主。而先其所因。或收或散。或逆或從。隨所利而行之。調其中氣。使之和平。是治厥陰法也。仲景立方。皆以辛甘甘涼爲君。不用酸收之品。而此方用之者。以厥陰主肝木耳。洪範曰。木曰曲直。曲直作酸。內經曰。木主酸。酸入肝。君烏梅之大酸。是伏其所主也。配黃連瀉心以除痞。佐黃柏滋腎以除渴。先其所因也。腎者肝之母。用椒附以溫腎。則火有所歸。而肝得所養。是固其本也。肝欲散。用細辛乾薑之辛散。以遂其所欲也。肝藏血。用桂枝當歸之溫潤。所以引其歸經也。寒熱雜用。則氣味不和。故佐以人參調其中氣。以苦酒浸烏梅。同氣相求。蒸之米下。資其穀氣。加蜜爲和。少與而漸加。

之。緩以治其本也。仲景此方。本爲厥陰諸症之法。叔和編於吐衄條下。令人不知有厥陰之主方。觀其用藥。與諸症符合。豈止吐衄一症耶。

痢症續論

王叔和主陽蹻陽維陰維督脈。詳載脈經及李瀕湖奇經攷。宜參觀之。
張石頑云。晝發灸陽蹻。宜補中益氣湯加益智。夜發灸陰蹻。宜六味丸加鹿膠。
薛氏云。凡有此症。欲發未發前二三日。先宜看耳後高骨間。有青筋紋。抓破出血。可免其患。

張石頑曰。痢症之發。由腎中龍火上升。而肝家雷火相從挾助也。惟有肝風。故作搐搦。則通身之脂液逼迫而上。隨逆而吐出於口也。陰氣虛不能寧謐於內。則附陽而上升。故上熱而下寒。陽氣虛不能周衛於身。則隨陰而下陷。故下熱而上寒。

當歸承氣湯。祕傳 治男婦痰迷心竅。踰牆越壁。胡言亂語。

當歸尾 一兩 大黃 酒洗 芒硝 枳實 厚朴 各五錢 炙甘草 三錢 水三杯。煎八分服。

溫膽湯

駱氏內經拾遺云。癩狂之由。皆是膽涎沃心。故神不守舍。理宜溫膽。亦治癩病。

卽二陳湯加鮮竹茹枳實各二錢。或調飛礬分半。

磁硃丸。時方見 治癩狂癩如神。

疝氣

疝氣。罌丸腫大。牽引小腹而痛。丹溪云。專屬肝經。景岳云。病名疝氣。以治疝必先治氣也。蓋寒有寒氣。熱有熱氣。濕有濕氣。逆有逆氣。俱當兼用氣藥也。

長孫男。按。雖有寒水。筋氣。血。狐。癰。七疝之名。其治法不外溫經散寒。除濕行氣。

活血導火。輭堅為主。別錄云。以五苓散加木通。川練子。橘核。木香。統治之。實為簡捷。可從。若苦練子丸。及三層茴香散。為久患不愈者立法。千金翼洗方。為暴痛欲死者立法。不可不知。癥瘕。即婦人之疝也。

脈息

宜沉實。忌虛弱。

加味五苓散。

白朮炒三錢 茯苓二錢 猪苓各二錢 木通利

又引熱下行止痛 橘核三錢 肉桂五分 神一錢 入溫肝腎 化血中 氣藥 苦練子去錢核

五分到以納諸藥 木香一錢 水三鍾 煎八分 空心服。或入食鹽一捻。

寒甚。加附子乾薑一二錢。熱甚。加黃柏梔子一二錢。濕勝。加防己一錢。堅硬

如石。加昆布一錢。牡蠣煨三錢。痛甚。加桃仁二錢。川山甲五片。炒乳香五分。

苦練子丸。治奔豚小腹疝氣如神。

川練子 茴香各二兩 附子一兩

一兩入元胡索三錢一作五錢 全蝎十條炒 丁香十八粒 共為末。酒煉丸如桐子大。溫酒下五

十丸。空心服。如痛甚。煎當歸酒下。

三層茴香丸。治一切疝氣如神。

大茴香五錢和鹽秤一兩 川練淨肉 沙參 木香各一兩 共為末。煉蜜丸桐子大。每

服三錢。空心溫酒下。或鹽湯下。纔服盡。接第二料。

照前方加葶撥一兩。檳榔五錢。共五兩半。依前丸服法。若未愈。再服第三料。

照前二方加茯苓四兩。附子炮一兩。共前八味重十兩。丸服如前。但每服三錢。雖三

十年之久。大如栲栳。皆可消散。神效。

蜘蛛散。金方見 治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下。

洗陰腫核痛。千金翼 治丈夫陰腫如斗。核中痛。

雄黃末 礬石一研 甘草一兩 水一斗。煮二升。洗之。如神。

淋洗囊腫神效。秘錦方

連鬚葱白頭必一洗淨 去土 川椒 麥冬炒焦 地膚子各一兩 四味煎湯。淋洗囊上良

久。次日再洗。以消為度。

荔枝散。種福堂 治陰中腫大。不消。

頂大荔枝核十二三箇。煨灰存性。以火酒調如糊。喫下卽消。若未消。連喫二三服。

眩暈

內經云。諸風掉眩。皆屬於肝。掉。搖也。眩。昏亂旋轉也。皆由金衰不能制木。木旺生風。風動火熾。風火皆屬陽而主動。相搏則爲旋轉。內經又云。上虛則眩。是正氣虛而木邪干之也。又云。腎虛則頭重高搖。髓海不足。則腦轉耳鳴。皆言不足爲病。仲景論眩以痰飲爲先。丹溪宗河間之說。亦謂無痰不眩。無火不暈。皆言有餘爲病。前聖後賢。何其相反如是。余少讀景岳之書。專主補虛一說。遵之不效。再搜求古訓。然後知景岳於虛實二字。認得死煞。卽於風火二字。不能洞悉。其所以然也。蓋風非外來之風。指厥陰風木而言。與少陽相火同居。厥陰氣逆。則風生而火發。故河間以風火立論也。風生必挾木勢而尅土。土病則聚液而成痰。故仲景以痰飲立論。丹溪以痰火立論也。究之腎爲肝母。腎主藏精。精虛則腦海空而頭重。故內經以腎虛及髓海不足立論也。其言虛者。言其病根。其言實者。言其病象。理本一貫。但河間諸公。一於清火。驅風豁痰。猶未知風火痰之所由作也。余惟於寸口脈滑。按之益堅者。爲上實。遵丹溪以酒大黃治之。如寸口脈大。按之卽散者。爲上虛。以一味鹿茸酒治之。寸口脈微者。以補中益氣湯。或黃耆白朮煎膏入半夏末治之。然欲榮其上。必灌其根。如正元散及六味丸八味丸。皆峻補腎中水火之妙劑。乙癸同源。治腎卽所以治肝。治肝卽所以熄風。熄風卽所以降火。降火卽

所以治痰。神而明之。存乎其人。難以筆楮傳也。如鈎藤玉竹菊花天麻柔潤熄風之品。無不可於各方中出入加減。以收捷效也。

診法

左手脈數。熱多。脈濇。有死血。浮弦為肝風。右手滑實為痰積。脈大是久病。虛大是氣虛。正元丹治命門火衰。不能生土。吐利厥冷有時。陰火上衝。則頭面赤熱。眩暈惡心。

濁氣逆滿。則胸脅刺痛。臍腹脹急。

人參

三兩用

汁收入

川烏一兩

白朮

二兩用

汁收入

陳皮五錢

茯苓

二兩用

肉桂六錢

酒煎

汁

甘草

一兩五錢用

烏藥一兩

黃耆二兩

酒煎

收入

兩煎

汁收入

去烏藥

黃耆

二兩

酒煎

收入

去川芎

薯蕷

一兩

酒煎

收入

去乾薑

三錢

薑

一兩

酒煎

收入

去乾薑

右六味。除茯苓。文武火緩緩焙乾。勿炒傷藥性。杵為散。每服三錢。水一盞。薑三片。紅

棗一枚。劈煎數沸。入鹽一捻。和渣調服。服後飲熱酒一杯。以助藥力。此方出自虞天

益製藥祕旨。本千金方一十三味。却取烏頭薑桂等辛燥之性。逐味分製。四君耆薯

之中。較七珍散但少粟米。而多紅棗。雖其力稍遜原方一籌。然雄烈之味既去。則真

滓無形。生化有形。尤為溫補少火之馴劑。而無食氣之虞。真千金之功臣也。

一味鹿茸酒。

註云。緣鹿茸生於頭。頭暈而主鹿茸。蓋以類相從也。

鹿茸

半兩

酒煎

去滓

入麝香

少許服

一味大黃散。

丹溪云。眩暈不可當者。此方主之。

大黃酒製三次。爲末茶調下。每服一錢至二三錢。

加味左歸飲。治腎虛頭痛如神。並治眩暈目痛。

熟地

七錢

山茱萸

懷山藥

茯苓

枸杞

各三錢

肉苁蓉

酒洗切

細辛

炙草

各一錢

川芎

二錢

水三杯

煎八分

溫服。

頭痛

景岳云。頭痛一證。暫痛者必因邪氣。久痛者必因元氣。但暫病者。有外感頭痛。有火邪頭痛。久病者。有陰虛頭痛。有陽虛頭痛。然亦有暫病而虛者。久病而實者。又當因脈因證而詳察之。不可執也。或寒熱脈緊。清涕咳嗽。脊背疼痛者。此寒邪在表而然。治宜疎散。九味羌活湯。及茶調散。清空膏主之。或內熱脈洪。頭腦振振。痛而兼脹者。此火邪在裏而然。治宜清降。玉女煎及一味大黃散主之。或因水虧而火動。蒸熱脈弦。痛兼煩躁者。此陰虛血虛而然。治宜補陰。以六味湯。左歸飲。加肉苁蓉。細辛。川芎主之。或遇陰則痛。遇寒亦痛。倦怠脈微者。此陽虛氣虛而然。治宜扶陽。以補中益氣湯。加蔓荊子。川芎。八味湯。右歸丸。主之。或外感頭痛。當察三陽厥陰。蓋三陽之脈俱上頭。厥陰之脈亦會巔。太陽在彼。陽明在前。少陽在側。此又當有所主。亦外感所當辨也。但內傷頭痛。則不得以三陽爲拘耳。至眞頭痛者。頭痛甚。腦盡痛。手足寒至節。死不治。或灸百壯。吞黑錫丹。可救十中之一。

脈息

宜浮滑。忌短瀉。

九味羌活湯。方見時治太陽輕症。

葛根湯。方見傷寒治陽明。

小柴胡湯。方見傷寒治少陽。

麻黃附子細辛湯。方見傷寒治少陰。

當歸四逆湯。方見傷寒治厥陰。

川芎茶調散。方見傷寒治久風化火。頭痛及偏正頭風。

川芎 白芷 羌活 防風 荊芥 薄荷 甘草一兩各 香附二兩便 爲末。食後

清茶調服二錢。日三服。婦人產後。黑豆淋酒服。輕者三服。重者五七服效。一本無

香附。有細辛五錢。

清空膏。治頭風溼熱上盛。遇風即發。

羌活 黃芩酒各一兩 甘草炙七分 防風一錢 黃連五分 柴胡四分 川芎三分

清茶一匙服。

玉液湯。生濟治眉稜骨痛。

半夏六錢切 湯池七次 生薑十片

水煎。去渣納沉香末少許服。

玉女煎。湯景 治水虧火盛。六脈浮洪大。頭痛牙疼失血等症。

生石膏。三錢五 熟地。三錢五 知母。二錢 牛膝。各一錢 水煎服。

玉真圓。事本 治腎氣不足。氣逆上行。頭痛不可忍。謂之腎厥。其脈舉之則弦。按之石堅。

硫黃。二兩 石膏。煨 半夏。湯洗 硝石。各一錢 爲末。生薑汁糊丸如梧子大。陰乾。每服

二十丸。或薑湯或米飲下。更灸關元穴百壯。

補中益氣湯。時方見

當歸補血湯。時方見 治血虛頭痛。

按加鹿茸三錢。沙參五錢。黃酒半杯煎。更效。又方。只用當歸二兩。黃酒四杯煎一

杯半。分兩服效。

加味左歸飲。時方見 治腎虛頭痛如神。此余鄉前輩胡先生新定方也。

清震湯。命保 治雷頭風。頭面疙瘩。增寒拘急發熱。狀如傷寒。瘡瘡宜

升麻。二錢 蒼朮。四錢 荷葉。一箇 水煎食後服。

頭風摩散。金方 治大寒犯腦頭痛。

止痛太陽丹。教奇

天南星。川芎。等分 爲末。同蓮鬚葱白作餅。貼太陽痛處。

貼頭痛風熱病祕方。

大黃 朴硝 等分

爲末。用井底泥捏作餅。貼兩太陽穴。

氣攻頭痛方。效奇

葶麻子乳香各等分。搗成餅。貼太陽穴。如痛止。急於頂上解開頭髮出氣。卽去藥。

透頂散

本

治偏正頭風。遠年近日皆效。并治鼻塞不聞香臭。

細辛

三莖

瓜蒂

七枚

丁香

七粒

粳米

七粒

赤小豆

龍腦

半

麝香

一分

研末。置小口

罐中。緊塞罐口。令患人口含清水。隨左右搐一豆大於鼻中。良久涎出卽安。不愈。三

日後再搐。按此本金匱納藥鼻中取黃涎之法。酒客多溼頭重者宜之。

又法治偏正頭風。以生一服搗汁。令患者仰臥。以汁灌鼻中。左痛灌右。右痛灌左。左

右俱痛。俱灌之。

又頭風有偏正之殊。其病皆在少陽陽明之絡。以毫鍼刺痛處數穴。立效。

張石頑云。外用法。不若蒸法最效。方用川芎半兩。晚蠶砂一兩。殭蠶如患年歲之數。

以水五碗煎至三碗。就砂鍋中。以厚紙糊滿。中開錢大一孔。取藥氣薰蒸痛處。每日

一次。雖年久者。三五次永不再發。

平時置新鮮木瓜於枕邊。取香氣透達。引散肝風。亦良法也。

簡易方。

頭風腦中空痛。用川芎當歸各三錢。共研末。黃牛腦一箇和勻。分三次熱酒送下。盡