

喉科易知

喉科易知目錄

張氏咽喉七十二證治圖說附論

張氏湯藥列方

吳氏丹藥列方

治喉痹喉癰喉蛾等症各方

喉症各方

白喉神方

齒科附


喉科易知

張氏咽喉七十二證治圖說

咽喉門一

凡十
一症

喉珠簾



此症滿喉如細白網狀。兩邊微重。良有耳。點帶正色。少舌紅腫。嚥水大痛。此症因鬱積熱毒而發。尹。用因。下。治。法。同。五。才。要。大。而洪。宜清火用六味湯。加鹽炒黃柏二錢。酒炒黃芩一錢。鹽炒知母二錢。熟石膏五錢。山豆根二錢。鹽炒元參二錢。山梔一錢。

木通一錢。生地二錢。服一劑。來日再加連翹三錢。紫花地丁三錢。熟地二錢。丹皮二錢。

草河車二錢。川連一錢。金汁一鍾。或煎柏枝汁一鍾。沖服。外吹藥。六七日可愈。

咽喉門二


喉啞食噎



此症因伏邪在肺。聲啞食噎。六脈遲細。甚屬陰症。宜用六味湯。加麻黃三錢。桂枝一錢。蘇葉三錢。木通一錢。細辛二錢。白芷一錢。訶子二錢。皂核三錢。薑炒半夏二錢。連服五六日。病可退。但聲啞未除。換加桔梗一兩。訶子七錢。甘草七錢。薄荷一錢。以上俱童便炒。

麻黃一錢煎數沸噙嗽徐徐嚥下服十劑而愈後服補藥健脾。

三門喉咽
喉腫外內




此症生於喉關之下。陰陽相結。內外皆腫。或有爛斑火鬱之症。用六味湯。加炒黃芩三錢。熟軍五錢。海浮石二錢。外吹藥。來日換加丹皮一錢半。生地二錢。酒炒黃芩二錢。生石膏三錢。炒山梔一錢。木通一錢。卽針少商商陽兩手四穴。如背寒。加羌活。胃泛。加葛根。柏枝汁。亦可漱之。附頸腫喉痛。薄荷一錢。連翹

射干 牛蒡 馬勃 各一錢 生菡豆皮三錢 右水煎服 又方 西瓜青皮 連翹


射干 各二錢 飛滑石 三錢 桑皮 一錢 杏仁 一錢半 去皮尖 虛火痛者忌服。

四門喉咽
喉熱風




此症當是感風熱而起。滿喉發細紅點。根帶淡白。舌下兩邊有三四塊。六脈洪緊。用六味湯。加鹽炒元參二錢。酒炒黃芩三錢。山梔一錢。花粉一錢。一服可愈。外用吹藥。重則兩服。兼服八仙散。

五門喉咽
喉虛色紫



各一錢服後紫變為紅。換加鹽炒元參二錢酒炒黃芩二錢花粉二錢即愈。

六門喉咽
喉癰



此症因腎虛火旺發癰於喉不腫而微紅。上有斑點青白不一。如芥子大。或針孔菉豆大。每點生芒刺。入水大痛。喉間聲啞。咳嗽無痰。六脈細數者。用知柏地黃湯兼四物湯。加麥冬炒元參鹽炒女貞子枸杞人參洋參二錢或煎藥不入丸藥亦可。首烏阿膠各二錢。

十服後。用附桂八味丸。加女貞枸杞二參俱鹽炒。淡鹽湯下。每服四錢。如前知柏地黃湯四物湯服後不應。酌加附桂。每服各三錢。冷服。如六脈洪數。恐難脫體。外兼用吹藥治之。附喉癰。體虛多鬱者患之。喉生苔癰。色暗不紅。不閉不腫。氣出如常。微微痛。

癢有礙飲食者卽是此係虛火淹纏難愈忌刺畏補 選方 冰片 牛黃各一分膽

礬三分山豆根二錢真硼砂 雄精 兒茶各八分 右共研細末另用鹽梅三個去


核搗融入藥和勻丸如龍眼大臨臥啣在口內過夜卽愈啣至十丸斷根

風火喉癰一症屢愈屢發並無夜熱咳嗽吐血等症惟喉痛紅赤或似蝦蟆皮色圈結

喉中用秋蝴蝶花根二兩卽射干也此花梗葉與春蝴蝶花相似但春間開者花似藕皮色以秋間開黃花者爲真不可誤取洗淨搗爛

甜酒煎汁啣口中漱三五次吐出再換再漱可以除根

咽 喉 門 疳 七



此症腎虛火旺沸騰上部而發喉間上腭有青白紅點平坦無

刺故名喉疳聲不啞不咳兩尺脈虛者是也先用六味湯去荊

防蠶三味加鹽炒元參一錢酒炒黃芩二錢丹皮二錢生地二


錢鹽炒山梔一錢鹽炒女貞錢半鹽炒知母錢半水炒再拌男

加龜板五錢女加鼈甲五錢服五劑或十劑如不愈再加附桂各三分另煎入藥冷服

愈後合附桂八味丸加元參知母女貞枸杞各藥俱鹽水炒一料可愈外用吹藥


十門喉咽

喉啞聲




九門喉咽

喉啞虛



八門喉咽

喉揚飛



此症風熱上壅。上腭紅腫。嚥物不

下。從小舌中飛揚滿口。急針患處。

出血泄氣。吹藥。內服六味湯。加連翹葛

根黃柏山梔木通各一錢
生石膏四錢一二服可愈

此症喉間不腫。兩邊關內。少有紅點。聲啞不明。牙關不開。乃內
外風火。因喜食酸滯之物。肺氣不清故也。用六味湯加細辛三
錢蘇葉二錢服一劑。聲音不啞。換加生地丹皮各二錢鹽水炒
山梔木通花粉各一錢二服愈矣。

此症寒伏肺腑。不腫不紅。又無爛點。惟覺乾痛。難於飲食。用六
味湯加蘇葉麻黃各二錢細辛五分二服後。麻黃蘇葉各減半。
再二日。換加花粉黃芩羌活薑炒半夏各一錢皂核二十粒。訶
子二錢桔梗五錢甘草五錢上三味
皆拌重便炒四五服。乃愈。初起忌涼藥。

此症非三四月不痊。附陰虛聲啞。此由色慾過度。元氣耗喪。法用未破身十六七

童男女。早起。未食物漱口。前爛嚼海南子。檳榔一二個。與病者服。換十人。嚼十次。病自

愈。男病用女。女病用男。又新好槐花。放新瓦上。慢火炒熱。放身旁。隨行隨坐。間送一二粒。置

口中。咀嚼咽之。使喉中常有氣味。自愈。又生白礬。煉蜜為丸服之。咽喉聲啞

真硼砂一兩。元明粉。膽星各一錢。訶子肉二錢。冰片三分。共為末。外加大烏梅一兩。

搗如泥丸。每用一丸。噙化數次。又猪油二斤。熬去滓。入白蜜一斤。再煉少頃。漚淨

入磁器成膏。不拘時服。一匙。兼治肺熱聲啞。又通草水煎服。或橘皮煎濃汁。俟冷

飲之。咽喉癢痛聲啞。肉桂一錢。杏仁五錢。為末。蜜丸。櫻桃大。綿裏含化。嚥汁。

此症生喉關內腫爛。右關脈急。用六味湯半服。加酒炒黃芩一


錢。花粉一錢。鹽炒元參二錢。葛根一錢。生石膏二錢半。淡竹葉

二錢。草河車二錢。連服四劑。如爛斑不退。加生大黃三錢。津化

八仙散玉樞丹。每服五分。三服可愈。附爛喉痧。土茯苓煎


咽喉門一十

爛喉痧




乳蛾二門

單乳蛾



乳蛾一門

雙乳蛾



凡七症

湯時時服之。忌茶數日。又以四物湯加茯苓黃芪服二十餘劑。又服鮮櫻桃數十粒。蜜餞亦可。又用紅棗散吹入。又土牛膝根即臭婆娘根秋間取之洗後搗汁瓦盆曬乾刮粉研末入盜瓶用時入冰片少許吹喉吐出稠液。又牛黃五釐青黛六分冰片二釐象牙屑三分焙黃指甲五釐焙黃男女互用壁蟾窩二十四枚真珠三分研末吹之。


此症感冒肺二經而發生於關口上部兩邊如櫻桃大身發寒熱六脈弦數先針少商商陽兩手四穴或挑破患花出血先用六味湯加陳皮海浮石蘇葉羌活各錢半兩服可愈如腫不退六脈有力加大黃三錢

此症生於雙蛾地部之旁或左或右六脈浮數因患傷寒後邪未散盡身熱惡心恐見痧症方用六味湯加葛根二錢蘇葉一錢羌活二錢鮮芫荽五錢無鮮者用子三錢一服退半來日再加黃芩酒炒二錢花粉二錢山梔赤芍木通各一錢即愈附單

雙喉蛾 又名喉痹。生於咽喉關上者輕。關下者重。此症不得輕視。喉閉片時。卽不可救。若男子從鼻梁中心。尋至頭頂。婦女則從後腦。尋至頂上。小兒看兩手虎口。如有水泡紅子。卽用銀針挑穿。喉蛾卽破。忌見燈火。一面用老蒜搗融。如蠶豆大。敷經渠穴。穴在大指下手腕處寸脈後。卽是。男左女右。用蜆殼蓋上紮住。用別物蓋亦可。片時起一水泡。銀針挑破。將水揩淨。以去毒氣。立刻安痊。再服甘桔湯。以免後患。無藥之處。不服亦可。此方屢試屢驗。其效無比。又方 皂角蟲蛀者不用 研末醋調服一錢。重則一錢四五分。或用鵝毛蘸藥入喉攪動。亦可。並敷喉外。乾則隨換。少許吐出痰涎。卽愈。此係急症。諸藥性緩。惟此功效甚速。誠喉風第一方也。並治九種喉痹。愈後。仍照以後甘桔湯調理。無藥之處。不服亦可。又方 鵝毛一根。黏真桐油一分。入喉捲攪。痰隨油吐。自然卽愈。吐後服甘草水。可解油氣。又方 手指甲燒灰。吹入。其蛾立破。至便至神。或用燈草燒灰吹入。亦極驗也。又後有喉症各方。俱極效驗。可參觀之。

三門蛾乳

蛾乳爛




四門蛾乳

蛾寒風



五門蛾乳


蛾乳色白



此症因肺胃鬱熱。紅腫爛斑。大痛難食。六脈弦緊。宜急針少商。商陽兩手四穴。用六味湯。加葛根二錢。蘇葉鹽炒元參各一錢。炒黃芩二錢。沖柏枝汁一杯。漱喉間。徐徐嚥下。再用八仙散一服。津化下來。日去蘇葛二味。加山梔木通生地丹皮浮石花粉各二錢。脈大有力。加生大黃三錢。脈虛用八仙散同柏枝汁。照前服法。三四日可愈。如聲啞背寒。六味湯加葛根二錢。蘇葉一錢。羌活一錢。細辛三分治之。

此症因風寒而起。腫大如李。頭不能下視。氣塞不通。寸關之脈浮緊。即針少商。商陽少沖兩手六穴。用六味湯。加蘇葉三錢。羌活一錢。一服可愈。若早用涼藥。則不能退矣。此症腫塞滿口。身發寒熱。六脈浮弦。因脈受風寒之故也。六味湯加蘇葉二錢。細辛三分。羌活二錢。一服可愈。

六門蛾乳
蛾石



七門蛾乳
蛾喉寒伏



一門痺喉
痺喉爛



此症因本原不足所致。生於乳蛾地位。少進半寸。初生不可用涼藥。不可動針刀。此乃肝火老痰。結成惡血。凡遇辛苦即發。用六味湯加貝母一錢。生地二錢。牛蒡一錢。麥冬一錢。木通一錢。服四五劑。如不退。去六味。用生地錢半。丹皮一錢。象貝母錢二。分甘草牛蒡各一錢。桔梗八分。麥冬一錢。木通六分。薄荷二錢。燈心二分。服以愈為度。外吹退腫藥。

伏寒之症。其色紫。治法同紫色喉癰。如孕婦喉癰。服藥有礙。將藥煎濃漱喉。吐去。附各種喉蛾單方。喉間方覺脹滿起。

者。急以食鹽用。手掌心搓鹽。乾復易新鹽。搓之數刻。即消。

此症因肝胃熱毒。外感時邪而發。形如花瓣。爛腫白斑。痛叫不食。目睛上泛。六脈洪大。速針少商。商陽。關沖。少沖。兩手八穴。有血生。無血死。用六味湯加生黃一錢。鹽炒黃芩二錢。入酒少許。元參二錢。


四門痹喉
痺喉雙



三門痹喉
痺喉伏寒



二門痹喉
痺喉色白



鹽炒生地二錢丹皮二錢海浮石二錢山梔一錢木通一錢兩服後去大黃用六味湯再加生石膏三錢訶子錢半整柏子仁柏枝汁四服可愈并服八仙散二錢津化下脈細身涼者不治此白色痹脈遲身熱用六味湯加細辛三分羌活二分蘇葉陳皮各一錢二服可愈若變紅色乾痛去前四味換加山梔木通酒炒黃芩生地黃柏各一錢痰多加海浮石半夏花粉各一錢此寒伏喉痹寒重色紫亦不大腫若誤服涼劑久之必爛凡遇紫色者不可作火治用六味湯加細辛五分麻黃桂枝蘇葉瓜蒌訶子牛蒡各一錢甚者吐出紫血塊治法亦同未爛者加蘇葉二錢細辛五分柴胡海浮石各一錢腫與不腫同治此雙喉痹生於上腭關內兩邊形如欖核痛而難食或發寒熱兩關脈洪大者是也速針患處或少商穴亦可用六味湯一

喉痹五門

喉單



服。來日再加黃芩山梔木通炒元參各錢半。一服可退。爛者不
可針。但於患處用吹藥。

此症或左或右。治法同雙喉痹。附喉痹治法。喉蛾喉閉纏

喉風。皆曰喉痹。痹者。不仁也。頃刻而起。危急之症。痰在喉中作

響。響如打鼾。舌白而不腫。諸書皆稱肺絕不救。蓋緣誤服寒涼之藥。以致死耳。服後

桂薑湯立愈。桂薑湯。治喉痹頃刻而起。毫無別恙者。此虛寒陰火之症。肉桂

炮薑。甘草各五分。右共歸碗內取滾水沖入。仍將碗頓於滾水內。服藥口許。慢

慢嚥下。立愈。或以生附子切片。塗白蜜。火炙透黑。收貯。臨用。取如菉豆大。一粒。口啣

嚥津。亦立刻全愈。此林屋山人秘法。雖暑天亦宜用。切勿遲疑自誤。又方。用蝸


牛綿裹。浸水含嚥。須臾立通。又方。用蝸牛七枚。白梅肉三枚。研爛。綿裹含嚥。立

效。又方。喉閉。用髮指甲煨存性。吹之。男用女。女用男。不得錯誤。極效。此出伯孺

札記。


喉痹六門

淡紅喉痺



喉痹七門

走馬喉痺



此症因傷寒時邪未消。兩關脈沈細。兩寸尺四脈虛數。腫如雞子。身發寒熱。眼紅嘔吐。恐有斑毒在內。急針少商。商陽。關沖。少冲。左右八穴。或患處挑破。用六味湯加蘇葉。羌活。葛根。各二錢。鮮芫荽五錢。服一劑。滿身發出痧疹。嘔吐即止。或身熱不退。喉外亦腫。此內火外洩也。用六味湯。換加生大黃三錢。葛根。黃芩。山梔。元參。花粉。各二錢。生石膏五錢。滑石二錢。二服。後去大黃。石膏。再服四五劑。有爛斑。用八仙散一服。津化下。兼服柏枝汁。此係急症。肝脾火閉不通。而為走馬喉痹。不可忽視。內外俱腫。或發寒熱。脈洪大者。生沈細者。死。用六味湯加葛根二錢。柴胡一錢。細辛五分。漱之。再加角刺二錢。歸尾二錢。赤芍二錢。草河車二錢。生軍五錢。痰多者。加海浮石三錢。製半夏二錢。若身熱背寒。加羌活一錢。蘇葉一錢。急刺少商。商陽。關沖。兩手六穴。以血多為妙。

此症由肺胃兩經。陰陽相結。內塞不通。外無形跡。喉內多痰而喘。治法兼見下纏喉風

一門風喉

凡十

風喉鎖腫內



灌吐法。再用六味湯。加麻黃二錢。生軍五錢。細辛一錢。蘇葉二錢。桂枝一錢。羌活二錢。煎數沸服。或瀉或吐。為妙。如不吐瀉。針少商。商陽。關沖。曲池。合谷。左右十穴。有血者生。無血者死。左右關寸脈弦緊洪大者生。沈遲者死。吹去痰藥。曲池穴在肘曲橫紋頭臂之外側合谷穴在虎口背大指食指合界之端宛宛中央

二門風喉

風喉纏




附鎖喉風者。喉內無蛾。痰聲不響。喉內氣急不通者。即是。照前喉蛾皂角桐油各方治之。小兒鎖喉風用芙蓉葉搥汁。煮雞蛋。一貼顙門。一貼肚臍。即愈。

此症因肺感時邪。風痰上壅。陰陽閉結。內外不通。如蛇纏緊。關下壅塞。甚者角弓反張。牙關緊閉。先用開關藥。吹鼻擦牙。以吐為度。再速針頰車左右二穴。灸艾數壯。或用雞蛋清沖白礬灌之。以上諸法。如不吐。再針少商。

喉風三門

風喉舌匝



商陽關沖少沖少陰五穴。有血爲度。無血不治。用六味湯加生軍一兩。麻黃羌活蘇葉。訶子各二錢。煎灌。或瀉或吐。皆妙。如不吐。卽針之。針而無血。六脈沈細者不治。吹用膽礬去痰藥。附外纏喉風。係喉內熱結。喉外腫大。麻而且癢。如蛇纏頸。身發寒熱。頭目腫痛者。卽是喉內之痰塞滿。舌有痰護。此痰不出。齒作響如鼾。喉痹誤服涼藥。乃有此症。如再遲。痰塞鼻內。氣無出入。卽死。照前喉蛾皂角桐油各方治之。仍用薑桂湯調理。自愈。內纏喉風。發時惡寒發熱。內外無形。出氣短促。胸前紅腫。兩足畏寒。乃腎經有熱。水枯不能上潤。照前外纏喉風治法。心前如有紅絲。用針挑破爲要。喉關如雷響者。難治。

此症生於喉之上下兩邊。迫於小舌。有泡。或紅或紫。外臉皆腫。喉內不腫。舌捲粗大。此惡症也。痊者甚少。用六味湯加黃連一錢。黃芩二錢。生軍四錢。連翹二錢。沖玉樞丹一錢。急進三四服。或有可生。如牙關黑腫。齒落頭搖。不治。